

محمد یونس عزیز

03350420190

کتاب خانہ اسلامیہ

ڈاکٹر مرزا محمد امین

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

آئینہ ہومیوپتھی

اُردو ایڈیشن

(حصہ اوّل و دوم)

محمد یونس عزیز

03350420190

مصنفہ و مؤلفہ

عالیجناب ڈاکٹر حکیم مرزا محمد امین صاحب (ہومیوپتھی)
سابق پرنسپل اپر انڈیا ہومیوپتھک میڈیکل کالج لکھنؤ

پبلشر

خوشید مکت ڈپو، امین آباد - لکھنؤ

قیمت فی جلد مع ڈسٹ کور

۶۱۹۸۶

مطبوعہ سرفراز قومی پریس لکھنؤ

پیش لفظ

اس وقت تک جس قدر بھی اُردو کتابیں ہومیو پتھک علاج پر میری نظر سے گذریں ان میں سے بعض کو اس قدر مختصر پایا کہ علاج کے لیے وہ قطعی غیر موزوں اور نا کافی ہیں۔ اور بعض اس قدر طویل پر از لغویات اور سہم کہ ان کے مطالعہ سے دماغ پر اگندہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ادویہ کے انتخاب میں خود معالج ایک تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ میں نے اکثر کتابیں ایسی بھی دیکھی ہیں جو اپنے اصل معیار سے اس قدر گری ہوئی ہیں کہ ان کے لیے میں سوائے اظہارِ تاہنہ کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس قسم کے تمام نقائص کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں حتی الوسع تمام خایوں کو بدر کرتے ہوئے نہایت سلیس اور عام فہم زبان میں ایک ایسی کتاب سپردِ قلم کروں جسے پڑھ کر ایک معمولی لیاقت اور سمجھ والا آدمی آسانی کے ساتھ مرض کی صحیح تشخیص اور باقاعدہ علاج کر کے چنانچہ میں نے نہایت تحقیق اور محنت کے ساتھ اس کتاب کو تیار کر کے ضائقینِ فن کے سامنے پیش کیا کہ وہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا کر دعائے خیر سے یاد کریں۔

مجھے اُمید تو یہ ہے کہ میری یہ ناچیز تصنیف و تالیف ناظرین کے لیے نعمتِ غیر مترقبہ ثابت ہوگی اور میں بارگاہِ الہی میں دستِ بدعا ہوں کہ وہ اسے دُنیا سے ہومیو پتھی میں قبولیت کا شرف بخشے۔ آمین

مرزا محمد امین (ہومیو پتھ)

خوشخبری

ہم کو یہ اعلان کرتے ہیں انتہائی مسرت ہے کہ اردو کی مائے ناز کتاب

”رہنمائے میسر یا میڈیکا“

مصنفہ عالیجناب ڈاکٹر مرزا محمد امین صاحب

سابق پرنسپل اہر انڈیا ہومیو پیتھک کالج لکھنؤ

طباعت کی منزل میں داخل ہو چکی ہے۔

ہومیو پیتھک ادویات کے خواص و برہم طرز کی مختصر اور جامع

کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی کتاب کو پڑھ کر لائق مصنف
کی محنت اور جانفشانی کی داد دینی پڑتی ہے۔

کتاب کا طرز بیان نہایت شستہ اور عام فہم ہے۔ کتاب
کیا ہے گویا دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔

آج ہی آڈر دے کر اپنے لیے کتاب محفوظ کرائیں۔

قیمت :- مبلغ ۵۵ روپیہ فی جلد

کاپیت ۱۸

صلہ

خورشید بکٹ ڈپو، متصل ڈاکخانہ امین آباد۔ لکھنؤ۔

فہرست مضامین

(باب کے اعتبار سے)

حصہ اول

باب	مضامین	صفحات
باب اول	ابتدائی مضامین	۱۵ تا ۴۵
" دوم	امراض سر و دماغ	۴۶ تا ۶۹
" سوم	امراض چشم	۷۰ تا ۸۳
" چہارم	امراض ناک و کان	۸۴ تا ۹۹
" پنجم	امراض منہ و حلق	۱۰۰ تا ۱۱۴
" ششم	امراض سینہ و قلب	۱۱۵ تا ۱۲۰
" ہفتم	امراض معدہ و امعاء	۱۲۱ تا ۲۰۰
" ہشتم	امراض جگر و طحال	۲۰۱ تا ۲۱۶
" نہم	امراض گردہ و مثانہ	۲۱۷ تا ۲۵۳
" دہم	امراض اعصاب	۲۵۴ تا ۲۶۹
" یازدہم	امراض ظاہر بدن	۲۷۰ تا ۳۱۳

حصہ دوم

باب	مضامین	صفحات
باب اول	بخار - تب	۳۱۵ تا ۳۳۶
" دوم	امراض ناگہانی	۳۳۷ تا ۳۷۸
" سوم	امراض اطفال	۳۷۹ تا ۳۸۵
" چہارم	امراض نسوان	۳۸۶ تا ۴۳۹
" پنجم	امراض دبالی	۴۴۰ تا ۴۶۴
ضمیمہ	چند ادویات کا خارجی علاج	الف تا ح

فہرست مضامین

بحساب حروف تہجی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۷۰	آشوب چشم	۳	دو دو باتیں
۳۲۷	آگ وغیرہ سے جلنا	۱۵	ابتدائی مضامین
۱۲۹	آنتوں کا درد	۲۵	{ انتخاب پوٹنسی اور
۱۷۹	آنتوں کا درد		وقفہ خوراک
۱۷۹	آنتوں کے کیڑے	۱۹	پوٹنسی (طاقت ادویہ)
۳۲۲	آنکھ میں کچھ پڑ جانا	۲۸	رشتہ جات ادویہ
۳۵۸	آنکھیں دکھنا	۱۷	فلسفہ ہومیو پیتھی
۲۱۷	آنول کا نہ گرنا	۲۲	مقدار خوراک
۱۱۷	آواز پڑ جانا	۱۵	ہومیو پیتھی کی ابتداء
۲۸۷	اپرس		۱
۱۸۱	انیڈی سائٹس		
۲۲۲	احتلام	۲۸۰	آتشک
۱۲۰	اختلاج قلب	۲۹	آدھا سیسی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۷	بوائی پھٹنا	۲۳۳	اختناق بالرحم
۲۲۹	بول زلالی	۳۹۱	استحاضہ
۹۲	برہ پن	۲۰۱	استسقاء
۱۶۲	بھوک بہت لگنا	۳۸۶	اسقاط حمل
۱۶۰	بھوک مرجانا	۳۶۵	اعصابی درد
۸۰	بھنگا پن	۲۸۲	اکوتہ
۵۵	بے ہوشی	۳۸۵	ام الصبیان کے دورے
پ		۲۳۰	انفلوئنزہ
		۳۹۱	ایام حیض کے علاوہ خون آنا
۶۴	پاگل پن	ب	
۱۰۲	پائو ریا		
۲۸۹	پتی اچھلنا	ب	
۳۳۱	پرسوت کا بخار		
۷۶	پڑ بال	۳۶۹	بچوں کی دق
۴۱۸	پستان کی تکلیفات	۱۵۶	بد ہضمی
۳۶۶	پسلی چلنا	۳۰۳	بہری
۲۹۴	پھوڑا	۲۹۲	بندش حیض
		۱۸۳	یواسیر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۴	تلی کا بڑھ جانا	۲۹۴	پھوڑا پھنسی
ط		۱۶۴	پھیپھڑے کی دق
۳۱۵	ٹائیفائیڈ فیور	۳۶۲	پیٹ کے کیڑے
ج		۱۸۹	بیہوش
۳۱۹	جاڑا بخار	۳۲۱	پیشاب خونی
۷۲	جالا مارا	۲۱۷	پیشاب کا بند ہو جانا
۳۰۹	جذام	۲۱۹	پیشاب کا زہر
۲۴۲	جریان	۸۴	پیس
۲۰۱	جلندھر	ت	
۳۱۰	بھائیں	۳۲۷	تپ دائمی
چ		۳۲۲	تپ دق
۵۱	چکر	۳۲۶	تپ سرخ
۲۸۶	چمبل	۳۲۷	تپ لازمی
۳۴۱	چوٹ اور زخم	۳۲۷	تپ محرکہ
		۲۱۵	تپ شنج
		۲۷۳	تکلیفات دوران حمل
		۳۱۰	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۱	خونی پیشاب	۲۴۸	چھوٹی چھپک (خرہ)
		۲۵۸	چھوٹے جوڑوں کا درد
		۲۴۳	چھپک
۲۸۸	داد	ح	
۱۰۱	دانت کا درد	۱۱۰	حلق کا درم
۳۲۹	دانت نکلنا	۱۰۸	حلق کے غدود کا درم
۳۳۳	درد پہلو	۲۰۳	حیض کا درد سے آنا
۲۶	درد سر	۳۹۲	حیض کا رک جانا
۲۰۳	درد سے حیض آنا	خ	
۲۹	درد شقیقہ		
۲۰۳	درد جگر		
۱۳۷	درد دل	۲۹۱	خارش
۱۲۹	درد قونج	۲۰۶	خارش شرمگاہ
۲۲۳	درد گردہ	۲۴۸	خرہ
۱۵۲	درد معدہ	۱۱۳	خناق و بالی
۱۷۲	دست	۲۰۹	خون کا پھیکا پڑ جانا
۵۹	دماغی پردوں کا درم	۱۹۶	خون کی تے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	س	۵۶	دماغی کمزوری
		۱۳۰	دہ
۷۹	رتوندی	۲۹۷	دنبل
۲۲۳	رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا	۳۵۵	دودھ ڈالنا
۲۷۷	رعشہ	۳۱۸	دودھ کا بخار
	ز	۵۱	دوران سر
		۳۳۳	دورہ کی بیماری
۱۰۰	زبان کا کیفیٹر	۱۲۰	دھڑکن
۲۲۱	زچہ خانہ کا بخار		د
۲۹۸	زخم		
۱۲۷	زخم معده	۱۱۳	ڈفقیریا
۳۰۱	زہر باد	۱۳۳	ڈنگو فیور
۳۲۰	زہریلے جانوروں کا کاٹنا		ذ
	س	۳۶۶	ذات الجنب
		۳۳۳	ذیابیطس
۳۰۵	سرطان		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
ع		۳۰۵	سرطان زبان
		۵۸	سرین پانی بھر جاتا
۶۶۱	عروق النساء	۶۱	سکتہ
غ		۱۲۲	سِل
		۲۳۶	سلسل بول
۵۵	غفلت کی نیند	۱۶۶	سنگرہنی
ف		۳۸۳	سوئے میں پیشاب کر دینا
		۲۳۸	سوزاک
۲۶۸	فاج	۳۶۹	سوکھا
۱۹۲	فتق	۴۳۸	سیلان الرحم
ق		۲۳۸	ضعف باہ
۱۶۸	قبض	۲۲۹	ضعف گردہ
ک		ط	طاعون
۳۰۵	کاربنکل	۴۵۳	
۳۶۶	کالی کھانسی		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۷	گوبا بنجی	۳۷۹	کانچ منگنا
ل	ل	۹۴	کان کا بہنا
		۹۶	کان کا درد
		۹۸	کان کا درم
۳۲۶	لال بخار	۲۱۱	کانور
۳۷۵	لڑکھڑاتی چال	۳۹۸	کثرت حیض
۲۶۱	لنگڑی کا درد	۳۸۱	کرنول (کرم)
۳۲۶	لو لگنا	۵۳	کم خوابی
۴۲۸	لیکوریا	۱۱۸	کنٹھ مالا
م		۳۰۹	کوڑھ
۱۶۴	متلی اور قے	۱۲۰	کھانسی
۶۵	مرگی	۳۱۱	کیل ہا سے
۱۰۴	سورھوں سے پیپ آنا	گ	
۳۱۲	سے		
۳۱۹	میریا	۲۵۴	گٹھیا پائی
۳۵۲	منہ آنا	۳۳۱	گردن توڑ بخار
۱۰۶	منہ کا آکھ	۱۱۶	گلا بیٹھنا
۱۰۸	منہ کے چھالے	۳۸۱	گلسوے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۱	درم خجڑہ	۷۴	موتیا بند
۲۲۵	درم رحم	ن	
۱۸۱	درم زائندہ		
۲۲۶	درم گردہ	۷۳	ناخونہ
۲۵۱	درم مشانہ	۸۴	ناک کی بدبو
۱۲۲	درم مسدودہ	۲۲۶	ناک میں بد گوشت
۲۱۳	وضع حمل	۲۲۸	نامردی
د		۳۲۵	نزلاوی بخار
		۸۹	نزله و زکام
۱۹۸	بچکی	۸۲	نظر کا جاتے رہنا
۳۴۳	ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا	۸۱	نظر کا کم ہو جانا
۶۸	ہڈیان	۲۱۷	نفاس
۱۹۳	ہرنیا	۲۵۸	نقرس
۲۳۳	ہسٹیریا	۸۷	نکسیر
۲۵۷	ہیضہ	۷۳۱	نونیہ
ی		و	
۲۱۱	یرقان	۲۰۷	درم جگر

باب اوّل

ابتدائی مضامین

ہومیو پتی کی ابتداء

ہومیو پتھک طریق علاج کے موجد ڈاکٹر سیمول ہینی مین ہیں (یوں تو اس کا موجد بفراط کہا جاتا ہے) (کہتے ہیں اُس نے ہومیو پتھک طریقہ علاج پر ایک رسالہ بھی لکھا تھا لیکن اُس نے کچھ تجربات بھی کیے یا نہیں اس کا کچھ علم نہیں) ڈاکٹر ہینی مین نے اس کے تجربات اور مشاہدات میں اپنی تمام عمر گزار دی اس لیے ہومیو پتھک علاج کے موجد ہونے کا سہرا انھیں کے سر ہے، ڈاکٹر موصوف ۱۰ اپریل ۱۸۱۷ء کو جرمنی کے صوبہ سیسنی کے ایک موضع مسین نامی میں پیدا ہوئے بیسٹ سال کی عمر میں انھوں نے لاطینی، جرمنی، فرانچ اور یونانی وغیرہ زبانوں میں یدِ طولی حاصل کر لیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ نے ۱۸۳۹ء میں ایلو پتھک علاج کی انتہائی ڈگری ایم۔ ڈی کا امتحان پاس کر لیا۔ اور ڈسٹن میں پریکٹس کرنے لگے۔ وہ کیمسٹری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔

دوران پر کیٹس انھوں نے دیکھا کہ کوئین یعنی سکونا کی چھال جاڑا بخار (طیریا) میں حکمی اثر کرتی ہے۔ انھوں نے سوچا کہ جس طرح سے سکونا ایک واحد دوا جو تپ و لرزہ (طیریا) میں یقینی فائدہ کرتی ہے اسی طرح سے دیگر واحد دوائیں بھی مختلف امراض میں تیر بہدف ضرور ہوں گی پس وہ اسی کی تحقیق میں مصروف ہو گئے ایک روز اتفاقاً یوں ہی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھیں سکونا کا ایک تندہست انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ انھوں نے خود ہی سکونا کو استعمال کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کو سردی سی محسوس ہونے لگی یہاں تک کہ تمام علامات تپ و لرزہ کے نمودار ہو گئے پس ان کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ جو دوا ایک مرض پیدا کر سکتی ہے وہی دوا اس کو دور بھی کر سکتی ہے۔ یہ تھا پہلا تجربہ جس پر ہومیو پتھی کی بنیاد پڑی۔ اس صورت سے تندہست انسانوں کو واحد دوائیں دے کر انھوں نے متعدد عجیب و غریب ادویہ کا انکشاف کیا۔ دوران علاج، انھوں نے یہ بات دیکھی کہ مریضوں کو دوا دینے سے شفا تو ہو جاتی ہے مگر بسا اوقات شروع میں مرض بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مہنی مین نے سوچا کہ دوا کی مقدار کو کم کر کے تجربہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کرنا شروع کیا نتیجہ یہ ہوا کہ جس قدر وہ مقدار کو کم کرتے گئے اسی قدر جلدی شفا ہونے لگی۔ بڑھتے بڑھتے انھوں نے ادویہ کو لطیف شکل میں (ہومیو پتھک اصول پر) دینا شروع کیا چنانچہ جس قدر دوا لطیف تر ہوتی گئی شفا کی بقی قوت اس میں بڑھتی گئی۔ اور اس طرح سے ہومیو پتھک طریق علاج کی ابتدا ہوئی۔

فلسفہ ہومیو پیتھی

ہومیو پیتھی ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں علاج بالمثل (جبکہ ایلو پیتھک علاج کا انحصار "علاج بالضد" پر ہے) یعنی جس قسم کی علامت ہو اسی خاصیت کی دوا۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی حصہ جسم میں سخت جلن محسوس کرتا ہے اور اس جلن میں بالکل مرچ کی سی خاصیت ہے تو اس کی دوا (خواہ مرض کچھ ہی کیوں نہ ہو) کیسکم یعنی مرچ ہی ہوگی یا یوں سمجھنا چاہیے کہ جو دوا ایک تندرست انسان میں خلل یا تبدیلی پیدا کرتی ہے اگر کسی حصہ جسم میں وہی علامات پائی جائیں تو اسی دوا کو لطیف شکل میں دینے سے شفا ہو جاتی ہے۔ دراصل ہومیو پیتھک طریقہ علاج یعنی علاج بالمثل بالکل قانون قدرت کے مطابق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو پتھو ڈنگ مارتا ہے تو مریض سخت ترین جلن اور بے چینی سے تڑپنے لگتا ہے۔ اس جلن کو سینکنے سے پاگرم ادویہ کے لگانے ہی سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی مغموم انسان کے دل سے رنج کے نقوش دور کرنا ہوں تو خود بھی مغموم بن کر اس کے رنج کو ہلکا کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال یہ روز کے مشاہدات ہیں جن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں بالکل یہی حالت ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی ہے جو سراسر قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہے۔ پس قدرت انسانی جسم کے اندر جو علامات پیدا کرتی ہے اگر انھیں

علامات کی دوا استعمال کرادی جائے تو شفا یقینی ہے۔ ایلو پیٹھک ڈاکٹر انہیں علامات کو مختلف امراض کے فرضی نام سے پکارتے ہیں جو سراسر غلطی ہے۔ وہ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ بیماری سے پہلے اس کا سبب کیا ہے کیونکہ متعول بغیر علت کے نہیں ہوا کرتا ہے۔ جب انسان کے جسم میں کوئی تبدیلی یعنی بیماری ہوتی ہے وہ دراصل کسی اصل بیماری کا نتیجہ ہے۔ یا مریض کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ علامات ہیں اس مریض کی پس علامات ہی قدرت کی بولتی ہوئی زبان ہیں جو صاف صاف اظہار کرتی ہیں کہ مریض دراصل "نفس" ہے نہ کہ جسم چنانچہ ایک ہو میو پیٹھ مریض کا علاج کرتا ہے نہ کہ مرض کا۔ جبکہ ایک ایلو پیٹھ محض مادی چیز یعنی جسم کا علاج کر کے یا بہ الفاظ دیگر جسمانی تبدیلی کو دور کر کے مریض کو حقیقی شفا دینے سے قاصر رہتا ہے کیونکہ مادی جسم کا علاج کرنے سے مرض صرف دب جاتا ہے یا اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے جو کسی وقت میں اس سے بھی زیادہ بھیا نک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بظاہر وہ مرض تو اچھا ہو گیا لیکن وہاں سے منتقل ہو کر وہ دوسری جگہ رونا ہو گیا چنانچہ بعض وقت مریض کو خارش کے لیے مرہم دیا گیا تو خارش اچھی ہو گئی مگر دیگر تکالیف رونا ہو گئیں۔ مثلاً سر میں سلسل درد کی شکایت ہو گئی یا ایک خطرناک قسم کا پھوڑا کسی حصہ جسم پر نمودار ہو گیا۔ جب اس پھوڑے کو چیر پھاڑ کر کے درست کیا گیا تو آنکھوں کی بینائی میں فرق آنے لگا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

ایسے بے شمار واقعات ایک ایلو پیتھک ڈاکٹر کے یہاں آئے دن ظہور پذیر ہوا کرتے ہیں۔ گویا ایک ایلو پیتھ صرف جسمانی تبدیلی ہی کو درست کرتا رہتا ہے جس کو وہ اپنی تنگ نظری کے باعث شفا خیال کرتا ہے مگر ایک ہومیو پیتھ بخوبی سمجھتا ہے کہ شفا کا معیار کچھ اور ہی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل مریض ”نفس“ ہے پس اگر نفس یعنی روح کا علاج کیا جائے اُسی وقت میں مکمل اور حقیقی شفا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نفس کے علاج کے لیے کس شکل میں دوا دینی چاہیے۔

پونسی یعنی طاقت ادویہ

یہ بخوبی واضح کیا جا چکا ہے کہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں امراض یعنی مادی جسم کا علاج نہیں ہوا کرتا بلکہ ”نفس“ یعنی ”روح“ کا علاج کیا جاتا ہے۔ روح ایک غیر مادی یعنی لطیف چیز ہے۔ پس لطیف شے کی غذا بھی لطیف ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ اُسے آسانی سے قبول کر لے۔ ظاہر ہے کہ لطیف چیز پر ایک کثیف چیز کا قطعی اثر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ اُسے کسی حالت میں قبول کر سکتی ہے ایسی حالت میں ہم اگر کسی مریض کے لیے کثیف یعنی مادی شکل میں دوا دیں تو وہ ہرگز روح (اصل مریض) کے لیے قابل پذیر نہ ہوگی۔ ایلو پیتھک ڈاکٹر اور اطباء مریضوں کو کثیف شکل میں دوا دے کر ایک قسم کا دوسرا مختلف مرض پیدا کر کے اصل مرض کو دبا دیتے ہیں کیونکہ دوا کی

کثافت کے باعث اصل مرض (روح) پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

دوا کے لطیف ہونے سے یہ مطلب ہے کہ اُس میں ملاؤیت نہ پائی جائے
غیر مادّی شکل کی ادویہ میں ایک برقی اثر پیدا ہو جاتا ہے جو قوتِ حیات کو
متاثر کر کے بیماری کا قلع قمع کر دیتا ہے۔

جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج روحانی
اصول پر مبنی ہے اس لیے اس کی دوا سازی کا طریقہ بھی مخصوص ہے۔
ڈائیلوشن یعنی طاقت میں دوا بنانے کے دو طریقے ہیں ایک تو ڈیسمل
(کسر اعشاریہ) (DECIMAL) $(\frac{1}{10})$ حصہ کے حساب سے اور دوسرا
سینٹسمل (CENTESIMAL) $(\frac{1}{100})$ حصہ۔

ڈیسمل ڈائیلوشن بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ در شکر کا ایک قطرہ اور
مقطر پانی یا ریکیٹفائیڈ اسپرٹ کے ۹ قطرے کسی صاف شیشی میں ڈال کر
پانچ یا دس بار تھکی دیں تاکہ دوا کے اجزاء اچھی طرح سے آپس میں
مل جائیں۔ اب اُس دوا کا پہلا ڈیسمل ڈائیلوشن تیار ہو گیا جس کا نام
 $(1 \times)$ ایک ایکس ہوگا۔ ایکس (x) اس بات کی علامت ہے کہ
دوا کو ڈسمل طریقہ پر تیار کیا گیا ہے۔ اب اگر اسی دوا کا $2 \times$ تیار کرنا
ہے تو $1 \times$ والی دوا کا ایک قطرہ اور مقطر پانی یا ریکیٹفائیڈ اسپرٹ کے
۹ قطرے کسی صاف شیشی میں ڈال کر اُسی طریقہ سے تھکی دیں علیٰ ہذا القیاس۔
سینٹسمل (CENTESIMAL) ڈائیلوشن یعنی پونسی کے بنانے میں
ایک اور ننانوے کا تناسب ہوتا ہے یعنی ایک قطرہ اصل دوا یعنی در شکر

اور ۹۹ قطرے آب مقطر یا الکوحل کے کر کسی صاف شیشی میں ڈال کر حسب معمول تھپکی دیں تو یہ ایک منبر طاقت کی دوا تیار ہو گئی۔ اگر دو منبر طاقت کی دوا تیار کرنا مقصود ہو تو ایک منبر والی دوا کا ایک قطرہ اور ۹۹ قطرے آب مقطر یا الکوحل میں شامل کر کے طریق مذکورہ سے تیار کر لیں علیٰ ہذا القیاس ناظرین کو واضح ہو گیا ہو گا کہ جوں جوں دوا کی طاقت بڑھتی جاتی ہے دوا کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آگے بڑھ کر بظاہر پانی ہی پانی یا الکوحل باقی رہ جاتی ہے لیکن در پردہ اس میں شفا کی برقی طاقت بڑھ جاتی ہے یعنی دوا جس قدر لطیف ہوتی جاتی ہے اس کا اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ پٹنسی تیار کرنے کا کام خاص قسم کی مشینوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ سے تیار کرنے میں وقت زیادہ لگنے کے علاوہ الکوحل بہت ضائع ہوتی ہے۔

بعض دواؤں کی طاقتیں بجائے پانی یا الکوحل میں بنانے کے شوگر آف ملک میں تیار کی جاتی ہیں مثلاً سلیشیا، فیرم فاس وغیرہ۔ پس اگر x طاقت کی دوا بنانا ہو تو ایک حصہ اصل دوا اور نو حصہ شوگر آف ملک لے کر کھل میں تقریباً دو گھنٹے تک گھوٹیں تاکہ اس کے تمام اجزاء خوب مل جائیں۔ اب اگر x تیار کرتا ہو تو x والی دوا کا ایک حصہ لے کر ۹ حصہ ملک شوگر میں بطریق مذکورہ بالا کھل کریں۔

علیٰ ہذا القیاس۔

۵۵۷۵

نوٹ:- جڑی بوٹیوں کے شکچر بنانے میں فارما کو پیا کے مطابق بوتلی میں

بھر کر مقررہ مقدار میں الکوہل ڈال دیتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد چھان لیتے ہیں۔
 باپو کیمک علاج میں (جو ہومیو پیتھی کی ایک شاخ ہے) ڈسمل ٹنسی کا
 طریقہ رائج ہے۔ نیچی طاقتوں میں عموماً 3×6 ، 4×12 اور $30 \times$ کا
 استعمال کیا جاتا ہے۔ اونچی طاقتوں میں $200 \times$ اور $1000 \times$ طاقت
 کی ادویہ مستعمل ہیں۔

ہومیو پیتھی میں عموماً نیچی طاقتوں میں 3 ، 6 ، 12 اور 30 نمبر کی
 دوائیں استعمال ہوتی ہیں۔ اونچی طاقتوں میں 200 ۔ ایک ہزار یعنی (1 M)
 دس ہزار (10 M)۔ پچاس ہزار (50 M)۔ ایک لاکھ (C.M) اور
 دس لاکھ (M.M) نمبر کی دوائیں دی جاتی ہیں۔

مقدار خوراک

ہومیو پیتھک دوا ذیل کی چار شکلوں میں بہ لحاظ عمر مختلف مقدار میں
 دی جاتی ہے:-

- (۱) ٹنگر کی شکل میں۔ ایک بوند سے لے کر بیس بوند تک یا اس سے
 بھی زیادہ بہ لحاظ عمر اور حسب علامت۔ زہریلی اور تیز قسم کی ادویہ کو صرف
 ایک سے لے کر ۵ بوند فی خوراک تک حسب موقع استعمال کرنا چاہیے۔
- (۲) عرق کی صورت میں۔ دوا دینے کا یہ طریقہ ہے کہ کسی صاف
 شیشی میں آب مقطر بھر کر اس میں فی خوراک ایک بوند ڈائیلوٹن ٹپکادیں۔
 لڑکوں کو اس سے نصف اور شیر خوار بچوں کے لیے ایک قطرہ میں چار خوراک۔

(۳) گولیوں میں اگر دوا دینا ہے تو سادی گولیوں کو کسی صاف کاغذ یا شیشی میں ڈال کر اوپر سے چند قطرے ڈائیلوشن کے ڈال دیے جائیں کہ دو گولیوں میں جذب ہو جائے۔ بڑوں کو بیس نمبر کی ۸ گولی فی خوراک اڑکوں کو ۴ اور شیر خوار بچوں کو صرف ایک گولی۔ بیس نمبر کی گولیوں میں اس کی نصف تعداد اور چالیس نمبر میں مندرجہ بالا تعداد کا چوتھائی۔ بہرہ کاظ عمر دینا چاہیے۔ بیس نمبر کی گولی سرسوں کے برابر، تیس نمبر کی ماش یعنی اُرد اور چالیس نمبر کی مٹر کے برابر ہوتی ہے۔

گولیوں کے حسب ذیل نمبر یعنی سائز ہوتے ہیں۔

نمبر پانچ، دس، پندرہ، بیس، پچیس، تیس، پینتیس، چالیس، پینتالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی، نوے اور سو۔ پچاس نمبر سے اونچی اور دس نمبر سے نیچی گولیاں شاذ و نادر ہی استعمال ہوتی ہیں بیس، تیس اور چالیس نمبر کی گولیاں زیادہ مستعمل ہیں۔

(۴) سفوف کی شکل میں دوا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک شوگر میں چند قطرے ڈائیلوشن کے ٹپکا کر اس کو خوب ملا لیں یا اگر ڈیسمل طریقہ پر دوا تیار رکھی ہو تو بڑوں کو ایک گرین یعنی نصف رتی اور بچوں کو اس سے نصف۔

در اصل ہومیو پیتھی میں مقدار خوراک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر مریض کو صرف دو گولیاں دے دی جائیں تو بھی دوا کا وہی اثر ہوگا جو پوری شیشی بیک وقت کھلانے سے۔

نوٹ - یہ بات عام طور سے مشہور ہو گئی ہے کہ پان، سگریٹ استعمال کرنے والے اصحاب پر ہومیو پیتھک دوا اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ خود ناواقف ڈاکٹر ہومیو پیتھک دوا دیتے وقت اپنے مریض کو بار بار تاکید کرتا ہے کہ خبردار دوا استعمال کرنے کے کم از کم ایک گھنٹہ قبل اور ایک گھنٹہ بعد کوئی شے ہرگز استعمال نہ کرے ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ ایسا خیال کرنا سراسر غلطی ہے اور ہومیو پیتھک طریق علاج کو سخت نقصان پہنچانا ہے کیونکہ ہزاروں آدمی محض اس لیے ہومیو پیتھک ڈاکٹر کی طرف نہیں رجوع ہوتے کہ وہ پان، تباکو کے عادی ہیں اور اس لیے ہومیو پیتھک دوا ان کو شفا دینے سے قاصر ہے۔ اس بات کو بخوبی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہومیو پیتھک ادویہ اتنی کمزور نہیں ہوا کرتیں کہ ان کا اثر ذرا سی بات میں چھو منتر کی طرح اُڑ جائے۔ مصنف کا ذاتی تجربہ ہے کہ مریض کے منہ میں پان کے ہوتے ہوئے اس کی زبان پر خالص ڈائیلوشن کا ایک قطرہ ٹپکا دیا گیا اور دوا نے حیرت انگیز کام کیا۔ اسی صورت سے ہمارے ایک شاگرد رشید نے ایک تجربہ کیا۔ انھوں نے سگریٹ پر چند قطرے دوا کے ٹپکا کر مریض کو وہی سگریٹ پینے کی ہدایت کی جس کے نتائج نہایت عمدہ برآمد ہوئے۔

یوں تو ہر شخص جانتا ہے کہ نشیلی اشیاء کا ترک کر دینا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ مگر اس قسم کی روایات سے عوام میں ہومیو پیتھی کی طرف سے ایک بدگمانی سی پیدا ہو گئی ہے جس کے باعث اس فن کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔

انتخاب پٹنسی اور وقفہ خوراک

پٹنسی کے انتخاب کے مسئلہ میں کافی اختلاف ہے۔ ڈاکٹر ہنی مین نے عموماً تیس نمبر کی طاقت استعمال کی ہیں۔ بعض ڈاکٹروں نے چھوٹی طاقتوں نمبر ۳، نمبر ۶ اور مدرٹنکچر سے کام لیا ہے اور بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔ امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے ہمیشہ دو سو اور ایک ہزار یا اس سے بھی اونچی طاقت میں دوائیں استعمال کی ہیں اور اچھی خاصی کامیابی حاصل کی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ادویہ کی طاقت کا انتخاب محض ڈاکٹر کے تجربے پر ہے بعض بعض دوائیں اونچی طاقت میں بہتر کام کرتی ہیں اور بعض نیچی طاقت میں۔ کچھ دوائیں ٹنکچر کی شکل میں اچھا کام کرتی ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر دوا کا انتخاب صحیح ہے تو کوئی بھی طاقت استعمال ہو سکتی ہے۔

عام طور پر چھوٹی طاقتوں میں ۶ یا ۳۰ نمبر کی دوائیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ دو چار روز تک دوا دینے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ دوا کا انتخاب صحیح ہے لیکن دوا سستی سے اثر کر رہی ہے ایسی حالت میں دوا کی اونچی طاقت دینی چاہیے۔

حاد امراض میں عموماً چھوٹی ہی طاقتیں بہتر کام کرتی ہیں۔ جن کو جلد جلد حسب علامت دہرا سکتے ہیں۔ شدت مرض کی حالت میں دس دس منٹ یا نصف گھنٹہ یا ایک ایک گھنٹہ کے بعد حسب موقع دہرانا چاہیے ورنہ

معمولی حالات میں دن میں چار بار دینا چاہیے۔ بعض حالات میں حاد امراض میں نہایت اونچی طاقتوں کو بار بار دہرانا ہوتا ہے جس کے لیے تجربہ کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے۔

مزمن یعنی کُنہ امراض میں اونچی طاقت کی دوائیں استعمال ہوتی ہیں۔ نمبر ۲۰۰ طاقت کی دوا کو آٹھویں روز دہراتے ہیں۔ نمبر ایک ہزار کو دسویں یا پندرھویں روز اور اس سے اونچی طاقتیں ایک ایک مہینہ یا اس سے بھی زائد وقت کے لیے کافی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اگر ضرورت ہو تو اس سے قبل بھی دوا کو دہرایا جاسکتا ہے۔

رشتہ جات ادویہ

ہومیو پیتھک ادویہ نباتات، جمادات، حیوانات اور سمیات وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہیں۔ ان سب میں آپس میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض ادویہ ہم جنس ہیں اور بعض غیر جنس۔ بعض ادویہ کے اثرات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض کے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

(۱) بعض دوائیں ایک دوسرے کے اثر کی تکمیل کرتی ہیں۔ ایسی ادویہ ایک دوسرے کے بعد عموماً دی جاتی ہیں تاکہ دوا کے اثر میں اور بھی تیزی ہو جائے مثلاً سلفر اور نکس۔ بیلا ڈونا اور کلگیریا وغیرہ۔ اس قسم کا رشتہ رکھنے والی دوائیں معاون (COMPLEMENTARY) کہلاتی ہیں۔

(۲) بعض ادویہ پیداؤش میں مختلف ہوتی ہیں مگر اثرات میں یکساں۔
ایسی ادویہ ایک دوسرے کے بعد دی جاسکتی ہیں۔ اس قسم کی دوائیں
مشابہہ (CONCORDANT) کہلاتی ہیں مثلاً سیچیا و پلسا ٹیلا —
مرک اور بیلا ڈونا وغیرہ —

(۳) کچھ دوائیں دوسری دوا کے موجودہ اثر کو زائل کر دیتی ہیں۔
چنانچہ ایسی دواؤں کو صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جبکہ پہلی دوا کے
اثر کو زائل کرنا مقصود ہو۔ ایسی ادویہ فاد یا تریاق (ANTIDOTE) کہلاتی
ہیں مثلاً مرک دینے سے ہیپر کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور کافیا سے
نکس و امیکا کا اثر ختم ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ —

(۴) بعض ادویہ بظاہر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہیں
لیکن آپس سخت مخالف ہوتی ہیں ایسی ادویہ ایک دوسرے کے بعد
ہرگز نہ دینا چاہیے۔ ایسی دواؤں کو مخالف (INIMICAL) کہتے
ہیں۔ مثلاً مرک و سلیشیا — رٹاکس و اپیس وغیرہ وغیرہ —



نقشہ رشتہ جات ادویہ

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد کو دی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
آرسنک	پیٹریم سلف فاسفورس کاربوج تھوجا	ایس۔ بیلا ڈونا۔ چیلیڈونیم کیمو ملا۔ چائنا۔ فیرم۔ ہیپر۔ اپیکاک۔ آئیوڈیم کالی بانی۔ لائیگو۔ مرک۔ نکس و امیکا۔ سلفر۔	کیمفر۔ چائنا۔ چائنا سلف فیرم۔ ہیپر۔ آئیوڈیم اپیکاک۔ سلفر۔ گرفیٹس۔ نکس و امیکا	
آرنیکا	اکوناٹ	آرسنک۔ اکوناٹ۔ برالی اونیہ۔ بیلا ڈونا۔ کھکیریا۔ کیمو ملا۔ چائنا۔ ہیپر۔ اپیکاک۔ آئیوڈیم۔ نکس و امیکا۔ پلساٹیلہ۔ رسٹاکس۔ فاسفورس۔ سلفر۔	اکوناٹ۔ آرسنک۔ چائنا۔ اگنیشیا۔ اپیکاک۔ کیمفر۔	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد کو دی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر نازل کرتی ہے)	مخالف
اپیکاک	کیوپرم	آرسنک - آرنیکا - انٹیم ٹارٹ - بیلادونا - برائی اونیٹا - کلکیریا - چائٹنا - کیوملا - کیوپرم - انگنیشیا - نکس وامیکا - سلفر - فاسفورس - پلسا ٹیلا - سیپیا - ورٹیرم -	آرسنک - آرنیکا - چائٹنا - ٹوبیکم - نکس وامیکا	
ارٹیمسٹ ارٹیمسٹ		کلکیریا - پلسا ٹیلا - سیپیا - کالی کارب - کلکیریا - مرک - پلسا ٹیلا - سیپیا - سلیشیا - مرک - پلسا ٹیلا - سیپیا - کالی کارب - کلکیریا - مرک - پلسا ٹیلا - سیپیا - سلیشیا - مرک - پلسا ٹیلا - سیپیا - کالی کارب - کلکیریا - مرک - پلسا ٹیلا - سیپیا - سلیشیا -	مرک - پلسا ٹیلا - آرسنک - کلکیریا - آئیوڈیم - لائیگو - مرک - نیٹریم میور - پلسا ٹیلا - فاسفورس - رسٹاکس - سیپیا - سلفر - سلیشیا -	
اکونائٹ سلفر	کانیا	آرسنک - آرنیکا بیلادونا - کینٹھرس - اپیکاک - مرک - پلسا ٹیلا - رسٹاکس - سلفر - سلیشیا -	ایٹاک ایڈ - بیلادونا - پیرس - شراب -	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد کو دی جاتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کر دیتی ہے)	مخالفت
اگنیشیا	نیٹریم میوہ	آرستک - بیلادونا - گلگیریا - چائنا - لائیکو - نکس و امیکا - پلسا ٹیلا - رٹاکس سلفر - سیپیا - سلیشیا -	آرنیکا - کیمو ملا - کیمفر - کافیا - نکس و امیکا - پلسا ٹیلا -	ٹو سیکم
انٹیمارٹ		اپیکاک - کالی بانی - پلسا ٹیلا - سلفر - سیپیا	اسافوٹیڈا - چائنا - اپیکاک او پیٹیم - پلسا ٹیلا - رٹاکس سیپیا - ایکسیس نیکٹکالائیڈ	
انٹم کرود	سکوٹیل	گلگیریا - ایکسیس - مرک - پلسا ٹیلا - سلفر - سیپیا -	گلگیریا - ہیپر - مرک -	
اد پیٹیم		اکونائٹ - انٹیمارٹ - بیلادونا - برائی او نیا - ہیوٹمس - نکس و امیکا - نکس موسکاٹا -	بیلادونا - کیمو ملا - اپیکاک - نکس و امیکا - دریٹرم -	
اورمٹ		اکونائٹ بیلادونا - گلگیریا - چائنا - لائیکو - مرک - پلسا ٹیلا - رٹاکس - سلفر - سیپیا -	بیلادونا - چائنا - کافیا - مرک - پلسا ٹیلا - پانی جلیا -	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں ی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
ایمپس	نیٹرم میور	آرسنک - گریفائٹس - لائیکو - پلسا ٹیلا - سٹرامونیم سلفر -	ایپیکاک لیکسیس - ایکٹاک ایڈ - فاسفورس	رٹاکس فاسفورس
برائی اونیا	ایومنا	ایومنا - آرسنک بیلا ڈونا - کاربودج - ڈروسراہیموس - کالی کارب - نکس و امیکا - فاسفورس پلسا ٹیلا - رٹاکس - سیپیا - سلفر سیلیشیا -	اکونائٹ - ایومنا - کیمفر - کیموٹلا - کافیا چیلیڈونیم - انگیشیا - نکس و امیکا - پلسا ٹیلا - رٹاکس -	
بیلا ڈونا	کلکیریا	اکونائٹ - آرسنک - کلکیریا - کیموٹلا - کاربودج - چائنا ڈولمارا - ہیمپر - ہیموس لیکسیس - مرک - نکس و امیکا - پلسا ٹیلا - رٹاکس - سیپیا - سلفر - سیلیشیا -	اکونائٹ - کیمفر - کافیا - ہیموس - ہیمپر - اوپیم - پلسا ٹیلا -	
پاڈوفالم	سلفر		مرک	نکس اس کا اثر رک جاتا ہے نکس و امیکا

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں ی جاتی ہیں)	خفاہ (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالفت
پلسا ٹیلا	لائیکو سلیشیا	آرسنک - انٹم ٹارٹ - بیلادونا - برائی اونیا - مریفائنٹس - اگنیشیا کالی بانی - لائیکو سلفر نائٹرک ایسڈ - ٹیکسٹامیکا فاسفورس - رسٹاکس سیپیا	کافیا - اگنیشیا - ٹیکسٹامیکا - کیمو ملا -	
کھوجا	آرسنک سلیشیا نیٹریم سلف	اگنیشیا - کلکیریا - کالی کارب - لائیکو - مرک - پلسا ٹیلا - سلفر -		
جلیمیم		بیٹھیشیا - اپیکاک	چائنا - کافیا - نیٹریم سیور	
چائنا	فیرم	آرسنک - آرنیکا - بیلادونا - کاربودج - کلکیریا - فیرم - لیکیس - مرک - پلسا ٹیلا - فاسفورس سلفر -	آرنیکا - آرسنک - ایپس - ڈیجیٹلیس کوئیم سلیمیم کے بعد	
دوسرا	ٹیکسٹامیکا	کلکیریا - سنا - پلسا ٹیلا - سلفر - دریشم	کیمفر -	

نام دوا	معاون	مشاہد (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	فائدہ (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالفت
ڈنگارا	برشیا کارب	بیلادونا - کلکیریا - لائیکو - رٹاکس سیپیا - سیکسین	کیوفر - کیورپم - ایپیکاک - مرک	
ڈیجیٹلس	.	بیلادونا - برائی اونیٹا - کیوٹا - چائنا - لائیکو - اوپیم - نکس واما - فاسفورس - پلساٹیل - سلفر - سیپیا - ورٹیرم -	ایپس - کیوفر - کا - چیکم - نکس - امیکا - نائٹرک ایسڈ - اوپیم -	
رٹاکس	برائی اونیٹا	آرنیکا - بیلادونا - برائی اونیٹا - کلکیریا - کیوٹا - ڈرڈسرا - گریفائٹس - ہیوٹمس - مرک - نکس واما - پلساٹیل - فاسفورس - سلفر - سیپیا -	بیلادونا - برائی اونیٹا - کیوفر - کافیا - گریفائٹس - سلفر - سیپیا -	ایپس
پانی جلیا		آرنیکا - اکوٹائٹ - آرنیکا - بیلادونا - ڈیجیٹلس - کلکیریا - کالی کارب - نکس واما - پلساٹیل - رٹاکس - سلفر - سیپیا -	اورم - پلساٹیل -	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	قائد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
سینجیا	.	برائی ادویا - کاربودج - کیمفر - ہیپر نکس و امیکا - فاسفورس پلسا ٹیلا -		
سٹرامونیم	.	اکونائٹ بیلادونا - برائی ادویا کیو پریم - ہیپر نکس و امیکا - اویم - پلسا ٹیلا -	بیلادونا ہیپر نکس و امیکا -	
سلفر	ایلو آرسنک اکونائٹ نکس و امیکا	اکونائٹ - ایوٹنا بیلادونا - برائی ادویا کلیریا - کاربودج - گرفائٹس - مرک - نائٹرک ایسڈ نکس و امیکا - فاسفورس - پلسا ٹیلا - رشاکس - سیپیا -	اکونائٹ - کیمفر - کیمولا - چائنا - مرک - پلسا ٹیلا - رشاکس - سیپیا - سلیشیا - تھوجا -	کلیریا کے بعد
سلفورک ایسڈ	پلسا ٹیلا	آرنیکا - کلیریا - لائیکو - سلفر - سیپیا -	کیمفر -	
سلیشیا	پلسا ٹیلا تھوجا	آرسنک - بیلادونا - کلیریا - ہیپر - لائیکو - لیکیس نکس و امیکا - فاسفورس - رشاکس پلسا ٹیلا سلفر - سیپیا	ہیپر - کیمفر -	مرک

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں ی جاسکتی ہیں)	فاو (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
سنا	.	گلگیریا۔ چائنا۔ اگنیشیا۔ نکس و امیکا۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔ سلیشیا۔	کیمفر۔ کیپسکم۔ چائنا۔	
سیپیا	نیٹرم میور	گریفائیٹس۔ لائیگو۔ نکس و امیکا۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔ سیلفر۔ سلیشیا۔	اکونائٹ۔ سلفر۔	لیکیس
فاسفورس	آرسنک	آرسنک۔ برائی اونیا۔ بیلادوونا۔ کاربودج۔ چائنا۔ گلگیریا۔ لائیگو۔ نکس و امیکا۔ سلفر۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔ سلیشیا۔ سیپیا۔	کافیا۔ نکس و امیکا۔ سیپیا۔	ایلیس کاشکم
فامفورکائیٹ	.	آرسنک۔ بیلادوونا۔ چائنا۔ کاشکم۔ فیرم۔ لائیگو۔ نکس و امیکا۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔ سیپیا۔ سلفر۔ سلفر۔ ورٹرم۔	کیمفر۔ کافیا۔	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
فیرم	ایلو منا چائنا پامیلٹس	آرنیکا۔ اکوناٹ۔ بیلادونا۔ چائنا۔ لائیکو۔ مرک۔ پلساٹیل۔ فاسفورس۔ سلفر۔ ورٹیرم۔	آرنیکا۔ بیلادونا۔ آرسنک۔ چائنا۔ ہیسپر۔ اپیکاک۔ پلساٹیل۔ ورٹیرم۔	
کاربودج	ڈر دسرا	آرسنک۔ اکوناٹ۔ چائنا۔ ڈر دسرا۔ کالی کلرب۔ لائیکو۔ مرک۔ نکس واما۔ پلساٹیل۔ سلفر۔ سیپیا۔	آرسنک۔ کیمفر۔ کافیا۔ لیکسیس۔	کاربودج
کاسٹم	کالورنٹہ پروسیلیم	انٹیم ٹارٹ۔ کلکیریا۔ لائیکو۔ نکس واما۔ پلساٹیل۔ رٹاکس۔ سلفر۔ سیپیا۔	کافیا۔ کالورنٹہ۔ نکس واما۔	فاسفورس کافیا
کافیا	اکوناٹ	اکوناٹ۔ اورم۔ بیلادونا۔ لائیکو۔ نکس واما۔ اویٹیم۔ سلفر۔	اکوناٹ۔ کیموٹلا۔ اگنیشیا۔ مرک۔ نکس واما۔ پلساٹیل۔ سلفر۔	کیمینٹرس اگنیشیا کاسٹم
کاپیکم		کاربودج۔ مرک۔ پلساٹیل۔ رٹاکس۔ سیپیا۔	بیلادونا۔ کیمفر۔ نکس واما۔ پلساٹیل۔	

تمام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں ی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
کالوسٹھ	.	بیلادونا - برائی اونیا - کاسٹم - کیمو ملا - مرک - نکس و امیکا - پلساٹیل - سپاٹی جیلیا - اسٹانی سگریا	کیمفر - کافیا - اسٹانی سگریا	
کالی بانی	.	انٹم ٹمارٹ - آرسنک لیکسیس - پلساٹیل	آرسنک لیکسیس - پلساٹیل	
کالی کارب	کاربودج نکس و امیکا	آرسنک - کاربودج - لائیگو - ٹائٹریک ایڈ - فاسفورس - پلساٹیل - سپیا - سلفر -	کیمفر - کافیا -	
کریانوٹ	.	آرسنک - بیلادونا - کلکیریا - کالی کارب - لائیگو - نکس و امیکا ٹائٹریک ایڈ - رٹاکس - سلفر - سپیا -	اکونائٹ - نکس و امیکا - کاربودج کے بعد	
کلکیریا کارب	بیلادونا رٹاکس	بیلادونا - ڈر دوسرا - اپیکاک - گریفائٹس - لائیگو - ٹائٹریک ایڈ - نکس و امیکا پلساٹیل - فاسفورس رٹاکس - سپیا - سلیشیا -	برائی اونیا - کیمفر - چائنا - آئیوڈیم - ٹائٹریک ایڈ - نکس و امیکا - سلفر - سپیا -	کالی بانی کے بعد

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	فائدہ (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
کن بلسٹاٹووا	.	بیلادونا - ہیوس - لائیکو نکس و امیکا - اوپیم - پلساٹیل - رٹاکس -	کیمفر	
کیمفر	.	آرسنک - انٹم ٹارٹ - بیلادونا - نکس و امیکا - اوپیم - فاسفورس رٹاکس -		
کیمو ملا	بیلادونا	کلکیریا - مرک - انگیشیا کارب - اکونائٹ - آرنیکا - بیلادونا - برائی ادنیا - نکس و امیکا - پلساٹیل - رٹاکس سیلفر - سیپیا -	اکونائٹ - الیومنا - بورکس - کیمفر - کافیا - کالوسنتہ - انگیشیا - نکس و امیکا - پلساٹیل -	
کیوپریم	کلکیریا	آرسنک - بیلادونا - کلکیریا - کاسٹم - ہیوس - پلساٹیل - سٹرا منیم - ورٹیرم -	بیلادونا - کیمفر - چائنا - ڈاکٹارا - ہیوس - اپیکاک - مرک نکس و امیکا - پلساٹیل - سٹرا منیم - ورٹیرم -	
گریفٹس	آرسنک	نیٹر م سلف - سیلیشیا - کاسٹم - فرم ہیوس - لائیکو	اکونائٹ - آرسنک - نکس و امیکا -	

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں ی جکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالف
لائیکو	.	بیلادونا - برائی ادنیا - کاجیکم - ڈرومرا - گریفائٹس - ہیوسس - کالی کارب - لیکسیس - پلساٹیل - نکس و امیکا - فاسفورس - پلساٹیل - سٹرامونیم - سلیشیا - سیپیا - ورٹیرم -	اکونائٹ - گیمفر - کاشکم - کیروملا - کافیا - گریفائٹس - پلساٹیل -	کافیا
لیکسیس لائیکو ناٹک ایڈ	ہیوسس	آرسنک - اکونائٹ - الیومنا - بیلادونا - کاربودج - کاشکم - چائنا ہیوسس - ہیوسس - کالی بائی - لائیکو - مرک نکس و امیکا - فاسفورس - سلفر - پلساٹیل - رٹاکس - سلیشیا -	آرسنک - بیلادونا - کاربودج - مرک - اوپیم - سیپیا	امونیا کارب سیپیا
مرک	.	آرسنک - بیلادونا - گلکیریا - کاربودج - ہیوسس - آئیوڈیم - لائیکو - ناٹک ایڈ - فاسفورس - پلساٹیل - سلفر - رٹاکس - سیپیا - قلعو جا -	آرسنک - اورم - بیلادونا - کاربودج - چائنا - ڈوکلارا - فیرم - ہیوسس - لیکسیس - اوپیم - ناٹک ایڈ - سلفر - سٹرامونیم - سیپیا	سلیشیا

نام دوا	معاون	مشابہ (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	خاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالفت
ٹاسٹرک ایڈ آرٹک		آرنیکا - بیلادونا - کلکیریا - کاربودج - کالی کارب - کریازوٹ - مرک - فاسفورس پلسا ٹیلا - سلفر - سلیشیا - سیکیل - سیپیا - تھوجا -	کلکیریا - کونیم - میپیر - مرک - سلفر -	لیکسیس یا کلکیریا کے بعد
ٹکسٹامیکا	کالی کارب سلفر سیپیا	آرسنک - بیلادونا - برائی اونیٹا - کاربودج - کاپچیکم - ہیپس - لائیکو - فاسفورس - پلسا ٹیلا - رٹاکس - سلفر - سیپیا -	کیمو ملا - آرسنک - کافیا - اکونائٹ - اوپیم - گنیشیا پلسا ٹیلا - تھوجا -	زخم
نیٹرم سلف	آرسنک تھوجا			
نیٹرم کارب	.	کلکیریا ٹکسٹامیکا - ٹاسٹرک ایڈ پلسا ٹیلا - سلفر - سیپیا -	تھوجا - کیمفر	
نیٹرم میور	ایٹپس سیپیا	برائی اونیٹا - کلکیریا - کالی کارب - پلسا ٹیلا - رٹاکس - سلفر - سیپیا -	آرسنک - فاسفورس - کیمفر -	

نام دوا	معائن	مشابہ (جو بعد میں دی جاسکتی ہیں)	فاد (جن کا اثر زائل کرتی ہے)	مخالفت
ورٹرم		آرنیکا - آرنیکا - اکونائٹ - بیلادونا - چائٹا - کاربودج - کیموطلا - کیوپرم - ڈرودسرا - سلفر - اپیکاک - پلسا ٹیلا - رٹاکس - سیپیا -		
ہامیلین	فرم			
ہیپری	کیلنڈرولا	اکونائٹ - آرنیکا - برائی اونیا بیلادونا - آئیوڈیم - لیکسیس مرک - نکس - امیکا - پلسا ٹیلا رٹاکس - سیپیا - پینیا - سلیشیا - سلفر -	بیلادونا - کیموطلا - سلیشیا -	پینیا
ہیوسکس		بیلادونا - پلسا ٹیلا - رٹاکس سٹرامونیم - ورٹرم -	بیلادونا - چائٹا - سٹرامونیم	
یونینویم پرت		نٹرم میور - سیپیا -	کیکٹس - سٹا	
یونفریشیا	اکونائٹ - کونیم گلگیریا - نکس - فاسفورس پلسا ٹیلا - رٹاکس - سلیشیا رٹاکس - سلیشیا -	اکونائٹ - گلگیریا - کونیم نکس - امیکا - فاسفورس - فاسفورس پلسا ٹیلا - رٹاکس - سلیشیا رٹاکس - سلیشیا -	کیمفر - پلسا ٹیلا - کاسٹکم	

معالج کے لئے ضروری ہدایات

۱۔ معالج کو چاہیے کہ مریض کے ساتھ نہایت ہمدردی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے تاکہ اُس کو یقین کامل ہو جائے کہ معالج اس کا سچا ہمدرد اور ہی خواہ ہے۔

۲۔ ڈاکٹر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریضوں کی بے لوث خدمت کرے۔ لالچ اور طمع سے ڈاکٹر کے خلوص میں فرق آجاتا ہے یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ہاتھ سے شفا بھی چھین لیتا ہے۔

۳۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو پورا یقین دلادے کہ وہ بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ اُس کے سامنے کوئی بات اشارۃً یا کنایۃً ایسی نہ کہ جس سے اُس کو مایوسی ہو اور اُس کی قوتِ حیات کمزور پڑ جائے کیونکہ دراصل قوتِ حیات بہ الفاظِ دیگر مریض کی طبیعت اور بیماری میں باہم جنگ ہوتی رہتی ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آجاتا ہے وہ فتحیاب ہوتا ہے۔ اگر طبیعتِ بیماری پر غالب آگئی تو مریض صحت یاب ہو جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ بیماری طبیعت (قوتِ حیات) پر غالب آگئی تو مریض موت سے ہٹکار ہو جاتا ہے۔

۴۔ معالج کو مریض کی پوری ہسٹری غور سے سُنانا چاہیے۔ کیونکہ

بسا اوقات کسی پرانی بیماری کے اثرات مابعد سے چند نئی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیچیدگیاں رونما ہوتی ہیں۔ چنانچہ اگر تمام مجموعی علامات کو مد نظر رکھ کر غور کے ساتھ دوا تجویز کی جائے تو نہ صرف نئی علامتیں دور ہو جاتی ہیں بلکہ چھپے ہوئے کُنہ امراض کا بھی ہمیشہ کے لیے قلع قمع ہو جاتا ہے۔

۵۔ علامات حاصل کرتے وقت مرض کی کمی بیشی، گھٹنے بڑھنے کا وقت، سردی یا گرمی کے اثرات، دُکھ درد کا صحیح مقام، درد کی نوعیت (مثلاً درد جلن دار، شکم والا، پھاڑنے والا وغیرہ) پر پورا دھیان دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پیشاب پاخانہ کی کیفیت کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے۔

۶۔ نسخہ تجویز کرتے وقت مریض کا پیشہ، بود و باش اور دیگر ضروری امور خانگی سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اُس کے چہرے، چال ڈھال، مزاج، انداز گفتگو اور جسم کی ساخت یعنی (CONSTITUTION) کا بھی بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ مزاج سے مطلب ہے علیم الطبع، زود رنج، حساس، غصہ ور، چڑچڑا، جلد باز، موٹا پھللا بدن والا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے بعض لوگ دموی، صفراوی، اعصابی یا سوداوی مزاج کے ہوتے ہیں۔ غرض کہ مندرجہ صدر تمام باتوں پر غور کر کے نسخہ تجویز کرنا چاہیے کیونکہ بسا اوقات بعض مریض بذات خود کسی واحد

دوا کی مکمل تصویر ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کو اگر وہی دوا تجویز کر دی جائے تو شفا یقینی ہے بلکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اُس دوا کی صرف ایک ہی خوراک سے مرض کا ہمیشہ کے لیے قلع قمع ہو گیا۔

۷۔ معالج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مریض کی نبض، زبان اور حلق کا بھی معائنہ کرے اور آلہ اسٹتھسکوپ سے سینہ اور قلب کو بغور دیکھے تاکہ مریض کی اندرونی قوت کا بھی صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ بذاتِ خود مریض کو اطمینان ہو جائے کہ معالج نے اُس کا نہایت غور سے معائنہ کیا ہے۔

۸۔ مریض کی مجموعی علامات کو ذہن نشین کر کے دوا تجویز کرنا چاہیے۔ جس مریض میں کسی دوا کی جتنی زیادہ علامتیں پائی جائیں گی اتنی ہی جلدی مریض کو شفا ہوگی لیکن اگر بیک وقت تمام علامتوں کے ملنے میں دشواری ہو رہی ہو تو کم از کم تین نمایاں علامات ضرور حاصل کرنا چاہیے۔

۹۔ مریض کو ہدایت کی جائے کہ وہ دوا لینے سے قبل اپنے منہ کو کُلی اور غارہ سے خوب صاف کر لے اور دوا لیتے وقت متباکو، عطر اور تیز خوشبو اور بدبو سے حتی الامکان دُور رہے۔ اگر ممکن ہو تو دوا لینے سے نصف گھنٹہ پہلے اور نصف گھنٹہ بعد تک کوئی چیز نہ کھائے۔

نوٹ:- لیکن مصنف کا تجربہ ہے کہ ہومیو پیتھک دوا ہر حالت میں فائدہ کرتی ہے بشرطیکہ دوا کا ذائقہ زبان کو محسوس ہو جائے۔ مثلاً اگر کسی

مریض کے منہ میں پان ہے اند اُسی حالت میں اُس نے ہومیو پیتھک دوا کھالی تو اگر مریض کو دوا کے ذائقہ کا احساس ہو گیا یعنی اگر پان کے ذائقہ دوا کا ذائقہ غالب آ گیا تو دوا ضرور فائدہ کرے گی۔ اس لیے پان اور سگریٹ سے شوق رکھنے والے اصحاب ہومیو پیتھی سے قطعی بد دل نہ ہوں۔ بلکہ اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائیں۔ ویسے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ پان، بیڑی، سگریٹ، تنباکو، بھنگ وغیرہ وغیرہ تمام منشیات سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔

JALALI BOOKS

باب دوم

امراض سر اور دماغ

درد سر

HEADACHE

اسباب :- درد سر کے بے شمار اسباب ہیں۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سر میں درد کا ہونا کسی خاص مرض کی ایک علامت ہے۔ پس اگر اصل مرض کو رفع کر دیا جائے تو درد سر خود بخود غائب ہو جائے گا۔ اکثر قبض ہو جانے کی حالت میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کبھی اس کی خاص وجہ عصبی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ نزلہ، زکام، بخار، خرابی جگر۔ امراض مفاصل اور آتشک وغیرہ امراض کے سبب سے بھی درد سر ہو جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات دماغ یا آنکھ پر زیادہ زور پڑنے کی وجہ سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔

علامات :- درد سر مختلف طریقوں کا ہوا کرتا ہے۔ کبھی سر میں اس شدت کا درد ہوتا ہے کہ مریض پاگل کی مانند ہو جاتا ہے۔

کبھی نوبت نہ نوبت درد ہوتا ہے۔ بعض وقت سر میں بھاری پن معلوم ہوتا ہے جس کو حرکت دینے سے سخت تکلیف ہوتی ہے بعض حالات میں درد گوشت میں اور سر کی جلد میں ہوتا ہے اور کبھی صرف کنپیٹیوں اور ابرو میں۔

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب کو معلوم کر کے پرہیز بتائیں۔ چنانچہ اگر محض کمزوری کے باعث درد ہوتا ہو تو مقوی اشیاء اور پھل وغیرہ استعمال کرنے کی تاکید کریں۔ اگر معدہ کی خرابی سے ہو تو لطیف اور زود ہضم غذا دیں۔ اگر اس کا اصل سبب آتشک ہو تو اس کے مطابق پرہیز بتائیں۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں اکونائٹ دینا چاہیے بشرطیکہ درد شدید ہو۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ آنکھوں کے راستے بھیجا نکل پڑے گا۔ نیز اُسٹھے پر چکر معلوم ہو۔

(۲) تپکن کا درد سر ہو۔ درد کی شدت سے مریض کا چہرہ تہمتا ہوا ہو۔ مریض روشنی نہ برداشت کر سکے۔ نزلہ یک دم بند ہو گیا ہو تو ہیلما ڈونا دینا چاہیے۔

(۳) درد سر جس کی زیادتی حرکت سے (چلنے سے یا سر کو ہلانے سے) ہو۔ دبانے سے آرام ملتا ہو۔ ہونٹ خشک ہوں۔ ناک گاڑھی قسم کی نکلے۔ تو برائی اونیا دینا چاہیے۔

(۴) اگر معدہ کی خرابی سے درد ہو۔ مریض کو قبض ہو نزلہ یک گیا ہو

یا دماغی محنت کی وجہ سے درد سر ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۵) مریض کو متلی معلوم ہوتی ہو۔ غذا کی بد پرہیزی سے درد سر ہو گیا ہو۔ مریض ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرے۔ پیاس نہ ہو تو پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔

عصابی درد کے لیے حلیم۔ اگنیشیا۔ سپانی جیلیا اور نکس و امیکا بچوٹی پر کی دوائیں ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

(۶) ہسٹیریا لے مزاج والی عورتوں میں درد سر، نگاہ میں دھندلا پن معلوم ہو تو حلیم دینا چاہیے۔

(۷) دھوپ سے پیدا شدہ درد سر، حیض رک جانے سے درد سر، متلی اور غنودگی میں لکیسیس مفید ہے۔

بایو کیمک میں کالی فاس۔ فیرم فاس یا میگنیشیا فاس یا نٹرم میو دینا چاہیے۔

(۸) اگر درد سر حیض کے زمانے میں ہو یا کسی درمی کیفیت کے باعث ہو۔ پھرہ اور آنکھوں میں تہماہٹ ہو تو فیرم فاس دینا چاہیے۔

(۹) اگر درد سر اعصابی ہو یا نوبتی اور دورے کی شکل میں ہوتا ہو گرمی سے سکون ملتا ہو تو میگنیشیا فاس دوا ہے۔

(۱۰) کالی فاس ان سر کے دردوں کے لیے مفید ہے جو دماغی محنت کی وجہ سے ہوں یا جن کے ساتھ بے خوابی پائی جائے۔

(۱۱) اعصابی درد سر، نوجوان لڑکوں یا لڑکیوں کا درد سر یا بوجھ پر

پہنچنے پر منہ، آنکھ یا ناک سے رطوبت کی زیادتی ہو اور طلوع آفتاب سے شروع ہو اور غروب آفتاب کے وقت جائے۔ نیٹرم میور دینا چاہیے۔
 اگر مندرجہ صدر او یہ کافی نہ ہوں تو چائنا۔ کوکولس۔ گلوٹائن۔
 آئرس۔ سپائی جیلیا۔ ایسڈ فاس۔ سیپیا اور کافی وغیرہ میں سے
 کوئی دوا حسب علامت دینا چاہیے۔

درد شقیقہ

HEMI CRANIA

اسباب :- اس مرض کے کئی اسباب ہیں جو رتوں میں بعض اوقات کثرت حیض سے یا کمزوری یا ہسٹیریا کی وجہ سے درد شقیقہ کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ کثرت مجامعت۔ امراض گردہ اور بعض امراض چشم وغیرہ اس مرض کے خاص اسباب ہوا کرتے ہیں۔ بد ہضمی۔ کمزوری۔ خرابی خون۔ بے خوابی اور تیر روشنی کے سبب سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔
 علامات :- یہ درد عموماً نصف سر میں ہوتا ہے جو نوبتی قسم کا ہوتا ہے۔ نصف سر کے علاوہ یہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے۔ مریض کو شور و غل اور روشنی سے حد درجہ تکلیف ہوتی ہے۔ درد اس شدت کا ہوتا ہے کہ مریض نیم بمل کی طرح تڑپا کرتا ہے۔ ذرا سی حرکت سے درد کی زیادتی ہوتی ہے۔ کانوں میں جھنجھناہٹ سی معلوم ہوتی ہے۔

آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑنے لگتی ہیں۔ متلی معلوم ہوتی ہے۔
 پرمہینر و ہدایات :- مریض کو آرام سے تاریک کمرہ میں لٹائیں۔
 قبض نہ رہنے دیں۔ نہایت ہلکی غذا از قسم مونگ کی دال کا پانی یا دودھ
 وغیرہ دیں اور اگر اس کا سبب محض کمزوری ہو تو مقویات کا استعمال مفید
 ہوتا ہے۔ پاشویہ کرنا بھی مفید ہے۔

علاج :- (۱) تپکن کا درد۔ چہرہ تھمایا ہوا ہو اور درد کی جانب والی
 آنکھ سرخ ہو تو سیلا ڈونا دینا چاہیے۔
 (۲) بائیں نصف سر میں درد جو سورج کے ساتھ گھٹے اور بڑھے۔
 سپائی جیلیا مفید ہے۔

(۳) داہنے جانب کا درد جس میں داہنی آنکھ کے اوپر بھی سخت
 درد ہو۔ حرکت سے اور شور و غل سے زیادتی ہو تو سنگوئیر یا دینا چاہیے۔
 سنگوئیر یا کا درد گڈی میں بھی ہو سکتا ہے۔
 (۴) اگر درد کپٹیوں کے پیچھے بائیں جانب ہو اور دماغی محنت سے
 پیدا ہو گیا ہو تو اونس موڈیم مفید ہے۔

(۵) میں عموماً داہنی جانب کے درد سر میں کالمیاد یا کرتا ہوں
 جس کے نتائج ہمیشہ بہتر نکلتے ہیں۔

(۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ پلسا ٹیلا۔ ریشاکس۔ نیکس و امیکا۔
 سیپیا اور اولیمپ۔ ایچی میل بھی مفید ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

دوران سر چکر

VERTIGO

اسباب :- کثرت سے نوشی - زیادہ تمباکو پینا یا دیگر منشی اشیاء استعمال کرنا - کثرت جماع - سرگی اور بعض اعصابی امراض اس کے خاص اسباب ہیں - بدھمی صفحہ کی زیادتی - دماغی بیرونی صدقات اور جگر کی خرابی وغیرہ سے بھی دوران سر کی شکایت ہو جایا کرتی ہے - عام کمزوری کے باعث بھی چکر آنے لگتا ہے خصوصاً وہ مستورات جو بچہ کو دودھ پلانے سے کمزور ہو گئی ہوں یا جن کو حیض کثرت سے آتا ہو اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں - ہائی بلڈ پریشر بھی اس کی ایک اہم وجہ ہے -

علامات :- اس بیماری میں مریض کو ارد گرد کی چیزیں گھومتے ہوئے معلوم ہوتی ہیں - کھڑے ہونے پر چکر میں زیادتی ہوتی ہے - شدید حالات میں آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے - متلی اور تھکی کی شکایت ہو جاتی ہے - مریض ایک قدم بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکتا -

پرہیز و ہدایات :- سب سے پہلے مرض کی اصل وجہ معلوم کرنا چاہیے - اسی کے مطابق پرہیز بتلانا چاہیے -

اگر ضعف دماغ یا عام کمزوری سے چکر آتا ہو تو مقویات یعنی پھل اور عریہ وغیرہ کا استعمال کرائیں یا آٹو لہ یا سلیب کا مرہج نہارنہ

کھانے کی ہدایت کریں۔ اگر معدہ کی خرابی اس کا باعث ہو تو ہلکی اور
 رو دھم غذا دیں۔ سبز ترکاریاں کھانے کو بتلائیں۔ اگر صفرا کی زیادتی ہو
 تو میٹھا لیوں جو سنے کی ہدایت کریں اور میٹھی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔
 علاج :- (۱) کھانا کھانے کے بعد چکر کے لیے نکس و امیکا بہترین
 دوا ہے۔ اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو صفر دینے سے بالکل
 صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) شدید چکر۔ مریض روشنی اور شور و غل برداشت نہ کر سکے
 تو بیلا ٹونا ہر دو گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔ اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو
 تو نکس و امیکا دیں۔

(۳) اگر مریض کو ٹھنڈی ہوا کی خواہش ہو۔ معدہ کی خرابی سے
 متلی وقتے ہوتی ہو۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھنے میں چکر آتا ہو تو پلسا ٹیلا
 بہترین کام کرتا ہے۔

(۴) اگر آنکھ بند کرنے سے چکر آتا ہو، چکر کا سبب دماغی محنت ہو
 تو یکسینس دینا چاہیے۔

(۵) اگر آنکھ بند کرنے سے چکر کو آرام ہوتا ہے۔ لیکن توجہ بدلنے
 سے تکلیف میں کمی ہو جائے تو پیریتھا شکم دینا چاہیے۔

(۶) با یو کیمک میں اگر دماغی کمزوری سے یا دماغی محنت سے چکر
 آئے تو کالی فاس دینا چاہیے۔ اور اگر خرابی معدہ اس کا باعث ہو تو
 نیٹریم فاس مفید ہے۔

(۷) اگر مریض پیچھے کی طرف گزرتا معلوم ہو تو سیلا ڈونا - اگر اطراف میں یعنی داہنی جانب یا بائیں جانب گرے تو کوکیم اور سلفر - اگر آگے گرے تو گریفائٹس یا رسٹاکس دینا چاہیے -

(۸) مندرجہ صدر اذیہ کے علاوہ اسبر اگر لیسیا کلونا من فاسفورس - سیپیا - سلیشیا - سپائی جلیا - اوپیم - ڈبلیو ۱۱ - آرٹیکا وغیرہ بھی مفید اذیہ میں حسب علامت دینا چاہیے -

کم خوابی

INSOMNIA

اسباب :- اس مرض کے کئی اسباب ہیں مثلاً تنگدلی، انتہائی رنج یا انتہائی خوشی اور جوش، کثرت چار نوشی - خشکی - بخار، ہضمی اذیہ قبض - کمی خون - خمائی، جگر اور امراض دل و دماغ وغیرہ

علامات :- اس بیماری میں نیند اچھی طرح نہیں آتی - مریض یا تو تمام رات جاگتا رہتا ہے یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دماغی غودگی آکر آنکھ کھل جاتی ہے - بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو رات بھر خوابہائے پریشان دکھائی دیتے ہیں -

پرہیز و ہدایات :- اگر چار موافق نہ آتی ہو تو شام کے وقت چار قطعی دپٹیں - اگر معدہ کمزور ہو تو سنے سے تین چار گھنٹے قبل غذا

کھا لینی چاہیے۔ صبح و شام ہوا خوری کریں اور لیٹنے کا کمرہ نہایت پاکیزہ اور ہوا دار رکھیں۔ اگر قہقہے کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو غذا نہایت چکی و نرم دودھ، شوربا یا کچڑی مونگ کی استعمال کرائیں اور روغن کا ہو یا روغن خشخاش کی سر پر مالش کریں۔ نیز تحصیل اور تلودوں پر لگائیں۔

علاج :- (۱) اگر بچوں کو بے خوابی کی شکایت ہو تو کمیو ملا دینا چاہیے اگر کمیو ملا کافی نہ ہو تو انٹرمٹ یا پلساٹیل دینا چاہیے۔

(۲) کمی بخون اور کثرت خیال و تفکرات سے نیند نہ آنے میں کافی مفید ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے تو اوپیم دینا چاہیے۔

(۳) دماغی تھکاوٹ اور دن بھر کاروبار کی پریشانی کے باعث کم خوابی میں امیر اگر لی یا بہترین کام کرتا ہے۔ اس کا مریض نہایت تھکا ماندہ لیٹر پہ پڑتا ہے مگر لیٹتے ہی کم خوابی سے ہلکا رہ جاتا ہے۔

(۴) اگر قہقہے سے یا چاؤ کے کثرت استعمال سے نیند نہ آتی ہو تو ٹیکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۵) اگر کسی بیماری کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو۔ آگے مندر کرتے ہی مریض کو توہمات اور خوفناک اشکال سے دوچار ہونا پڑتا ہو تو کلگیر یا کرب کی چند خوراکیوں سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۶) حاد بیماری کے بعد یا رنج و خوف سے نیند نہ آنے مریض بار بار جھنکتا ہو تو کمیو ملا مفید ہے۔

(۷) باپوٹیکس میں کالی فاس بہت مفید ہے $\times ۶$ دینا چاہیے۔

(۸) بے خوابی کے لیے ہر علامت میں پیسی طوراً مدد شکر ۵ قطرہ
نی خوراک دینا مجرب ہے۔

(۹) مذکورہ بالا ادویہ کے علاوہ اکونائٹ - سلفر - جلیسمیم بیلاڈونا -
کالی بروم - ہیوسکس - اکنیشیا اور پلسا ٹیلا وغیرہ بھی بہت مفید ادویہ ہیں۔

غفلت کی نیند - بیہوشی

COMA

اسباب :- اس مرض کے بہت اسباب ہیں مثلاً سخت سردی
یا سخت گرمی کا اثر، دماغی امراض، دماغ کے اندر خون یا رطوبت کا
اجتماع، ورم الدماغ - یوریمیا - ذیابیطس، مرگی، سکے، ہسٹیریا،
افیون، بھنگ یا شراب کا زہر وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- اس مرض میں دماغ پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے
بیہوشی لاحق ہو جاتی ہے۔ چہرہ سُرخ ہو جاتا ہے۔ مریض سانس خراب
کرتا ہے۔ ہر چند اُسے جگایا جائے مگر وہ بیدار نہیں ہوتا۔ شدید
حالات میں مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- بیہوشی کی حالت میں پہلے مریض کے کپڑے
بٹن وغیرہ کھول کر ڈھیلے کر دینا چاہئیں اور بعد ازاں سر کو قدرے اونچا
کر دیں۔ سر پر برت رکھیں اگر برت میسر نہ آئے تو ٹھنڈا پانی دھاریں یا

کپڑا ترک کر کے سر پر رکھیں اور بار بار اُسے ترکرتے رہیں۔

علاج :- بیلاڈونا - کزوکس - نکس موسکاٹا - اوپیم - سٹرامونیم اور زخمیر پٹی پر کی دوائیں ہیں۔ جو دوا بھی علامت کے موافق ہو اُسے دیں۔ ان ادویہ کے علاوہ برائی اونیہ - کٹابس انڈکا - کونیم اور فاسفورک ایسڈ بھی مفید ادویہ ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

دماغی کمزوری

CEREBRAL ANAEMIA

اسباب :- جسمانی کمزوری، کمی خون، ضعف قلب، ضعف شریانیں جس کی وجہ سے شریان میں سدہ وغیرہ پڑ جانے سے خون دماغ میں رک رک کر پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں سر میں چوٹ وغیرہ کے لگنے سے بھی دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔

علامات :- دماغی کمزوری کے باعث مریض حیران و پریشان رہتا ہے۔ کانوں میں جھنجھنی سی ہوا کرتی ہے۔ بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ مریض کو ہر وقت کم و بیش درد سر یا چکر رہتا ہے۔ بعض وقت مریض یکایک ہوش ہو جاتا ہے اور ہاتھ پاؤں میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔

پرہیز و احتیاطات :- مقویات و مفرحات کا استعمال کرائیں۔

تازہ پھل ، دودھ ، مکھن کھانے کو دیں اور اگر کوئی دوسرا سبب اس مرض کا موجب ہو تو اُس کے مطابق پرہیز کرائیں۔ اگر مریض بہوش ہو جائے تو اس کے سر کو اس کے جسم کی نسبت نیچا رکھیں تاکہ خون دماغ کی طرف زیادہ مقدار میں جانے لگے۔ علاوہ ازیں نیچے سے اوپر کو مالش کریں۔

علاج :- (۱) اگر دماغ ہل گیا ہو یا دماغ میں چوٹ کے باعث دماغی کمزوری لاحق ہو گئی ہو تو آرنیکا بہت مجرب ہے۔

(۲) اگر جسم کے کسی حصہ سے خون زیادہ مقدار میں خارج ہو گیا ہو جس کے باعث دماغ میں سخت کمزوری محسوس ہوتی ہو تو چائنا دینا چاہیے۔ (۳) اگر چہرہ زرد ہو گیا ہو اور شام کو حرارت ہو جاتی ہو، مریض صحت نہ کر سکتا ہو تو فیرم فاس دینا چاہیے۔

(۴) اگر حرام مغز میں چوٹ کے باعث غفلت طاری ہو گئی ہو، حافظہ ذائل ہو گیا ہو تو اوپیم مفید ہے۔

(۵) باپو کیمک میں کالی فاس بہترین دماغی ٹانک مانا گیا ہے۔
X دینا چاہیے۔

مندرجہ بالا ادویہ کے علاوہ آرسنک۔ کلکیریا کارب۔ کلکیریا فاس۔ اور ہامیلٹس وغیرہ بھی مفید ہیں۔

سر میں پانی بھر جانا

HYDROCEPHALUS

اسباب :- یہ بیماری عموماً شیر خوار بچوں کو ہوتی ہے۔ بعض وقت جنین میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ دماغ سے سیلان خون، دماغ کے حوت میں ورمی کیفیت کا ہونا، صدہ دماغ کسی جلدی مرض از قسم چپک و خسرہ وغیرہ کا یکایک غائب ہو جانا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں۔ خنازیری اور آتشکی والدین کی اولاد کو یہ مرض جلد ہو جاتا ہے۔

علامات :- مریض کا جسم لاغر ہوتا جاتا ہے اور سر بہت بڑا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات سر کو ٹھرانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیٹانی ابھرتی ہے اور سر کی جلد اس قدر پتلی ہو جاتی ہے کہ وریدیں صاف دکھائی دیتی ہیں مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے عقل شعور جاتا رہتا ہے۔ شدید حالات میں مریض کو دست آنے لگتے ہیں۔ تشنج شروع ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو غذا مقوی اور زودمضموم دیں اور ہوا دار گمرہ میں مریض کو رکھیں۔ اس مرض میں سر پر پٹی وغیرہ باندھنا بالکل بیکار ہوا کرتا ہے۔ یہ مرض ذرا مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ البتہ اگر ہومیو پیتھک دوا ٹھیک وقت پر پہنچ جائے تو مریض بچ سکتا ہے۔

علاج :- اس مرض میں شروع میں سلفر بہترین کام کرتا ہے۔
 سلفر دینے کے بعد اگر کچھ کسر باقی رہ جاتی ہے تو کلکیئر یا کارب سے وہ بھی
 دور ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں دوائیں میرے تجربہ میں پوری اُتری ہیں۔
 (۲) اگر مریض میں غنودگی اور بیہوشی طاری ہو جائے۔ بھینگاپن
 اور فابکی کیفیت نمودار ہو تو آئیو ڈیم بہت مفید ہے۔
 (۳) اگر مریض کے والدین میں دق، ہسٹری موجود ہو تو ٹوبرکولیسزم
 دینا چاہیے۔

(۴) دومان سر، بینائی میں دھندلا پن، متلی اور قے نیز تشنگی ہوتو
 مرکب کار مفید ہے۔
 (۵) بائیو کیمیکل میں کلکیئر یا فاس سے بڑی دوا ہے۔
 (۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سلیشیا، برٹیا کارب، کالی آئیو ڈائیڈ
 سٹارٹک، ہیلی بوریس، ڈیجیٹلس، بیلا ڈونا، اور فاسفورس وغیرہ بھی
 بہت مفید ادویہ ہیں۔

دماغی پردوں کا ورم

MENINGITIS

اسباب :- سخت جسمانی یا دماغی محنت، امراض مفاصل، چھیک
 مرض آئٹھک، دماغی چوٹ اور سخت گرمی وغیرہ اس کے اہم اسباب
 ہیں۔ بعض اوقات کسی مادہ کے دماغ کی طرف منتقل ہو جانے سے

بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس بیماری میں مریض کو بخار چڑھتا ہے۔ یا دوسرے
نیز تشنچ اس غضب کا ہوتا ہے کہ بعض وقت مریض پیچھے لگتا ہے۔ ہڈیاں
شروع ہو جاتا ہے۔ عضلات مفلوج ہو جاتے ہیں اور مریض بالکل بیوش
ہو جاتا ہے۔ بے خبری میں پاخانہ و پیشاب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مرض
دافت پیتا ہے اور کسی ایک چیز کی طرف ٹکلی باندھ کر دکھا کرتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو تار یک کشادہ کمرہ میں لٹائیں۔ وہاں
کسی قسم کا شور و غل نہ ہونے دیں۔ مریض کے سر کو تھکے اور چار کھیں
اور سر پر ٹھنڈے پانی سے کپڑا تر کر کے رکھیں اور ہر بار پیشی کو تر کرنے
سائیں۔ غذا نہایت لطیف دیں۔ قابض اشیاء سے زبردست پرہیز کروایا جائے
علاج :- اس مرض کی سب سے عمدہ دوا بیلادونا ہے۔ جبکہ شدید
قسم کے علامات ظاہر ہوں۔ یہ نہایت اہم اور چوٹی پر کی دوا ہے۔ اگر
کسی وجہ سے یہ دوا صحت کھلی نہ دے سکے تو کم از کم مریض کی حالت کو
بہتر ضرور بنادے گی۔

(۱۲) اگر بیلادونا کسی وجہ سے ناکام رہے تو اکونائٹ کی طرف
توجہ کرنا چاہیے۔ بشرطیکہ بعض سست نہ ہو اور فابجی علامات قطعی نمایاں
نہ ہوں۔ ایسی حالت میں اکونائٹ فوراً مرض پر قابو حاصل کر لیتا ہے۔
(۱۳) اگر سپینہ کی زیادتی ہو۔ بخار تیز ہو۔ قبض یا مثلی ہو۔ پیشاب
کم مقدار میں درد کے ساتھ ہوتا ہو۔ یا کسی جلدی امراض کے دب جانے سے

یہ مرض لاحق ہو گیا ہو تو برائی اونیا کی چند خواہیں جادو کا سا کام کرتی ہیں۔
(۴) آخری حالت میں جب مریض پر فابجی اثر بھی ہو چکا ہو پیشاب
کم مقدار میں ہوتا ہو یا قطعی بند ہو گیا ہو، مریض کا سر از خود اِدھر اُدھر
گھومتا ہو، سر گرم ہو تو ہیلی بوریس مفید ہے۔

- (۵) اگر مریض اپنا سر تکیہ سے رگڑتا ہو تو سٹرامونیم دینا چاہیے۔
(۶) جب سند رجحان عام ادویہ فیل ہو جائیں تو سلفر دینا چاہیے۔
اس کے دینے سے مریض میں یا تو دوسری دوا کی بالکل صاف تصویر سامنے
آجاتی ہے یا بذات خود سلفر ہی تمام تکالیف کو نابود کر دیتا ہے۔
(۷) باپو کیمک میں نیٹرم سلف اس مرض کی اہم دواؤں میں سے ہے۔
(۸) ان ادویہ کے علاوہ ادپیم۔ سٹرامونیم۔ لاپس۔ کیو پریم۔ ہیپوسس۔
سائیکوٹا وغیرہ کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔

سکتہ

APOPLEXY

اسباب :- امراض گردہ، امراض مفاصل یا منشی اتیاری کے
زہر کا خون میں سرایت کر جانا۔ امراض دماغی، صدمہ دماغ وغیرہ
اس کے اہم اسباب ہیں جسم میں خون کا زیادہ ہونا، اختلاج قلب اور
شدت گرمی یا سردی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات دماغ نہیں

خون کا اجتماع ہو جانے سے سدہ بن جاتا ہے جس کے باعث سکتہ ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں مریض مثل مردہ کے ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں محسوس ہو جاتے ہیں۔ سانس دقت سے اور خراٹے سے چلتی ہے آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنے سے وہ حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ شدید حالات میں مریض راہی ٹھک عدم ہو جاتا ہے یا یکایک فاج کا شکار ہو جاتا ہے۔ سکتہ کا دورہ ۵ منٹ سے لے کر تین دن تک پڑ سکتا ہے۔

ہر پیروہدایا است :- بعض معالج سکتہ کی تشخیص میں غلطی کر جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کو نہ ہرول (پوریمیا)، مرگی اور غشی سے تفریق کرنا چاہیے۔ مرض پوریمیا میں مریض کا پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اس کے پاتھوں اور پیروں میں اینٹھن ہوتی ہے اور مریض کی سانس سے پیشاب کی بو آنے لگتی ہے۔ مرگی میں مریض کے منہ سے جھاگ گرنے لگتا ہے۔ اور وہ سکتہ کے مریض کی مانند خراٹے سے سانس نہیں لیتا اور مرگی کے دورہ کی مدت عموماً چند منٹ ہوا کرتی ہے۔ عام غشی کی حالت میں مریض کو اگر نور سے جگایا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ جواب دیتا ہے۔ سکتہ کے مریض کی آنکھ کی پتلیوں میں جھک اور تصویر اچھی طرح نظر آتی ہے اور ناک کے پاس ہلکی روئی یا تاگار کھنسنے لگتا ہے۔

معالج کو چاہیے کہ مریض کو دماغی اور جسمانی محنت کرنے سے روکے

مے نوشی سے پرہیز لازمی ہے۔ غذا نہایت لطیف اور ہلکی کھانا چاہیے۔
پراکھا، پوری، کچوری، آلو، اروی اور سبجو ثقیل اشیاء ہرگز استعمال نہ کریں۔
بوقت دورہ مریض کو سر اونچا کر کے ہوا دار کمرے میں لٹائیں۔ عصر چو
برف رکھیں یا ٹھنڈے پانی میں کپڑا تر کر کے رکھیں اور بار بار اسے تر
کرتے رہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے ہوں تو ان کو گرم کریں اور ناک
پر کیفہ مدر شکر لگا دیں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی بہترین دوا اوپیم ہے ہر پندرہ منٹ
بعد ایک خوراک دینی چاہیے۔

(۲) اگر اوپیم ناکام رہے اور مریض کا بول و براز بے خبری میں
خطا ہو جائے، مریض کے حواس بالکل معطل ہو چکے ہوں تو آرنیکا
مفید ہے۔

(۳) اگر آرنیکا فیل ہو جائے تو ہیوسیس دینا چاہیے اس دوا سے
مرض میں نمایاں کمی ہو جایا کرتی ہے۔

(۴) اگر چہرہ تہمایا ہوا ہو اور سر جلتا ہو تو بیلا ڈونا مفید ہے۔

(۵) اگر مریض پر فابجی اثر ہو تو کاسٹم بہترین دوا ہے۔

(۶) باپو کیمک میں کالی فاس اس مرض کی خاص دوا ہے۔

(۷) واضح رہے کہ پلیم، کافیا، سلفر، گلوٹائن، کیو پریم اور

ہائڈریانک ایسڈ وغیرہ بھی اس مرض کی مخصوص دوائیں ہیں۔ حسب
علامت دینا چاہیے۔

پاگل پن

INSANITY, MANIA

اسباب :- اس مرض کے بے شمار اسباب ہیں۔ مثلاً خوف، سبج و صدمات، حوادث، مادہ آتشک، مذہبی تعصب، کسی خاص چیز کے خیال میں مستغرق ہو جانا۔ کثرت جماع۔ کثرت شراب خواری۔ کثرت محنت و ماعی۔ امراض جگر و دماغ۔ فاقہ کشی۔ بعض رحمی کمالیف زمانہ سن یا س وغیرہ۔

علامات :- ابتدائی حالت میں مریض کو دوسرے رہتا ہے۔ راتوں کو نیند نہیں آتی، ذرا ذرا سی بات میں غصہ آجاتا ہے۔ کاروبار سے نفرت ہو جاتی ہے اور مریض تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلہ میں مریض فضول باتیں بکنے لگتا ہے، عقل سلیم جاتی رہتی ہے۔ کپڑے پھاڑ دالتا ہے اور دوسروں کو مارنے پیٹنے کے لیے جھپٹتا ہے۔ سردی اور گرمی کا احساس نہیں رہتا۔ بعض اوقات مریض لوگوں سے خواہ مخواہ ڈرتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو مفرح اور ترغذ اکھلائیں اور پھلوں میں سنگترہ، انار اور سیب وغیرہ کھانے کو دیں تاکہ دماغ اور قلب کو تقویت پہونچے۔ غذائیں دودھ، آتش جو، کھجری، فیرینی وغیرہ دیں۔ علاج مشرور کرنے میں پہلے اصل سبب کو رفع کریں۔ مریض کو صاف جگہ پر رکھیں۔ سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ اُسے نیند آنے لگے۔ اس کی

طبیعت کو ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کریں اگر مریض کو قبض ہو تو اسے
 رفع کریں۔ ہر روز آب سرد سے غسل کرائیں اور سر پر ٹھنڈا پانی دھاریں۔
 علاج :- بیلادونا - چائٹنا - ہیپلی بوردس - ہیوسکس - اگنیشیا - لائیکو-
 نکس و امیکا - ادیکیم - پلائٹنا - پلسا ٹیلا - سٹرامونیم اور سلفر چوٹی پر کی
 دوائیں ہیں۔ کوئی بھی دوا حسب علامت دیں۔ اگر ان دواؤں میں تمام
 علامات نہ پائی جاتی ہوں تو آرسنک، اکونائٹ، ٹینر ٹولا، سیسیم کاربودج۔
 کنابس انڈکا۔ کالی بردوم۔ ارجنٹم نائٹ اور زئکم وغیرہ ادویہ کی طرف
 رجوع ہونا چاہیے۔

مرگی

EPILEPSY

اسباب :- بچوں میں یہ مرض خون کھا جانے سے یا دانت
 نکلنے سے ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے باعث یہ
 مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ جوانوں میں یہ مرض کثرت جماع، جلق، آشک،
 امراض مفاصل، رنج و غم کثرت سے نوشی اور ورم الدماغ وغیرہ کے باعث
 ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں میں یہ بیماری قبض کی خوابی سے ہو کرتی ہے۔
 اس کے علاوہ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے
 کہ یہ مرض لغم کے غلبہ کے باعث ہوتا ہے۔

علا مات :- یہ ایک دورہ والی بیماری ہے، نوبت مرض سے پہلے بعض اوقات مریض کو اپنے پاؤں یا ہاتھ پر سے ایک شعلہ سا اٹھتا ہوا معلوم ہوتا ہے جو سرتک پہنچتے ہی مریض کو بے ہوش کر دیتا ہے۔ بعض مریضوں کو دورہ سے قبل درد سر کی شکایت ہو جاتی ہے یا کانوں میں جھنجھناہٹ کی آواز آنے لگتی ہے۔ دورہ کے وقت مریض بیکا یکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ تمام جسم میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ مریض کا تمام جسم اکڑ جاتا ہے۔ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور منہ سے بھاگ نکلنے لگتا ہے۔ کبھی زبان دانتوں تلے آکر کٹ جاتی ہے۔ اس کا دورہ دو منٹ سے لے کر پانچ یا دس منٹ تک رہتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ مریض نصف گھنٹہ تک دورہ کی حالت میں رہا۔

پرہیز و ہدایات :- دورہ کے وقت مریض کو نیچر دار کمرے میں آرام سے بٹا دیں اور اس کے منہ میں کپڑے کی گدی رکھ دیں تاکہ دانت کے نیچے زبان آکر کٹ نہ جائے۔ مریض کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں یا اس کے سر پر برف یا آب سرد رکھیں۔ اس عمل سے مریض کو جلد ہوش آجائے گا۔

علاج کے دوران میں مریض کو کثرت جماع و کثرت شراب خوری اور سخت محنت سے گریز کرنا چاہیے۔ سخت سردی اور گرمی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ سرد و زیادہ گرم اور ثقیل اشیاء کا کھانا مضر ہے۔ میٹھی اشیاء بھی نہ استعمال کرنا چاہیے۔ دورہ، سا بودا، کھڑی، شور یا پھلکا وغیرہ

دینا مفید ہے۔

علاج :- (۱) بچوں میں مرگی کے لیے کیو پرم ادبھی طاقت میں دینے سے عجیب و غریب نفع ہوتا ہے۔ میں نے بچوں کے علاوہ بڑوں کو بھی کیو پرم کی ادبھی طاقتیں دے کر درست کیا ہے۔ عورتوں میں اگر حیض کے ایام میں مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو یہ دوا اکسیر بن جاتی ہے۔

(۲) بعض ڈاکٹروں نے ہائڈروسیانک ایسڈ کی چھوٹی ٹھنکیوں سے اس کا کامیاب علاج کیا ہے۔ چنانچہ امریکہ کے بعض ڈاکٹر اس دوا کو مرگی کے لیے مجرب بتاتے ہیں۔

(۳) جس وقت دورہ آنے کے علامات رونا ہوں فوراً ایک خوراک کالی بائیکرام کی کھالینے سے دورہ نہیں آتا۔ چھوٹی طاقتیں استعمال کرنا چاہیے۔

(۴) اگر مریض منوم رہتا ہو تو آگنیشیا دینا چاہیے یہ دوا ان عورتوں کے لیے مجرب ہے جن کو رسی تکلیفات بھی ہوں۔

(۵) مرض پڑا ہوا جانے کی حالت میں سلیشیا انتلاہ ہوتے روز دینا چاہیے۔ اگر اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچے تو اس کے بعد لیسس یا لائیکو دینے سے شفا ملے گی ہو جاتی ہے۔

(۶) اگر دورہ نہایت شدید پڑتا ہو، مریض کا چہرہ سرخ ہو جائے، حلق میں زکاد رکھ ہو کر دم گھٹنے لگے تو بیلڈا ڈونا مفید ہے۔ عموماً بیلڈا ڈونا کے بعد سفر دینے سے متاج بہتر برآمد ہوا کرتے ہیں۔

(۷) بعض ڈاکٹروں نے اونٹنی مد رٹیکھر کو مرگی کا سونی صدی کامیاب علاج بتلایا ہے تین قطرہ فی خوراک دن میں تین بار دینا چاہیے۔

(۸) بایو کیمک میں کلکیر یا فاس اور کالی فاس کے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آرٹک، ادیم، جلیسم، سلفر، کلکیر یا کارب، ہیومس، سائیکوٹا، سورنیم، کاسکم، بیوفو اور پلیسم وغیرہ اس مرض کی خاص ادویہ ہیں۔

ہذیان

DELIRIUM

اسباب :- ہذیان بذات خود کوئی مرض نہیں ہے بلکہ بعض امراض کے باعث مریض پر ہذیان کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ عموماً نیز بخار، اعصابی کمزوری، امراض دماغ اور خون میں کسی سمیت کے مل جانے سے ہذیان ہو جاتا ہے۔

علامات :- مریض بے عقل کی باتیں اور ادھر ادھر کی بکواس کرنے لگتا ہے بعض وقت مریض آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور بے ربط گفتگو کیا کرتا ہے۔ کبھی مریض بے ہوشی کے عالم میں بے موقع بکواس کیا کرتا ہے خدیہ حالات میں اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو جاتی ہے

پر ہینر و ہدایات :- اصل سبب مرض کا رفع کرنا معالج کا پہلا کام ہے۔ چنانچہ اگر دماغی کمزوری سے ہذیان ہو جاتا ہو تو مریض کو مقوی غذا۔ پھل اور بادام وغیرہ کا استعمال کرائیں۔ اگر خون میں سمیت کا اثر ہو گیا ہو تو اس کا تدارک کریں۔ شدید ہذیان میں برت یا ٹھنڈے پانی میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھیں اور بار بار کپڑے کو تر کرتے رہیں۔

علاج :- ہذیان میں جھٹی پر کی تین دوائیں ہیں۔ بیلادونا۔ سٹرامونیم اور ہیومس۔

(۱) شدید قسم کے ہذیان میں جبکہ مریض بھاگنے کی کوشش کرے نیز تیز بخار ہو تو بیلادونا نمبر ۶ کی چند خوراکیں دیں۔

(۲) اگر مریض کو شدید بخار نہ ہو لیکن مریض کسی خیالی دشمن سے ڈر کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہو تو ہیومس بہت مفید ہے۔

(۳) مریض اپنا سر تکیہ سے اٹھائے اور زبردست ہذیانی کیفیت ہو۔ تو سٹرامونیم دینا چاہیے۔

(۴) اگر ٹائیفائڈ کے مریض کو ہذیان ہو جائے تو اگر کیس بہتر کام کرتا ہے۔

(۵) باپو کیمک میں کالی فاس عمدہ دوا ہے۔ اگر تیز بخار بھی ہو تو فیرم فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کیو پریم۔ پیشیا۔ ادیم۔ ویرم البم۔ کالی بروم اور ہیلی بوس وغیرہ بھی مفید ہیں۔

باب سوم

امراض چشم

آشوب چشم
(آنکھیں دکھنا)

OPHTHALMIA

اسباب :- چوٹ لگنا - سوزاک - آتشک کی سمیت سخت سردی یا گرمی کا اثر - نزلہ زکام کا ہونا آنکھوں میں گرد و غبار کا پڑنا کثرت مطالعہ مرض چھپک اور خنازیر وغیرہ اس مرض کے عام اسباب ہیں - شیر خوار بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں عموماً آنکھیں آشوب کر آتی ہیں -

علامات :- آنکھ کی جھلی سرخ اور متورم ہو جاتی ہے - آنکھوں میں کڑکھن ہوتی ہے گویا ان میں کنکر یا ریت پڑ گئی ہے - آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور ان میں جلن اور درد ہوتا ہے جس کا احساس رات کو

اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سو کر اٹھنے پر آنکھیں کیچڑچسپا سے چپک جاتی ہیں۔
پرہیز و ہدایات :- مریض کو ہوا دار تاریک کمرے میں رکھیں اور
 دھوپ میں مریض کو نہ نکلنے دیں، آنکھ کے اوپر سنر کیڑا رکھیں یا سیاہ چشمہ
 لگائیں اور صاف سرد پانی سے آنکھ کو برابر دھوتے رہیں۔ بادی اور
 گرم اشیاء سے پرہیز کرانیں۔

(۱) ابتدائی حالت میں جبکہ سرخی و جلن ہو۔ مریض سخت بے چین ہو
 تو اکونائٹ کی چند خوراکیں عجیب و غریب کام کرتی ہیں۔ اگر پھر بھی تھوڑی
 بہت تکلیف باقی رہ جائے تو سلفر دینے سے شفا رکلی ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر آنکھوں میں غضب کی سرخی ہو۔ مریض روشنی سے حد درجہ
 دکی احس ہو تو بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔

(۳) سوزاکی یا خنازیری آشوب چشم میں یا جب آنکھوں میں دانے
 پڑ جائیں۔ سوزشی قسم کے آنسو کثرت سے نہیں آتے آنکھوں میں سرخی اور جلن
 ہو اور پوٹے متورم ہوں تو مرک سال بہت مجرب ہے۔

(۴) اگر آنکھوں میں کیچڑ زیادہ نکلتا ہو، آنکھیں چپک جاتی ہوں تو
 ان میں کھرو ہو جائیں تو ار جنٹم ٹارٹ دینا چاہیے۔

(۵) اگر آنسو کثرت سے نکلیں جس سے خراش پیدا ہو جائے تو
 کا زور ہو تو یو فریشیا مفید ہے۔

(۶) با یو کیمک میں فیرم فاس دینا چاہیے۔ نزلہ کی حالت میں کالی ہوا
 کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا بہت مفید ہے۔

(۷) دیگر ادویہ جو کہ مفید ہیں وہ پلسا ٹیلا۔ ایپس۔ ہمیزنگ سلف۔
رٹاکس۔ گریفائیٹس اور کلکیریا کارب ہیں۔

جالا و ماڑا

OPACITY OF THE CORNIA

اسباب :- عرصہ تک روہوں کے رہنے سے خراش پڑ جانا یا
پڑباں کے باعث قرنیه کے طبقات پر زخم کا ہو جانا خراش کے مادہ کا دب جانا
یا چوٹ وغیرہ کا لگنا۔

علامات :- قرنیه کے طبقات میں زخم ہونے کے بعد رائل غرہ جانے
کے باعث آنکھ میں سفیدی پڑ جاتی ہے۔ یہ سفیدی اگر قرنیه کے مرکز میں
ہوتی ہے تو عریض کی روشنی یا تو کم ہو جاتی ہے یا بالکل زائل ہو جاتی ہے
مرکز سے دور سفیدی ہونے پر تلکریں کوئی خرابی نہیں آتی۔ جوانوں میں اگر
اس کے علاج میں تساہلی نہ کی جائے تو رفتہ رفتہ فائدہ ہو جایا کرتا ہے
جن بچوں کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں کے
آسٹیا لرزتے رہتے ہیں۔

ہمیز و ہدایات :- پہلے خراش چشم کو دُر کرنے کی کوشش کرنی
چاہیے اگر وہ بے وغیرہ کے باعث یہ تمکایت ہو تو پہلے اصل مرض یعنی
روہوں کا مکمل علاج کرنا چاہیے۔ آنکھ صاف رکھیں اور سالہ وارہ

ثقیل و بادی چیزوں سے پرہیز کرائیں۔

علاج ۱- (۱) اگر پٹہ بال کے باعث جالا پڑ گیا ہو تو لیکسیس

دینا چاہیے۔

(۲) اگر چوٹ کی وجہ سے جالا پڑ گیا ہو تو آرنیکا مفید ہے۔ لیکن

اگر زخم کے بعد جالا پڑا ہو تو میگنیفیا کارب دینا چاہیے۔

(۳) آشوب چشم کے بعد اگر یہ شکایت ہو گئی ہو تو برٹیا کارب

یا سیلا ڈونا دیں۔

(۴) اگر خارش کا مادہ دب جانے سے جالا پڑ گیا ہو تو سلیشیا

بہتر کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ہفتہ سلفر کی بھی ایک خوراک

دینا چاہیے۔

(۵) خنازیری مادہ والے کو کلکیریا کارب دینا بہت مفید ہے۔

(۶) دیگر ادویہ جو اس مرض میں دی جاسکتی ہیں وہ کتالین، انٹیکا۔

کاسٹم، فاسفورس، نیٹرم سیور، سیپیا، یوفریشیا اور کاپکیم وغیرہ ہیں۔

ناخنہ

PTERYGIUM

اسباب :- یہ بیماری ریگستانی علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

جہاں اکثر آندھیاں چلا کرتی ہیں اور گرد و غبار آنکھوں میں پڑ کر خارش کا

باعث ہوتا ہے۔ آشوب چشم نیز پردہ دیدہ پر مزمن ورم کی وجہ سے بھی آنکھ میں ناخن ہو جاتا ہے۔

علامات :- یہ ایک قسم کا جالا ہوتا ہے جو آنکھ کے پردہ پر پڑ جاتا ہے۔ اس کی شکل مثلث نما ہوتی ہے جس کی جڑ عموماً اندرونی گوشہ چشم یعنی ناک کی طرف اور نوک پتلی کی طرف ہوتی ہے۔ بعض ناخن نے گلابی رنگ کے ہوتے ہیں۔ مگر بعض بالکل سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔

پرہیز و احتیاط :- اس کا پرہیز مثل جالا دماڑا کے علاج کے کروانا چاہیے۔ ہر چند یہ مرض مشکل سے جاتا ہے مگر ہو میو پتھک ادویہ کے استعمال سے رفتہ رفتہ دور ہو جاتا ہے۔

علاج :- سورنیم۔ ارہنٹ ٹاٹ اور زینک میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔ ان دواؤں کے بعد اگر ضرورت ہو تو لیکسیس۔ سپائی جلیا سلفر اور چامفیلہ وغیرہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

موتیابند

CATARACT

اسباب :- آنکھ پر چوٹ لگنا۔ مرض ذیابیطس ضعیفی۔ امراض گردہ، آتشک و مرگی وغیرہ۔ ان اسباب کے علاوہ بعض حالتوں میں یہ بیماری موروثی بھی ہوتی ہے۔

علامات :- اس بیماری میں آنکھ میں رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے پانی اترنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پہلے مریض کو ایک بھنگا یا پتھر سا آنکھ کے سامنے معلوم ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتا رہتا ہے۔ مریض کی بینائی رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے اور بالآخر بینائی بالکل جاتی رہتی ہے۔ بعض حالات میں ہر ایک چیز جھم میں بڑی دکھائی دیتی ہے۔ نئے نئے چاند کو دیکھنے سے بجائے ایک کے کئی چاند دکھائی دیتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے حلقہ سا معلوم ہوتا ہے اور چراغ کی شعاعیں سبز معلوم ہوتی ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- ابتدا میں مریض کو نیلگوں چشمہ لگا کر رہنے کی ہدایت کریں۔ ترشی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرائیں۔ ثقیل اشیاء اور تیل وغیرہ کا استعمال بند کرادیں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی اسیری خم بہت عمدہ دوا ہے۔ بے شمار کیس اس دوا سے درست ہو چکے ہیں۔

(۲) اگر کسی وجہ سے پہلی دوا ناکام رہے اور مریض کو اعصابی درد کی بھی شکایت ہو تو فاسفورس کا استعمال نعمت غیر سترقبہ ثابت ہوتا ہے اکثر حالات میں موتیا بند کے لیے یہ دوا گیسر کا کام کرتی ہے۔

(۳) میرے تجربے میں سپائی جیلیا بہت چھوٹی طاقتوں میں نہایت مجرب دوا ثابت ہوئی ہے۔ یعنی حالات میں سپائی جیلیا کے بعد مجھے فاسفورس دینا پڑا جس سے دیگر علامات میں بھی نمایاں کمی ہو گئی۔

- (۴) بایو کیمیک میں کلکیر یا فلور اس مرض کی بہترین دوا ہے۔
- (۵) دیگر ادویہ جو مفید ہیں وہ نیٹرم میور۔ سلیشیا۔ گنیشیا کارب۔
 حلیم۔ سڈرن اور پرونس وغیرہ ہیں۔
- نوٹ :- خارجی استعمال کے لیے سکس سائینیر یا موتیا بند میں بہت مفید
 ہے۔ اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو بذریعہ آپریشن مادہ کو نکلوادیں۔

پڑبال

TRICHIASIS

اسباب :- پچوٹوں کے کنارے کا مزمن درم، روسے و کتھرو، اور
 پچوٹوں پر چوٹ وغیرہ لگنا۔ ان وجوہ کے علاوہ کبھی یہ مرض موروثی بھی ہوا
 کرتا ہے۔

علامات :- پلکوں کے اندر کی جانب بالوں کی ایک اور قطار ہوتی
 ہے جو اندر کی طرف مڑ کر خراش پیدا کر دیتی ہے۔ آنکھوں میں بالوں کی
 رگڑ سے درد ہوا کرتا ہے اور ہر وقت آنسو بہا کرتے ہیں۔ مزمن حالات
 میں آنکھ میں درم، سرخی اور زخم کی کیفیت ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو ترش اور بادی و ثقیل اشیاء سے پرہیز
 کرائیں۔ مڑے ہوئے بالوں کو اکھاڑ ڈالنے سے عارضی طور پر فائدہ ہو جایا
 کرتا ہے لیکن بال جننے کے بعد پھر وہی تکلیف عود کر آتی ہے۔ جب بال

اندر کو بہت بڑے ہوں تو آپریشن سے ہلک بندی کر لینا مناسب ہے۔
ہر چند یہ مرض سوائے آپریشن کے مشکل سے اچھا ہوتا ہے لیکن اگر ہومیو پتھک
دوا عرصہ تک استعمال کی جائے تو یقینی فائدہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- اس مرض کی مخصوص دوائیں تھو جا۔ اکونائٹ۔ بورکس۔
لیکسیس۔ نیٹرم میور۔ کاربونیم سلف۔ رٹین کولس بلب اور سیپیا وغیرہ ہیں۔

گوہانجی

STYE

اسباب :- خون کی خرابی، خراب غذا، اور خراب آب و ہوا،
بہنسی اور ختازیری مادہ وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں پہوٹوں کے کنارے پھنسی نکل آتی
ہے۔ جس میں عموماً دو چار دن کے بعد مواد پڑ جاتا ہے کبھی صرف ایک
گوہانجی نکلتی ہے لیکن بعض وقت اس سے زائد بھی نکلتی ہیں اور کبھی یکے بعد
دیگرے نکلتی رہتی ہیں۔ مواد پڑ جانے کے بعد دو ایک دن میں خود بخود
وہ پھٹ جاتی ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- نفل و بادی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ اگر
خون کی خرابی اس کا باعث ہو تو تیل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بہنسی
سے گوہانجی نکلتی ہوں تو وعدہ کی اصلاح کریں۔ ابتدا میں جس جگہ گوہانجی

نکلنے والی ہو دہاں کی پلکوں کے دو ایک بال اُکھاڑ دینا اکثر مفید ہوتا ہے۔
 علاج :- ہر قسم کی گوباخھی میں پلسا ٹیلا ایک مجرب دوا ہے۔ اس
 دوا کو گوباخھی کے ہر مرحلہ میں دے سکتے ہیں۔ ابتدا میں دیدینے سے یا تو
 دانے تحلیل ہو جاتے ہیں یا جلد ان میں مواد پڑ جاتا ہے۔ آخری مرحلہ میں
 دینے سے درد سے نجات مل جاتی ہے اور گوباخھی جلد از جلد مند مل
 ہو جاتی ہے۔ اگر وعدہ کی بھی علامات ساتھ ہی ساتھ پانی جائیں تو پلسا ٹیلا
 اور بھی یقینی دوا بن جاتی ہے۔

(۲) اگر گوباخھی سخت ہو جو نہ تحلیل ہوتی ہو اور نہ پکتی ہو تو سٹافی سیکریا
 بہت مفید ہے۔ یہ دوا بچوں میں گوباخھی نکلنے کے لیے اکسیر ہے۔ بار بار
 گوباخھی نکلنے میں بھی یہ دوا بہت اہم ہے۔

(۳) اگر خون خراب ہو گیا ہو اور بار بار دانے نکلتے ہوں تو ہیرسلفر
 دینا چاہیے۔

(۴) اگر بہترین منتخب شدہ ادویہ فیل ہو جائیں اور گوباخھی کی سختی
 کسی دوا سے دور نہ ہو سکے تو تھو جادینا بہت مفید ہے۔

(۵) اگر گوباخھی بار بار نکلتی ہوں اور اُن میں سختی ہو تو گریفا ٹس
 نہایت عمدہ کام کرتا ہے۔

(۶) باپو کیمک میں سلیشیا اس مرض کی خاص دوا ہے۔

(۷) مذکورہ بالا ادویہ کے علاوہ رسٹاکس، مرک سال، سلفراوہ

کلکیر یا کارب نہایت اہم دوائیں ہیں۔

رتونڈی

HEMERALOPIA

اسباب :- اختلاط ابقرہ کے باعث روح کا غلیظ ہو جانا۔ جسمانی کمزوری۔ دھوپ میں کام کرتے رہنا اور دماغی کمزوری وغیرہ۔ یہ مرض اکثر موروثی بھی ہوتا ہے۔ پانی یا سمندر میں کام کرنے والے عموماً اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔

علامات :- اس بیماری میں مریض کو دن کو تو بخوبی نظر آتا ہے مگر شام ہوتے ہی جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا ہے نگاہ کم ہوتی جاتی ہے۔
ہرہیز و ہدایات :- مریض کو گرمی و درمنازت آفتاب سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ غذا مقوی اور زود ہضم دیں۔ اگر مریض کے سر میں درد بھی رہتا ہو تو آٹولہ کا مرتبہ روزانہ صبح کھانے کی ہدایت کریں۔
علاج :- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا لائیگو پوڈیم ہے۔

اگر اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو بیلادونا یا سلفر و مینا چاہیے۔
ان ادویہ کے علاوہ ارجنٹم نائٹ۔ چائنا۔ ہیوسکس اور پلسا ٹیلا بہت مفید دوائیں ہیں۔

بھینگا پن

STRABISMUS

اسباب :- ضعف بصر - بعید نظری - آنتوں میں کیڑے - سر میں پانی جمع ہو جانا - دانت نکالنا - اور کسی بھینگے کی نقل کرنا وغیرہ -
 پرہیز و ہدایات :- نظر کی کمزوری کے باعث یہ شکایت ہو گئی ہو تو چشمہ لگائیں - آنتوں میں کرم (کیڑوں) کی وجہ سے بھینگا پن ہو گیا ہو تو اس کا علاج کریں - غذا مقوی اور زود ہضم دیں -

نوٹ :- یہ مرض عمل جراحی سے بھی درست ہو جاتا ہے جس میں اس انس کو کاٹ دیتے ہیں جس کے سبب سے نقص ہوتا ہے لیکن یہ کام ایک ماہر ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے -

علاج :- اگر آنتوں کی علامات موجود ہوں اور کرم امعاء کی شکایت ہو تو سنا - سلفر - سیپیا یا سپائی جیلیا دینا چاہیے -

(۲) دیگر علامات کے ساتھ بیلادونا - سائیکوٹا - جیسیم - اگیس - ہیوسکس - سٹرامونیم اور نکس و امیکا وغیرہ مفید ہیں -

(۳) میں نے عموماً اس کا علاج ایوٹنا اور سنا سے کیا ہے اور دونوں ہی ادویہ کو بہت مفید پایا - لیکن کافی عرصہ تک علاج کی ضرورت ہوا کرتی ہے -

نظر کا کم ہو جانا

AMBLYOPIA

اسباب :- کثرت مباشرت ، کثرت سے نوشی ، چاء اور تباکو کا زیادہ پینا ، دماغ پر چوٹ لگنا ، اعصابی کمزوری ، مرض ہسٹیریا ، مرن ترلہ اور بڑھاپا وغیرہ ۔

علامات :- اس مرض میں بلا کسی ظاہری نقص کے نگاہ کم ہوتی جاتی ہے ۔ دور کی اشیاء دھندلی دکھلائی دیتی ہیں چند ہینوں کے بعد سبز اور سرخ رنگ کی شناخت جاتی رہتی ہے ۔ نیند عموماً کم آتی ہے اور سر میں درد کی شکایت رہا کرتی ہے ۔

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو معلوم کریں ۔ چاء اور تباکو کا استعمال بند کر دیں ۔ اگر کمزوری کے باعث یہ بیماری ہو جائے تو مقویات کا استعمال کریں روز آنکھوں سے زیادہ کام نہ لیں ۔

علاج :- (۱) میں نے عموماً اس مرض کا علاج روٹاسے کیا ہے اور مجھے خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے ۔

(۲) اگر روٹاسے کامیابی نہ ہو اور آنکھ پر زیادہ زور پڑنے کی وجہ سے یہ شکایت ہو گئی ہو تو بیلادونا بہت مفید ہے ۔

(۳) اگر اچانک آنکھ کی روشنی جاتی رہے تو فاسفورس یا سلیشیا

دینا چاہیے ۔

(۴) اگر آنکھوں سے آنسو بہا کثرت جتنے ہوں اور نزلہ کی بھی شکایت ہو تو یو فریشیا اکیر ہے۔

(۵) عام کمزوری سے یا کثرت سے نوشی سے روشنی کم ہو گئی ہو تو چائنا مفید ہے اگر چائنا ایسی حالت میں شفا کے کئی دینے سے قاصر ہے تو مسافر دینا چاہیے۔

(۶) دیگر ادویہ جو اس مرض میں کام آتی ہیں وہ کلکیر یا گارب۔ فیٹرم میور۔ سیپیا۔ نگس دامیکا اور حلیمیم وغیرہ ہیں۔

نظر کا جاتے رہنا

AMAUROSIS

اسباب :- اس مرض کے بھی کم و بیش وہی اسباب ہیں جو نظر کے کم ہو جانے کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں یعنی عصبی کمزوری اکثریت تباہی نوشی و شراب خواری اور ماغ پر چوٹ یا پھوٹ سے وغیرہ کا ہونا مرض آتشک سرخ بخار۔ مدد سر۔ اور غولہ ٹول میں حسیں کا بند ہو جانا وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں نگاہ اچانک کم ہوتے ہوئے بالکل

جاتی رہتی ہے۔ بعض اوقات اس کا حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ آنکھ کی روشنی چند گھنٹوں کے اندر جاتی رہتی ہے ورنہ عموماً سات روز کے اندر روشنی زائل ہو کر مرنی ہے۔ بعض حالات میں تو نگاہ پھر واپس

آجباتی ہے مگر اکثر حالات میں کم ہوتے ہوتے روشنی بالکل خائل ہو جاتی ہے۔
 چکر تیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو دریافت کریں۔ اگر آشک
 یا امراض مفاصل کے باعث یہ مرض ہو گیا ہو تو اس کا علاج ہو اور اسی کے
 مطابق پرہیز کریں۔ اگر احتباس طست کے باعث نظر جاتی رہی ہو تو
 اس کا علاج کریں۔ عصبی کمزوری کی حالت میں مقویات کا استعمال کریں۔
 علیٰ ہذا لقیاس :-

علاج :- اگر سر میں شدید درد ہوتا ہو اور روشنی اچانک زائل
 ہو گئی ہو تو سیپیا بہت مفید ہے۔

(۲) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا مرکب سال ہے۔ اگر یہ دوا
 پورے طور پر عادی نہ ہو سکے تو پھر سلفر سے کام لینا چاہیے۔
 (۳) ڈاکٹر ہینی مین موجد ہومیو پتھی نے اس مرض کا علاج عمومی
 زنگم سے کیا ہے۔

(۴) مندرجہ صمد ادویہ کے علاوہ ادرم۔ بیلا ڈونا۔ نیٹریم سیور۔
 اور چائنا بہت مفید ہیں۔



باب چہارم

امراض ناک و کان

ناک کی بد بو (پینس)

OZDENA

اسباب :- نزہ و زکام مزمن، ناک میں کسی چیز سے خراش پیدا ہو کر زخم بن جانا۔ مرض چیچک و آتشک اور خنازیری مزاج وغیرہ اس کے اہم اسباب ہیں۔ کبھی ناک پر شدید چوٹ کے لگنے سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ علامات :- اس بیماری میں ناک کے اندر کی جھلٹی خراب ہو جاتی ہے۔ ناک سے بد بو دار رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کبھی یہ رطوبت زرد یا سبز ہوتی ہے اور کبھی خون آمیز۔ مریض کی ناک سے اس قدر بد بو آتی ہے کہ پاس والے آدمی سے ہشکل برداشت ہوتی ہے۔ بعد میں ناک سڑ جاتی ہے۔ اور اس میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کیڑے

پڑ جاتے ہیں۔ مریض منہ سے سانس لیتا ہے۔ سونگھنے کی قوت بالکل جاتی رہتی ہے اور ناک کی ہڈی گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے۔ خدا اس مرض سے سب کو محفوظ رکھے۔

بہرہ میز و پدایات :- مریض کو عمدہ آب و ہوا میں رکھیں اور غذا زود ہضم اور مقوی دیں۔ ناک کو دن میں کئی بار گرم پانی سے صاف کر لیا کریں۔

علاج :- ابتدائی حالت میں اس مرض کی سب سے عمدہ دوا کالی بائیکرام ہے۔ اگر اس دوا سے فائدہ نہ ہو تو نائٹرک ایسڈ یا کلکیریا کارب میں سے کوئی ایک دوا حسب علامت دینا چاہیے۔
(۲) میں عام طور سے مرض سینس میں کیڈمیم سلف دیا کرتا ہوں اور اس مرض میں اس دوا کو میں نے عجیب و غریب پایا۔

(۳) اگر مریض میں آتشک کا مادہ موجود ہو تو سفلیئم کی اونچی طاقتیں دینا بہت مفید ہے۔

(۴) امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے اس مرض کا علاج ٹوبرکولینم سے کیا ہے۔ اس کے دینے ہڈی گلنا اور مڑنا بند ہو جاتا ہے۔
(۵) بایو کیمک میں سلیشیا اس مرض کی بہت عمدہ دوا ہے۔

(۶) ان ادویہ کے علاوہ تھریڈن، پٹرو لیم، اورم، مرک، ہائیڈر اسٹس پلسا ٹیلا اور آئیوٹیم بہت مفید ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

ناک میں پد گوشت

NASAL POLYPUS

اسباب :- مرض آتشک ، نسا و خون اور خنازیری مادہ وغیرہ بعض وقت اس کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا ۔
علامات :- اس مرض میں ناک کے اندر مسہ یا تھوڑی سی پد ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں سخت دقت ہوتی ہے ۔ مریض کو اکثر زکام رہتا ہے بعض وقت ناک سے خون آنے لگتا ہے ۔ کبھی وہ تھوڑی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نتھنے پر ابھار سا معلوم ہوتا ہے جس سے انسان کے چہرے پر ایک بد نمائی آ جاتی ہے ۔

علاج :- اس مرض کی سب سے اہم دوائیں چار ہیں کلکیر یا کلاب ۔
ناٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس اور سنگوئیریا ۔

(۱) اس مرض کی سب سے بڑی دوا کلکیر یا کلاب ہے ۔ ہر روز صرف دو خوراک دینا چاہیے ۔ ایک تینہ ڈوا استعمال کر چکنے کے بعد ایک ہفتہ تک بغیر دوا کے مریض کو رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر صبح شام ایک ایک خوراک دینا شروع کر دیں ۔

(۲) اگر تھوڑی سے خون کا سیلان ہوتا ہو تو فاسفورس بہت مفید ہے لیکن اگر آسانی سے خون بہنے لگتا ہو تو سنگوئیریا دینا چاہیے ۔

(۳) رنجیر کی مانند بڑی کے لیے ناٹرک ایسڈ تجربہ دوا ہے ۔

اس دوا کو تھو جا کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینے سے جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۴) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کالی بائیکرم - مرک سال -

پلسا ٹیلا - سلفر اور مرک آئیوڈائنڈ بہت مفید ہیں۔

(۵) بایو کیمک میں سلیشیا اور کلکیریا فاس بہت عمدہ دوائیں ہیں۔

نوٹ :- خارجی طور پر شکچر اوپیم یا ٹیو کریم لگانا بہت مفید ہے۔

نکسیر

EPISTAXIS

اسباب :- اجتماع خون اذماغ میں چوٹ لگنا، ناک میں ہر گوشت،

دوبی مزاج، کالی کھانسی، عام کمزوری، حادث، بخار اور مرض تھیک و غیرہ۔

عورتوں میں حیض رک جانے سے اکثر نکسیر پھوٹا کرتی ہے۔ بلڈ پریشر اور جلگر

کی وریڈوں میں خون کے جمع ہو جانے سے بھی یہ شکایت ہر جاتی ہے۔

علامات :- ناک سے کبھی کبھی قطرہ قطرہ خون نکلتا ہے اور کبھی

دھار باندھ کر جاری ہو جاتا ہے۔ اکثر تھوڑی دیر کے بعد نکسیر بند ہو جایا کرتی

ہے لیکن اگر مریض میں خون کی بہت کمی ہو اور کافی مقدار میں خون نکسیر سے

بہہ جائے تو یہ صورت بعض وقت خطرناک ہو جاتی ہے۔ بوٹھے نوگوں میں

نکسیر کا پھوٹنا سخت تشویشناک ہوا کرتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر شدید درد سر یا بخار کی حالت میں نکسیر

پھوٹے تو اسے فوراً نہ بند کرنا چاہیے کیونکہ اکثر ناک سے خون نکل جانے سے اصل مرض کا قدرتی علاج ہو جاتا ہے۔ نکسیر بند کرنے کے لیے مریض کو ہدایت کی جائے کہ وہ سر کو ذرا پیچھے جھکا کر دو چار بار لمبی سانس لے۔ اس صورت سے اکثر خون بند ہو جاتا ہے اگر اس عمل سے خون بند نہ ہو تو اس کے سر پر اور گتھی پر سرد پانی دھاریں۔ اگر یہ صورت بھی کارگر نہ ہو تو ناک کے نتھنوں کو ہاتھ سے بند رکھیں اور پاؤں گرم پانی میں رکھوا دیں۔ گرم اور نفاخ اشیاء سے پرہیز رکھیں۔

علاج :- (۱) بیرونی ضرب اور چوٹ سے نکسیر بے تو آر نیکا

دینا چاہیے۔

(۲) اگر گرمی یا متانت آفتاب کی وجہ سے خون بے چہرہ سرخ اور تھمایا ہوا ہو، خون سرخ زیادہ مقدار میں نکلے تو بیلا ڈونا مفید ہے۔

(۳) اگر خون بکثرت بے اور بند نہ ہوتا ہو، مریض کمزور ہو تو فاسفورس دینے سے جریان خون رک جاتا ہے لیکن اگر سیاہی مائل خون بہہ رہا ہو تو ہامیلین نمبر ۳ اکسیر کا کام کرتا ہے۔

(۴) اگر نکسیر بار بار پھوٹتی ہو اور اس کا مرض مزمن ہو گیا ہو تو سیلیکٹوٹس نمبر ۶ دینا چاہیے۔ اگر اس دوا سے کئی شفا نہ ہو تو سیلیکٹوٹس نمبر ۳ اکسیر کا کام کرتا ہے۔

(۵) اکثر حالات میں نکسیر کا علاج صرف برائی اونیاسے کیا جاتا ہے۔ برائی اونیاسے کے ناکام ہو جانے پر پلسا ٹیلا دینے سے بالکل آرام

ہو جاتا ہے۔

(۶) باپو کیمک میں فیرم فاس $4 \times$ اس مرض کی اہم دواؤں میں

سے ہے۔

(۷) ان کے علاوہ کروکس، نکس و امیکا، کاربودج، چائنا، اکونائٹ، سپیا، بودشا اور اپیکاک مشہور دوائیں ہیں۔

نزلہ وزکام

COLD, CATARRH, CORYZA

اسباب: سردی کھا جانا، پانی میں بھیگ جانا، گرم غذا کے ساتھ ٹھنڈا پانی پی لینا، قبض کا ہونا، تغیر موسم، خراش پہنچانے والے ذرات کاناک میں چلا جانا وغیرہ۔ جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس کا سبب ایک خوردبینی کیڑا یعنی جرثومہ ہے۔ جو قریب قریب مونہ کے کیڑے سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے یعنی بعض خاندان کے آدمی تمام عمر ہر موسم میں زکام میں بار بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ جن کی کھلی ہسٹری کو دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آباؤ اجداد بھی بار بار اسی مرض کے شکار ہوا کرتے تھے۔

علامات: اس مرض میں طبیعت سُست رہتی ہے۔ سر میں کبھی خفیف دود کبھی سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ چھینکیں آتی ہیں۔ ناک سے

پتلی اور خراش دار رطوبت بہتی ہے۔ بعض حالات میں آنکھوں سے بھی آنسو بہتے ہیں۔ قوتِ شامہ میں کسی قدر ابتری ہو جاتی ہے۔ حلق بھی اندر سے متورم ہو جاتی ہے۔ بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ شدید حالات میں مریض کو بخار آ جاتا ہے۔ پیاس اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بیماری بار بار ہو تو پیچیدگیاں ہونے لگتی ہیں اور مرض مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے۔

پرہیز و ہدایات:- معمولی زکام میں اگر ذرا سی احتیاط سے کام لیا جائے تو دو ایک روز میں خود بخود آرام ہو جاتا ہے۔ سردی سے حتیٰ الوسع بچنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے گرم کرنا چاہیے اور رات کو کھاف وغیرہ اٹھ کر لیٹنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے گرمی سے پسینہ کا اخراج ہو کر مرض میں کمی ہو جایا کرتی ہے۔ غذا نہایت ہلکی دیں۔ ثقیلی اور توش امشیاء سے پرہیز کریں۔

علاج:- (۱) ابتدائی حالت میں اکونائٹ $\times$ ۳ جادو کا سا کام کرتا ہے۔ ہر تین گھنٹہ کے بعد ایک خوراک دینا چاہیے۔

(۲) اگر چھینکیں کثرت سے آتی ہوں۔ آنکھ اور ناک سے سوزشی پتلی رطوبت ٹپکتی ہو تو ایلم سپیا دینا چاہیے۔

(۳) اگر تمام جسم میں درد ہوتا ہو، چھینکیں بکثرت آتی ہوں اور مریض دھوپ میں یا آگ کے قریب رہنا پسند کرتا ہو تو جلسیم نہایت مفید ہے۔

(۴) اگر زکام یکساں ہو اور سہرا زرد گاڑھا بلغم نکلتا ہو، اور ناک

کبھی تو بند ہو جاتی ہو اور کبھی جاری ہو جاتی ہو۔ پیاس کی شدت نہ ہو تو پلسا ٹیلا دوا ہے۔ اگر پلسا ٹیلا دینے کے بعد کچھ کسر رہ جاتی ہے تو برائی ادھیا دینے سے بقیہ تکلیفیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔

(۵) اگر سر میں سخت درد ہو، زکام یکایک خشک ہو گیا ہو، مریض کا چہرہ تپتا یا ہوا ہو، خشک کھانسی آتی ہو تو بیلادونا دینا چاہیے۔ اگر بیلادونا آرام دینے سے قاصر رہے تو برائی ادھیا دینا چاہیے۔

(۶) نزلہ دن کو ہے اور رات کو نٹھے بند ہو جائیں، قبض ہو، بار بار پاخانہ کی حاجت ہو تو نکس دایکا بہت مفید دوا ہے۔

(۷) اگر زکام بکثرت بہتا ہو اور آنکھ سے سوزشی اور بن دار آسو بہتے ہوں تو یوفریشیا مفید ہے۔

(۸) اگر چھینکیں آتی ہوں، بغم گاڑھا نکلتا ہو، تمام جسم میں درد ہو، ناک سرخ ہو گئی ہو اور اس میں دانے پڑ گئے ہوں یا زخم کی کیفیت پیدا ہو گئی ہو تو مرک سال دینا چاہیے۔

(۹) مزمن نزلہ میں پہلے سلفر دینا چاہیے اس کے ایک ہفتہ کے بعد گلگیر یا کارب شروع کرنا چاہیے۔ پھر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد سلینیا دینا مفید ہے۔ اکثر حالات میں یہ تینوں دوائیں پڑا سنے نزلے کا قلع قمع کر دیتی ہیں۔

(۱۰) میں نے مزمن نزلہ میں اکثر کیسوں میں بسی لیم دیا ہے اور مجھے اطمینان بخش نتائج حاصل ہوئے ہیں۔

(۱۱) بایو کیمیک میں فیرم فاس اور کالی میور کے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۱۲) مندرجہ بالا ادویہ کے علاوہ سورنیم - ڈلکارا - کیہو ملا -

آرسنک - آرم ٹرانفلم - نیٹرم میور - فاسفورس - انٹیم ٹارٹ - ہیرسپرفر -
اپیکاک - کالی آئیوڈائڈ اور ہائڈراسٹس وغیرہ مفید ہیں۔

بہرہ بین

DEAFNESS

اسباب :- کان میں بد گوشت ، کان کے پردہ پر چوٹ لگ جانا ،
ضعف دماغ ، بخار ، چیچک ، آتشک ، امراض مفاصل اور خرابی خون
وغیرہ ۔ اس کے علاوہ سخت سردی کے باعث یا توپ یا گولے کی تیز
آواز سے کان بہرے ہو جاتے ہیں ۔ بعض وقت کان میں میل بھر جانے
سے انسان ادبچائے لگتا ہے ۔ سوڈا سلی سلاس یا کوئین کے کثرت
استعمال سے بھی سماعت میں نقص ہو جاتا ہے ۔ گہرے پانی میں کام
کرنے والے کو عموماً بہرہ بین ہو جاتا ہے ۔

علامات :- قوت سماعت میں ابتری ہو جاتی ہے ۔ آوازیں
صاف نہیں سنائی دیتی ہیں ۔ بعض وقت سماعت بالکل جاتی رہتی
ہے ۔ کبھی کانوں میں گاڑی چلنے کی سی آواز آتی ہے یا چلکی سی چلتی ہوئی
معلوم ہوتی ہے ۔ بعض حالات میں کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں

آتی ہیں جس سے مریض کو سخت اُجھن ہوتی ہے۔

پیرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو سمجھ کر پیرہیز اور علاج کرنا چاہیے۔ اگر کان میں محض میل کی وجہ سے یہ تکلیف ہو تو کان میں گلیسرین یا کرڈا تیل ڈال کر میل صاف کر لینا چاہیے۔ اگر کان کا پردہ پھٹ جانے کے باعث اونچا سنائی دیتا ہو تو مصنوعی آلہ کان میں لگا کر بات کیا کریں۔ اگر دماغ کی کمزوری اس کا باعث ہو تو مقویات کا استعمال کریں۔ علیٰ ہذا القیاس علاج :- (۱) اگر کان بہتا بھی ہو یا نزلاوی بگاڑے اونچا سنائی دیتا ہو تو مرکب سال بہترین دواؤں میں سے ہے۔ اگر مرکب سال فیل ہو جائے تو پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکام رہے تو سلفر یا کلکیر یا کارب دینا کافی ہے۔

(۲) اگر کان پر چوٹ لگ جانے کے بعد ثقل سماعت کی شکایت ہو تو آرنیکا دینا چاہیے۔

(۳) کان میں درد ہو اور تپکن ہو۔ کان میں ٹھنسیاں ہوں جن میں کھجلی ہوتی ہو۔ بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہو تو ہیمپربہت مفید ہے۔

(۴) اگر کانوں میں بجنے کی سی آواز سنائی دیتی ہو تو چائنا بہت مفید ہے۔

(۵) ۱۔ پانی میں کام کرنے سے بہرہ پن۔ کلکیر یا کارب۔

ب۔ انفلوانزہ کے بعد بہرہ پن۔ جلمیم۔

ج۔ لال بخار کے بعد بہرہ پن۔ ہیمپرب۔

- ۷۔ چیچک کے بعد بہرہ پن - سلفر -
 ۸۔ خسرہ کے بعد بہرہ پن - مرک سال اور پلسا ٹیلا -
 ۹۔ ٹائیفاؤڈ کے بعد بہرہ پن - فاسفورس -
 ز۔ گٹھیا بانی کی تکلیف سے بہرہ پن - سلفر - بعض وقت
 برائی ادویہ اور کاسٹم -

- (۶) مزمن بہرہ پن میں جبکہ کان میں بھنبھناہٹ کی سی آوازیں آتی
 ہوں تو گریفائٹس عجیب و غریب کام کرتا ہے -
 (۷) دیگر ادویہ جو نہایت اہم ہیں وہ وہ بیسم، آئیوڈیم - سیپیا -
 سلینیا - کالی میور - لائیکو اور لیکینس وغیرہ ہیں حسب علامت دینا چاہیے -
 (۸) خارجی استقبال کے لیے مولین آئل کے چند قطرے صبح و شام
 کان میں ڈالیں -

کان کا بہنا

OTORRHOEA

اسباب ۱۔ کان میں زخم، کان میں پھنسی، سردی، مرض خا زیر،
 قیض، کان میں کچھ پڑ جانا - مرض چیچک، خسرہ - ڈفتھیریا اور بخار
 وغیرہ اس کے اہم اسباب ہیں علاوہ ازیں بعض جلدی امراض سے
 بھی کان بہنے لگتے ہیں -

علامات :- کان سے پہلے رقیق مواد خارج ہوتا رہتا ہے جو بعد میں درد اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات کان میں درد ہوتا ہے اور کان کی نالی متورم ہو جاتی ہے۔ عرصہ تک کان بستے رہنے سے عموماً ثقل سماعت کی شکایت ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- حتی الامکان کان کو صاف رکھیں۔ مریض کو قابض چیزوں کے استعمال سے روکیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں پمپاٹیلہ کی چند خوراکیں عجیب و غریب اثر دکھاتی ہیں بعض کیسوں میں اس کے بعد سلفر دینا پڑتا ہے اور مریض کو ٹفٹے کٹی ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر سخت متعفن قسم کا مواد نکلتا ہو اور کان بہنے کا مرض مزمن ہو گیا ہو تو سورنیم دینا چاہیے۔

(۳) کانوں میں درد، جس کی زیادتی رات کو ہو، کان سے متعفن گاڑھا اور زرد رنگ کا سیلان ہو تو مرکب سال بہت مفید ہے۔ (۴) اگر مواد سرد اور نکلتا ہو اور کانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہوں تو گریفائٹس دینا چاہیے۔

(۵) جب کان بہنے کا مرض پُرانا ہو جائے تو سلفر، کلکیر یا کارب اور لائیو بالترتیب ایک ایک ہفتہ تک یا اس سے زائد وقفہ سے مسلسل دینا بہت مفید ہے۔

(۶) جب رطوبت سے پھلی کی سی بو آتی ہو، رطوبت جہاں پر سے

گزرتی ہو وہاں دانے پڑ جاتے ہوں تو ٹیلوریم اکیسیر کا کام کرتا ہے۔

(۷) بایو کیمیک میں سلیشیا اس مرض کی مجرب دوا ہے۔

(۸) منہ رجبہ صدر ادویہ کے علاوہ ہائڈراسٹس - ہیپر - اورم -

فیرم فاس، آئیوڈیم - کالی بائی - کاربودج اور ایپس نہایت اہم دوائیں ہیں

(۹) خارجی استعمال کے لیے مولین آئل اس مرض کی خاص دوا ہے۔

کان کا درد

OTALGIA

اسباب :- سردی لگنا - کان میں کچھ پڑ جانا، کان میں پھوڑا یا پھنسی کا
نکلنا، کسی دانت کا بوسیدہ ہونا - امراض مفاصل (گٹھیا بائی) کان کا درم
اور حلق کے غدودوں کا متورم ہو جانا وغیرہ وغیرہ -

علامات :- کبھی کان میں رگ رگ کر درد ہوتا ہے اور بعض وقت

مسلل شدید درد ہوتا ہے - مریض درد سے بے چین ہو جاتا ہے -

بعض وقت اس کی ٹیسیں چہرہ اور پیشانی تک جاتی -

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو دریافت کرنا معالج کا

فرض اولین ہے - چنانچہ اگر کان میں کچھ پڑ گیا ہے تو اس کو احتیاط سے

نکال دینا چاہیے - اگر دانت کی خرابی سے درد ہوتا ہو اس کو نکال دینے

سے بغیر کسی دوا کے استعمال کے درد خود بخود اچھا ہو جاتا ہے - اگر

مریض کمزور ہو تو اُسے مقوی غذا دینا چاہیے۔ سردی سے کان میں درد ہوتا ہو تو کنپٹی کے قریب محض سینکے سے اکثر آرام ہو جاتا ہے۔

علاج ۱:- (۱) جب کوئی ظاہری سبب کان کے درد کا نہ معلوم ہو اور مریض درد سے تڑپ رہا ہو تو کیمو ملا کی چند خوراکیں جلد جلد دہرانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ بچوں میں کان کے درد کے لیے یہ خاص دوا ہے۔

(۲) اگر چہرہ تنمایا ہوا ہو سخت قسم کا درد ہوتا ہو درد یکایک آتے ہوں اور غائب ہو جاتے ہوں رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو تو بیلا ڈونا اکسیر کا کام کرتا ہے اس کو گلیسرین میں ملا کر خارجی طور پر بھی استعمال کرنا چاہیے۔ دوا کے کان میں پڑتے ہی سکون ہو جاتا ہے۔

(۳) میں نے شدید کان میں درد کی حالت میں اکثر اکونائٹ X دوا ہے جس نے کیمو ملا سے کہیں بہتر کام کیا ہے۔

(۴) اگر کان میں درد کے ساتھ ساتھ کچھ مواد کا بھی اخراج ہو رہا ہو تو مرک سال بہت مفید ہے۔ اگر مرک سال فائدہ پہنچانے سے قاصر رہے تو پھر پلہا ٹیلا دینا چاہیے۔

(۵) اگر کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا ہو اور علامات ملی جلی معلوم ہوتی ہوں تو سلفر سے یقینی فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۶) بایو کیمک میں گنیشیا فاس درد کان کی خاص دواؤں میں سے ہے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ پلانٹیکو کلیر باکارب۔ فیرم فاس۔

آرمیکا - پلاسٹا اور ڈکمارا وغیرہ مفید ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

کان کا درم

OTITIS

اسباب :- چوٹ ، کان میں خراش کا ہونا ، سردی لگ جانا ، سرخ بخار ، چیچک ، امراض مفاصل اور غنازیہ وغیرہ۔

علامات :- کان میں درم دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی تو صرف کان کے بیرونی حصہ میں ہوتا ہے اور کبھی کان کے اندرونی حصص ماؤف ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں کان میں خفیف گرائی معلوم ہوتی ہے پھر کان میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ سماعت میں فرق آ جاتا ہے اور کسی قدر ٹیسر ہو جاتا ہے۔ کان کی اندرونی نالی اور پردہ سُرخ اور متورم ہو جاتا ہے۔ بہت چھوٹے بچوں میں اگر تشنگی دوسرے اس مرض کے ساتھ شروع ہو جائیں تو بچہ مشکل سے بچتا ہے۔ بڑوں میں اگر کان کا درم دماغ کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایک نہایت خطرناک علامت سمجھنا چاہیے۔ بعض حالات میں کان کی ہڈیاں مردار پڑ جاتی ہیں اور کبھی سرسامی کیفیت ہو جاتی ہے

علاج :- (۱) اگر بیرونی کان میں درم ہو ، شدید درد نیز خارش ہو تو پلسا ٹیلا کو مہربان میں سے سمجھنا چاہیے اگر پلسا ٹیلا ناکام

رہے تو مرک سال دینا چاہیے لیکن اگر ماؤفہ حصص میں بے حد ذکی اگس ہو تو میسر بہت مفید ہے۔

(۲) اگر کان کے اندرونی حصص میں جس کے پاک جانے کا اندیشہ ہو ورم ہو اس وقت بھی پہلے پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔

(۳) ابتدائی حالت میں شدید ورم، سرخی اور تشکن ہو اگر رک کر شدید قسم کا درد ہوتا ہو تو بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔

(۴) اگر آتشکی یا خنازیری مزاج والے کے کان میں ورم ہو جائے یا جس میں مواد پڑنے لگے تو مرک سال بہتر کام کرتا ہے۔

(۵) کان میں مزمن ورم ہو، کان بہتا ہو، مریض کو اونچا سنائی دیتا ہو، خاندان میں دق کی ہسٹری موجود ہو تو گلگیر یا کارب ایک بھرب دوا بن جاتی ہے۔

(۶) کان کا مزمن ورم سخت متعفن قسم کے مواد کا اخراج اور نیم دینا چاہیے۔ سورنیم اس وقت بھی مفید ہے جب بہترین منتخب شدہ ادویہ فیل ہو گئی ہوں اور تمام تدابیر بیکار ثابت ہوئی ہوں۔

(۷) مندرجہ بالا ادویہ کے علاوہ ٹیلوریم، کالی میور، فیرم فاس، نائٹرک ایسڈ، سلیشیا اور ہائڈروکسیٹس نہایت اہم ادویہ ہیں جسب توقع دینا چاہیے۔

پایہ

امراض منہ اور حلق

زبان کا کینسر۔ سرطان زبان

CONCER OF THE TONGUE

اسباب :- کسی خراش کے باعث زبان پر زخم ہو جانا۔ زبان کا فرس
ورم۔ مرض آتشک اور زبان میں شگاف وغیرہ۔

علامات :- یہ بہت خبیث مرض ہے۔ اس میں زبان متورم ہو جاتی
ہے۔ زبان کی سطح پر سرطانی زخم بن جاتا ہے جس سے بدبودار مواد خارج
ہوتا رہتا ہے۔ زبان کے نیچے کے غدود بھی درم کر آتے ہیں۔ زبان
چمک جاتی ہے۔ رال بکثرت ہوتی ہے۔ مریض بولنے اور کھانے
پینے سے معذور ہو جاتا ہے۔ سونا حرام ہو جاتا ہے۔ زخم بڑھتے بڑھتے
جبرے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا مواد جذب ہوتے

رہنے سے ایک قسم کی سمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض دن بدن کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اور اس حالت میں چار چھ مہینہ میں راہی ملک دم ہو جاتا ہے۔

ہر مہینہ و ہدایات :- ہر چند یہ مرض علاج پذیر نہیں، لیکن اگر ہومیو پتھک دوا ٹھیک وقت پر اور بالکل علامت کے مطابق دی جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ مریض کو مقوی غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم دینا چاہیے۔ اگر مریض سے کوئی چیز قطعی نہ لگی جاتی ہو تو مریض کو بھوکوں نہ مارنا چاہیے بلکہ غذائی انہما سے کام لینا چاہیے یعنی بذریعہ انہما غذا پہنچانا چاہیے۔

علاج :- اس مرض کی مخصوص دوائیں :- آئیو ڈیم - ہائڈر اسٹس - آرٹک - فائیڈولا کا بکیس، سلفر، کاسٹم - اور ماسٹ سیلیشیا -

ہائٹرک ایڈ اور کاربوج وغیرہ ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

دانت کا درد

TOOTH ACHE

اسباب :- دانتوں کی گندگی، دانت کی بوسیدگی، اچھا و مرتبہ کا کثرت استعمال، امراض مفاصل، بد ہضمی، پارہ کا استعمال، دانتوں میں کیڑا لگ جانا۔ بادی چیزوں کے استعمال سے مسوڑھوں کا پھول جانا وغیرہ بعض عورتوں میں حمل کے دنوں میں بلا کسی ظاہری وجہ کے

دانت میں کبھی کبھی درد ہوا کرتا ہے۔

علامات :- دانت میں شدت کا درد ہوتا ہے جو خصوصاً رات کے وقت اور بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ مسوڑھا متورم ہو جاتا ہے۔ شدید حالات میں چہرہ پر بھی درم آ جاتا ہے اور مریض کو بولنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- ترشی، بادی نیز سرد اشیاء کا استعمال قطعی ترک کرادیں اور مریض کے سیدہ کی اصلاح رکھیں۔ پان کھانا بالکل بند کرادیں۔ دانتوں کو صبح و شام کسی برش یا مسواک سے صاف کریں یا مناسب منجن دونوں وقت دانتوں پر ملیں۔

علاج :- اگر دانت بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے درد کرتا ہو تو کیموٹا۔ آرتیکا۔ پلسا ٹیلا۔ مرک۔ کافیا۔ رٹانی سیگرا یا اور کلکیر یا کا دب بہترین دواؤں میں سے ہیں۔

(ا) بوسیدہ اور کھوکھلے دانتوں میں (ا) اگر درد شدت کا ہوتا ہو جس کی ٹیسیں کانوں تک پہنچتی ہوں اور گرم اشیاء کے کھانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، رخسار سرخ اور گرم ہوں تو کیموٹلا دینا چاہیے۔
(ب) اگر ٹھنڈے پانی سے درد دانت کو آ عام ملتا ہو اور درد صرف ایک جانب ہوتا ہو۔ کھلی ہوا میں رہنے سے درد میں سکون ہو لیکن گرم کمرہ میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔ پلسا ٹیلا کے فیل ہو جانے پر کیمپیش دینا چاہیے۔ (ج) اگر پھاڑنے والا درد ہوتا ہو۔ دودکان تک

پہنچتا ہو، مسوڑھے متورم ہوں یا پاک گئے ہوں تو مرک سال عمدہ دوا ہے۔ بوسیدہ دانتوں کے درد میں عموماً مرک سال ہی کی علامات ملتی ہیں۔ (د) اگر دانتوں میں ٹھنڈا پانی لگتا ہو، دانت سیاہ ہو گئے ہوں رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ دانتوں کی پوری صفت ماؤٹ ہو گئی ہو۔ درد کی ٹیس کانوں تک جاتی ہو تو رسانی سگر یا عجیب و غریب دوا بن جاتی ہے۔ (س) بچوں میں درد دانت کی تکلیف اگر ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے بڑھ جاتی ہو تو کافی دینا چاہیے۔ (مس) اگر دانت سرخ گئے ہوں۔ مسوڑھوں سے خون بہتا ہو تو کریا زوٹ مفید ہے۔ (ص) اگر ہستون منتخب شدہ ادویہ فیل ہو جائیں تو کلکیر یا کارب دینا چاہیے۔ اعصابی درد کے لیے بیلا ڈونا۔ سپائی جلیا۔ پلانٹیکو۔ آکونائٹ نکس و امیکا اور کافی مفید ہیں۔

(۲) اعصابی درد میں (۱) ابتدائی حالت میں اگر اعصابی درد ہوتا ہو۔ جیسے اور دماغ تک درد کی ٹیس پہنچتی ہو تو اکونائٹ دینا چاہیے۔ اکونائٹ کے فیل ہونے پر کافی دینا مفید ہے۔ اگر کافی بھی فیل ہو جائے اور عرضی درد کے مارے شل پھلی کے تڑپ رہا ہو۔ گرم چیز سے درد اور بھی بڑھ جاتا ہو، دانت حد درجہ ذکی الحس ہوں تو کیمولا دینا چاہیے۔ تھوہ کے استعمال سے پیدا شدہ درد دانت کے لیے بھی یہ عجیب دوا ہے۔ (۳) درد دانت جس کے ساتھ درد سر بھی پایا جائے۔ مریض زور زور سے کراہتا ہو۔ مسوڑھے متورم ہوں۔ پھر تھوہ یا تھوہ تو بیلا ڈونا مفید ہے۔

(ج) کھوکھلے دانت میں جھکے والا درد، ٹھنڈی چیزوں سے تکلیف
 بڑھ جاتی ہو نیز کھانے کے بعد اور تبا کو نوشی سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہو
 توستانی سیکریا دینا چاہیے۔ (د) دانت میں درد، دانت ذکی آگس ہوں
 سوڑھے متورم ہوں اور درد نوبتی قسم کے ہوں۔ دانت لمبے محسوس ہوں
 تو پلانٹیکو کی چند خوراکیں مریض کو معالج کا محسوس احسان بنا دیتی ہیں۔
 اس کا مدر شنگو خارجی طور پر بھی لگا سکتے ہیں۔
 مندرجہ صدرہ اوڈوں کے علاوہ ہیومکس لیکسیس۔ برائی اوڈنیا۔
 رشاکس۔ گنیشیا کارب اور آرنیکا مفید ہیں۔

پائیوریا۔ مسوڑھوں سے پیپ آنا

PYORRHOEA

اسباب :- دانتوں کو باقاعدہ صاف نہ کرنا۔ امراض مناسل
 مرض آتشک۔ معدہ کی خرابی وغیرہ۔
 علامات :- اس مرض میں مسوڑھوں کے کنارے متورم ہو جانے
 ہیں۔ جن کے نیچے سے پیپ آتی ہے۔ دانتوں پر سخت قسم کا میل جم جاتا ہے۔
 مریض کے منہ سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ پاس بیٹھنے والے کو برداشت
 نہیں ہوتی۔ آخر میں دانت بوسیدہ ہو کر گر جاتے ہیں اور مریض پوپلا ہو کر
 اس مرض سے نجات پاتا ہے۔

پر ہمیں وہ آیات :- یہ مرض آج کل عام ہو رہا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے یہ سخت غلطی ہے کیونکہ مواد اور پیپ کی کمیت رفتہ رفتہ خون میں جذب ہوتے رہنے سے کئی قسم کے خطرناک امراض اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے مریض کو چاہیے کہ دانتوں کو برشل یا مسواک سے باقاعدہ صاف رکھے۔ کھانا کھانے کے بعد گلی اور غرارہ کرنا چاہیے۔ بادی اشیاء ترک کر دینا چاہیے۔ زود مضام اور لطیف غذا کا استعمال بہتر ہے۔

علاج ۱۔ (۱) اگر مسوڑھوں سے خون اور مواد آتا ہو۔ مسوڑھے ذکی اگس ہوں، دانت ملتے ہوں اور مسوڑھے دانتوں سے چھٹ جائیں تو کاربوج سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) اگر دانت ڈھیلے محسوس ہوں، مسوڑھے اور قحک کے فمدوم متورم ہوں جن سے خون نکلے، منہ سے تعفن آئے، قحک کی زیادتی ہو اور مسوڑھے درد کرتے ہوں تو مرک سال بہت مفید ہے۔ اگر مرک شفا میں سے قاصر رہے تو ہیرسلفر دینا چاہیے۔

(۳) مسوڑھے دانتوں سے آگے ہو جائیں مسوڑھوں کو ذرا سا دبانے سے خون نکل آئے۔ دانتوں پر سفید یا زرد میل ہو نیز ذکی اگسی پالی جائے گو فاسفورس دینا چاہیے۔

(۴) پارہ کے ناجائز استعمال کے بعد مسوڑھوں میں ورم اور درد مسوڑھوں سے خون ہے، مسوڑھوں کا رنگ نیلگوں ہو منہ کھولنے میں دقت ہوتی ہو لکسیس مفید ہے۔

(۵) بایو کیمیک میں نیٹریم میور $\times ۶$ مرض پائیوریا کا بہترین علاج ہے۔
 (۶) دیگر ادویہ جو مفید ہیں وہ امونیا کارب، پلسا ٹیل، سلیشیا،
 سلفر اور اپیکاک وغیرہ ہیں۔

منہ کا آکھ

CANCERUM ORIS

اسباب :- یہ مرض عموماً چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے جو نہایت
 کثیف رہتے ہیں یا جن کو غذا اچھی نہ ملتی ہو۔ خسرہ یا موسمی بخاروں کے
 بعد بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس
 مرض کے باعث چند خود بینی جراثیم ہیں۔

علامات :- ابتدا میں ماؤفہ رخسار متورم اور بالکل چکنا ہو جاتا ہے
 سانس سے بدبو آتی ہے۔ منہ سے تھوک بکثرت بہتا ہے۔ منہ کے اندر
 سفید یا سیلے رنگ کا زخم دکھائی دیتا ہے۔ یہ زخم بڑھتا رہتا ہے کبھی یہ
 زخم محض سطحی ہوتا ہے لیکن بسا اوقات گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ بخار
 تیز ہو جاتا ہے رخسار گلے لگتا ہے اور اس میں سوراخ بن جاتا ہے۔
 کبھی سلا ہونٹ سڑ جاتا ہے نہایت شدید حالات میں چہرہ کی ہڈیاں
 بھی ماؤف ہو جاتی ہیں۔ مریض پر بیوشی طاری ہو جاتی ہے اور اسی عالم
 میں وہ فوت ہو جاتا ہے۔

پر ہمیشہ ہدایات :- اس خطرناک مرض کا علاج نہایت ہوشیاری سے کرنا چاہیے۔ مریض کے منہ کو کسی مناسب لوشن سے صاف رکھیں۔ مواد اور صاف جگہ پر مریض کو لٹائیں اور ابتدا ہی سے مقوی غذا پر مریض کو رکھیں۔ شوربہ، دودھ، بخنی اور انڈے وغیرہ کھانے کو دیں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا مرکب سال ہے۔ اگر مرکب سال فیل ہو جائے تو آرٹک دینا چاہیے۔

(۲) اگر چہرہ کافی متورم ہو، رقیق چیز نگلتے وقت دم گھٹے۔ تالو اور حلق کا رنگ ارغوانی یا نیلا ہو۔ منہ کے زخموں کا رنگ سلیٹی ہو، حلق میں سہی کیفیت پیدا ہو گئی ہو۔ زبان بھاری ہو جائے۔ منہ وقت سے کھلتا ہو تو لیکسیس و داجیرٹ انجینز کام کرتی ہے۔

(۳) متعفن زخم، سفلس کے مریضوں میں پارہ کے استعمال کے بعد زخم۔ گالوں کے اندرونی جانب زخم کے داغ یا چٹے جن میں پھر کا سادرد ہو، تھوک خون آمیز اور متعفن اور تھوک کی زیادتی، آشکی زخم، حلق میں سوسپوں کی سی ٹھجن وغیرہ علامات میں نائٹک ایسڈ دینا مفید ہے۔ (۴) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ بوریس، سٹانی سیکریا۔ سلفر۔

سلفورک ایسڈ۔ کالی آئیو ڈائڈ۔ میورٹیک ایسڈ۔ آئیو ڈیم۔ اور ہائڈراسٹس وغیرہ نہایت اہم ادویہ ہیں۔

منہ کے پھالے

STOMATITIS

(دیکھو منہ آنا (حصہ دوم)، امراض اطفال کے تحت میں)

حلق کے غدود کا ورم

TONSILITIS

اسباب :- غلبہ خون - خراب غذا - گندمی اور بدبودار ہوا سانس میں لینا - امراض مفاصل - سردی لگنا - بارش میں بھیگ جانا، نزلہ اور ناکام وغیرہ - جدید تحقیق کے مطابق یہ ایک جراثیمی مرض ہے - ایک خاص قسم کے خوردبینی جراثیم حلق کے ذریعہ جسم میں داخل ہونے میں تو یہ غدود ان کو روک لیتے ہیں اور خود ماذن ہو کر متورم ہو جاتے ہیں - علامات :- منہ کھول کر دیکھنے سے حلق کے اندر کے دونوں غدود متورم اور سرخ نظر آتے ہیں - بخار چڑھ جاتا ہے، کھانسی آنے لگتی ہے حلق میں سرسراہٹ ہو جاتی ہے - شدید حالات میں تیز بخار چڑھتا ہے اور مریض کو پانی پینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات غدود میں مواد پڑ جاتا ہے اور وہ پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں - پرہیز و ہدایات :- موسم سرما میں مریض کو سردی سے بچائیں -

سرد پانی ہرگز نہ پینے دیں، غذا میں کھجری - صابودانہ - مونگ کی دال کا پانی -
دودھ اور دیگر ہمو قسم کی علیف اشیاء دیں - نیگرم پانی سے بار بار غرغہ کرائیں
علاج :- اس مرض میں سب سے پہلے عموماً سیلا ڈونا، مرک
برٹیا کارب، فائیٹولا کا عہدہ میسر میں سے کسی ایک دوا کے دینے سے
شفا ہو جاتی ہے -

(۱) حلق کے غدود سرخ اور متورم ہوں ننگے میں تکلیف ہوتی ہو -
غدودوں میں سخت درد ہو تو سیلا ڈونا دینا چاہیے - مرض شروع ہوتے ہی
اس کی چند غرائیں پہنچ جانے سے حیرت انگیز افاقہ ہوتا ہے -

(۲) اگر رول کی کثرت ہو جس کو ننگے میں دقت ہوتی ہو - غدود
بہت زیادہ متورم ہوں - حلق میں جلن اور ڈنک گنے کا سا درد ہو اور غدود
پکنے کی طرف مائل ہوں تو مرک سال بہت مفید ہے عموماً جب سیلا ڈونا
فائدہ نہ پہنچا سکے تو مرک دینا پڑتا ہے -

(۳) غدودوں کا مزمن درم جب کہ وہ پکنے کی طرف مائل ہوں -
تو برٹیا کارب اکیر ہے -

(۴) اگر غدودوں کا رنگ نیلا ہو، حلق میں درد نیز خشکی اور
گرمی ہو زبان کی جڑ میں ننگے دقت درد ہوتا ہو تو فالی ٹولا کا دینا چاہیے -

(۵) جب غدود پکتے ہوئے معلوم ہوں - ننگے دقت حلق میں چھلین
یا پھر کا احساس ہو غدود درد کریں جن کی ٹیس کا نوں تک جائے نیز حلق
میں خشکی ہو تو ہیر سلفر دوا ہے -

(۶) بایو کیمیکس میں فیرم فاس اور کالی میوری کے بعد دیگرے دینا مفید ہے۔
 (۷) اگر مندرجہ صدر ادویہ شفا دینے سے قاصر رہیں یا علامات ان ادویہ کے مطابق نہ ہوں تو اگنیشیا - رٹاکس - کلکیر یا کارب - ٹوبرگولینیم - سورینیم - کالی بائیکرام - لیکسیس اور آئیوڈیم میں سے کوئی دوا علامات کے مطابق دینا چاہیے۔

حلق کا ورم

PHARYNGITIS

(نیز دیکھو ورم مخمرہ)

اسباب :- مرض خناق، کواگرنا - حلق میں کسی چیز سے خراش ہو جانا۔
 پانی میں بھیک جانا - کثرت تنباکو نوشی - فساد خون - نزلہ کا بگڑ جانا۔
 سرد یا مرطوب ہوا کا لگنا - زرخہ کی سوزش، تیز آواز سے بولنا اور چلنا۔
 اور مرض جھپک اور آتشک وغیرہ۔

علامات :- آواز بیٹھ جاتی ہے - حلق میں خشکی اور کھڑکھڑ پن کا احساس ہوتا ہے، پیاس بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوا بھی ماؤن ہو جاتا ہے تو مریض کو کھانسی آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے۔ جسے مریض بار بار نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبان کا رنگ سلیشی مائل ہو جاتا ہے۔

ہر ہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کے مطابق مریض کو ہر ہیز کرائیں۔ چنانچہ اگر محض سردی سے یہ مرض ہو گیا ہو تو مریض کو سرد اشیاء سے ہر ہیز کرائیں۔ حلق میں درم کی حالت میں مونگ کی دال کا پانی یا حریرہ وغیرہ دینا مناسب ہے۔ ثقیل، بادی اور ترش اشیاء ہرگز نہ استعمال کریں۔

علاج ۱۔ حلق میں درم کے لیے بیلڈوٹا، مرک، میکسیس، ہلفر اور کیسکم چوٹی پر کی دوائیں ہیں۔ ان کے علاوہ آرام ٹرائفلیم، ہیپیر، کالی کلورٹیم، کالی بانی اور ایوٹنا بھی اہم دواؤں میں سے ہیں۔ سب علامات دینا چاہیے۔

درم حنجرہ

LARYNGITIS ' SORE THROAT

اسباب :- اس مرض کے قریب قریب وہی اسباب ہیں جو حلق کے درم میں مذکور ہو چکے ہیں یعنی سردی لگنا، بارش میں بھیگ جانا، شدید کھانسی، زور سے گانا یا چلانا، حنجرہ میں کسی خراش کا ہو جانا، مرض چیچک، زکام، اسل اور آتشک وغیرہ حلق میں درم کے ساتھ بھی اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کثرت تمباکو نوشی بھی اس کا ایک سبب ہے۔ علامات :- گلے میں خراش یا سرسراہٹ معلوم ہوتی ہے۔ آواز

بیٹھ جاتی ہے۔ تکلم میں تکلیف ہوتی ہے۔ بار بار کھانسی آتی ہے۔ بلغم کبھی زیادہ اور کبھی کم خارج ہوتا ہے۔ گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور کھانتے وقت بسا اوقات غلغلہ خوں کی آواز نکلتی ہے اور کسی قدر حرارت بھی ہو جاتی ہے۔

برہمیز و پدایات :- مریض کو گرم کمرہ میں آرام سے لٹائیں اور اسے گفتگو کرنے سے باز رکھیں کیونکہ زیادہ تکلم میں حجرہ میں خراش پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ غذا بالکل ہلکی دیں۔ مونگ کی کھجڑی یا مونگ کی دال کا پانی و شوربا و حریرہ وغیرہ دیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جبکہ مریض کو بخار بھی ہو تو اکوٹائٹ سے علاج شروع کرنا چاہیے۔

(۲) اگر اکوٹائٹ فیل ہو جائے تو بیلا ڈونا دینا چاہیے۔ بیلا ڈونا میں آواز بھرائی ہوتی ہے یا آواز بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ کھانسی خشک ہوتی ہے اور غدد متورم ہوتے ہیں۔ جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ حلق اور حجرہ میں درد ہوتا ہے۔ بہر حال حاد کیفیت میں یہ دوا اکیس ہے۔

(۳) اگر بیلا ڈونا دینے کے باوجود درد میں کمی نہ ہو تو مرکب دینا چاہیے حلق میں جلن، غدد شدید متورم۔ حلق بالکل خشک، حلق میں کسی چیز کے چپکنے کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ مرکب کی خاص علامتیں ہیں۔

(۴) اگر حلق کا رنگ سیاہی مائل ہو، حلق میں گولہ کا احساس ہو۔ حلق میں شدید درد ہو۔ ٹھوس چیز کے مقابلہ میں رقیق اشیاء کے نگھلنے میں

زیادہ تکلیف ہو تو لیکسیس دینا چاہیے۔

(۵) مزمن حالت میں اگر حنجرہ میں زخم ہو گیا ہو۔ ننگلے میں دشواری ہوتی ہو۔ آتشکی مادہ موجود ہو تو کالی بائی بہت عمدہ دوا ہے۔

(۶) اگر زور سے بولنے سے یہ تکلیف ہو گئی ہو تو الیومن، انٹم کروڈ اور نکس دامیکا مفید ادویہ ہیں۔

(۷) دیگر ادویہ جو مفید ہیں وہ آرسنک، کلکیریا کارب۔ کاسٹم۔ ہیپر۔ سلیشیا۔ سلفر۔ نائٹرک ایسڈ۔ سینجیا۔ فاسفورس اور کالی میور وغیرہ ہیں۔

ڈیفٹیریا۔ (خناق وبائی)

DIPHTHERIA

اسباب :- یہ ایک سخت قسم کی متعدی بیماری ہے۔ اس مرض کے جراثیم بذریعہ تھوک یا تنفس دوسروں کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ بعض وقت خود معالج کو اس مرض کی چھوت لگ جاتی ہے۔ جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مریض کے کمرہ میں اس خبیث مرض کی چھوت کا اثر ہفتوں رہتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں تالو، حلق اور غذا کی نالی متورم ہو جاتی ہے جن پر فاسد جھتی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے جھتی حلق کے غدودوں پر

منودار ہوتی ہے جو دو تین روز میں ان پر اچھی طرح مسلط ہو جاتی ہے۔
 بعد ازاں صلق اور حجرہ کو بھی بڑی طرح سے ماؤف کر لیتی ہے۔
 عام طور سے بچوں کو یہ مرض ہوتا ہے۔ بالکل ابتداء میں خفیف بخار
 ہوتا ہے اور ننگلے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آواز
 بیٹھ جائے یا آواز میں بھڑاہٹ پیدا ہو جائے گردن کے غدود متورم ہو جائیں
 اور سانس لینے میں دقت ہونے لگے تو فوراً ڈفھیریا کا شبہ کرنا چاہیے۔
 ایسی حالت میں تین چار دن کے بعد تالو اور صلق میں فاسد جھلی بننا شروع
 ہوتی ہے۔ جھلی کا رنگ سفید، خاکستری یا زردی مائل ہوتا ہے۔ منہ سے
 رال ٹپکنے لگتی ہے۔ بے چینی اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ سانس لینے میں
 اور کسی چیز کے ننگلے میں سخت دشواری ہوتی ہے۔ یہ کیفیت ایک ہفتہ تک
 رہتی ہے جس کے بعد مناسب علاج سے جھلی اترنا شروع ہوتی ہے اور
 رفتہ رفتہ مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

شدید حالات میں ہڈیاں ہو جاتا ہے اور حجرہ میں اس قدر زیادہ
 جھلی پیدا ہو جاتی ہے کہ مریض کا دم گھٹنے لگتا ہے یا بعض وقت ناک او
 منہ سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے اور مریض چند گھنٹوں کے اندر جاں بحق
 ہو جاتا ہے۔

بہرہ سیر و ہدایات :- ڈفھیریا کے مریض کے قلب اور نبض کو بخوبی
 ملاحظہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ بعض حالات میں قلب اتنا کمزور ہو جاتا ہے
 کہ اپنا فعل انجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں صفائی

سب سے مقدم چیز ہے۔ انٹی سپٹک لوشن سے منہ کو صاف رکھیں اور حسب علامات ادویہ استعمال کریں۔ رقیق اشیاء، از قسم شوربہ، آتش جو اور دودھ وغیرہ کھانے کو دیں۔ اگر مریض سیال چیز کو بھی نہ نگل سکے تو اسے بھوکا نہیں مارنا چاہیے بلکہ غذائی انیما سے اس کی پرورش کرنا چاہیے۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جبکہ آواز بیٹھ جائے، نگلنے میں درد ہوتا ہو، دم گھٹتا محسوس ہوتا ہو، خاکستری رنگ کی جھلی پائی جائے، حلق متورم ہو تو ایپس مجرب دوا بن جاتی ہے۔

(۲) پہلی دوا دینے کے بعد ہمیشہ آرسنک کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے دینے سے مریض کی قلبی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خشکی، جلن اور بے چینی آرسنک کی خاص علامت ہے۔ دراصل مرض پیدا ہونے کے کئی روز کے بعد آرسنک کی علامات مریض میں رونما ہوتی ہیں۔

(۳) اگر حلق میں زخم کی کیفیت ہو گئی ہو۔ نگلنے میں دقت ہو اور مریض کمزور ہو گیا ہو، ناک سے سانس لینا مشکل ہو گیا ہو۔ زبان باہر نکالنے پر حلق میں درد بڑھ جائے تو کالی بانی بہت مفید ہے۔

(۴) اگر جھلی بہت کافی مقدار میں پیدا ہو رہی ہو، بخار ہو اور سخت خطرہ اس کے تعفن اور زہر پھیلنے کا پیدا ہو رہا ہو لیکن اس کے باوجود حلق میں درد نہ ہو۔ نیز شدید ورمی کیفیت نہ پائی جائے تو کاربولک ایسڈ حیرت انگیز کام کرتا ہے۔

(۵) اگر جھلی چمکدار ہو یا موتیوں کی سی سفید ہو اور حلق میں اکڑن

محسوس ہو، سانس میں تعفن ہو اور علامات ایک جانب سے دوسری جانب بار بار بدلتی رہیں تو لیک کیشینم بہت مفید ہے۔ اس دوا کو حفظ ماتقدم کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ اکثر حالتوں میں یہ دوا ڈفٹھیریا کے لیے عجیب و غریب ثابت ہو چکی ہے۔

(۶) جب بہترین منتخب شدہ ادویہ فیل ہو جائیں اور مریض کی حالت بگڑتی جائے تو ڈفٹھیرینم دینا چاہیے یہ دوا بھی حفظ ماتقدم کے طور پر دی جاسکتی ہے۔

(۷) ان ادویہ کے علاوہ سکسیس، مرک، نائٹک ایسڈ، کاسٹم، جلمیم، زنکم، فائیٹولا کا، پلمیم، سلفر، اورٹیشیا وغیرہ بھی زبردست دوائیں ہیں۔

گلابیٹھنا - آواز پڑ جانا

HOARSENESS

اسباب :- ورم حلق، ورم حنجرہ، سردی لگنا، زور سے چیخنا یا اونچی آواز سے گانا وغیرہ۔

علامات :- کبھی آواز بھرانے لگتی ہے اور کبھی بالکل بیٹھ جاتی ہے۔ حنجرہ میں ورم کی حالت میں دیگر تکالیف بھی رونما ہو جاتی ہیں۔ جب اونچی آواز سے گانے یا سردی سے آواز بیٹھ جاتی ہے تو عموماً

دو ایک روز میں خود بخود کھل جایا کرتی ہے۔ البتہ حلق میں درمی کیفیت کے باعث یہ شکایت ہو تو اس کا مناسب علاج کرنا چاہیے۔

پرہیز و ہدایات :- ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سرد پانی نہیں پینا چاہیے۔ ترشی اور بادی چیزوں کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو آواز کو کم استعمال کرنا چاہیے۔

علاج :- (۱) اگر زور سے گانے سے یا سردی لگنے سے یا نزلہ زکام سے یا موسم کی تبدیلی سے آواز یکا یک بند ہو جائے اور پورے طور پر آواز بیٹھ جائے تو کاشکم از حد مفید ہے۔ یہ دوا اس وقت بھی حیرت انگیز کام کرتی ہے جب آلات نطق کے فاج سے یہ کیفیت ہو گئی ہو۔

(۲) زور سے بولنے یا گانے سے اگر آواز بیٹھ جائے تو آرم ٹرائفلیم بے حد مفید ہے۔ یہ دوا اس وقت اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے جب آواز ہر وقت بدلتی رہے اور آواز پر کوئی بھروسہ نہ ہو۔

(۳) اگر آواز کا نا پھوسی سے زیادہ ادبھی نہ نکل سکے خصوصاً صبح کے وقت آواز بھاری ہو جائے اور کچھ دینے یا زور سے گانے سے آواز بیٹھ گئی ہو۔ حنجرہ میں بلغم موجود ہو اور زکام کی کیفیت ہو تو فاسفورس بہت مفید ہے۔ اگر بلغم کے اجتماع کے باعث مریض کا دم گھٹتا محسوس ہوتا ہو تو سمبوکس مفید ہے۔

(۴) درد سر اور کھانسی جس میں بھونکنے کی سی آواز نکلتے، حلق میں دکھن ہو تو بیلا ڈونا بہت مفید ہے۔

(۵) اربنٹھم مٹ، اربنٹھم نائٹ، گریفائٹس، رٹاکس، نیٹریم پیور، اور آرنیکا وغیرہ بھی نہایت اہم ادویہ ہیں سے ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔
نوٹ:- گانے یا لکچر دینے سے قبل اگر کوکا مدرٹنکچر کے پانچ قطرے پی لیے جائیں تو آواز درست رہتی ہے۔

کنٹھ مالا

SCROFULA

اسباب:- یہ عموماً موروثی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فساد خون، کسی سمیت کا گردن کے غدودوں کی طرف رجوع ہو جانا، آتشک اور سل کے باعث بھی یہ طبیعت مرض ہو جاتا ہے۔ خراب غذا اور گندگی سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بچوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے لیکن کبھی جوانوں کو بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے۔

علامات:- جسم کے تمام لمفاوی غدود متورم ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے گردن اور سینہ کے غدود نمایاں طور پر درم کر آتے ہیں بعض حالات میں گٹھیاں کئی برس تک پتھر کی مانند سخت بنی رہتی ہیں گٹھیوں کے باعث گردن بیڈول ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ گٹھیوں میں مواد پڑنے لگتا ہے پھر وہ پھوٹتی ہیں اور ان سے مواد جاری ہو جاتا ہے اور تمام زخم ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مریض کو دق و سل کا مرض آدباتا ہے۔

مریض دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے، بخار رہنے لگتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد وہ راہی ملکِ عدم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہومیو پیتھک علاج قاعدہ سے کیا جائے تو مریض کو شفا کے کئی ہو جاتی ہے جس کی بے شمار مثالیں ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو نہایت صاف ستھرا رکھیں، تبدیل آب و ہوا کے لیے اسے سمندر کے کنارے رکھیں۔ غذا نہایت لطیف اور پاکیزہ دیں، تمام منشی اشیاء، شراب، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ بالکل بند کر دیں۔ دونوں وقت ہوا خوری کرائیں۔

علاج :- آئیو ڈیم، کلکیریا کارب اور آرسنک آئیڈ میں سے کوئی بھی ایک دوا حسب علامت دیں اگر ان ادویہ سے کام نہ چلے تو برٹیا کارب سسٹس - ڈرومرا اور فیرم آئیڈ دینا چاہیے۔

باب ششم

امراض سینہ و قلب

کھانسی

COUGH

(نیز دیکھو کالی کھانسی امراض اطفال میں)

اسباب :- کثرت متبا کو نوشی - سردی لگنا - بھیاگ جانا - نزلہ و زکام کا ہونا - کسی غیر جنسی شے یا باریک ذرات کا حلق میں پہنچ کر خراش پیدا کر دینا - مرض چھپک خسرہ - امراض قلب - دق - سل - امراض جگر - امراض مفاصل - معدہ کی خرابی - خراب غذا - کثافت و گندگی - ورم حنجرہ - پھیپھڑوں کی نالیوں میں ورم - نمونیا اور پسلی وغیرہ - عورتوں میں بعض وقت خون حیض کے آتے آتے بند ہو جانے سے بھی کھانسی ہو جاتی ہے -

علامات :- کھانسی کی کئی قسمیں ہیں - مثلاً بلغمی کھانسی - خشک کھانسی - سردی کی کھانسی - کالی کھانسی اور بدبودار کھانسی وغیرہ - ابتدائی حالت میں حنجرہ میں سرسراہٹ سی ہوتی ہے - جو رفتہ رفتہ

بڑھتی رہتی ہے۔ بار بار کھانسی اٹھتی ہے، سونا حرام ہو جاتا ہے۔ بعض وقت کھانسنے سے سینہ میں غضب کا درد ہونے لگتا ہے اور مریض سینہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر مشکل تمام کھانتا ہے۔ کبھی تمام جسم میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ جب نزلہ زکام سے کھانسی آتی ہے تو اکثر ناک اور آنکھوں سے پانی بھی آتا ہے اور حقیقت بخار بھی ہو جاتا ہے۔ سینہ میں جکڑن کا احساس ہوتا ہے، لمبی سانس لینے پر کھانسی میں اضافہ ہوتا ہے، شروع میں کھانسی خشک ہوتی ہے مگر بعد میں بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ بعض حالات میں بلغم کے ساتھ خون آنے لگتا ہے جو تشویش ناک ہو جاتا ہے۔ حجرہ میں خراش کے باعث تھوک کے ساتھ خون آجایا کرتا ہے جو معمولی سی بات ہے لیکن اگر خون پیپڑے سے آتا ہے تو اکثر حالات میں خطرناک ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- بظاہر کھانسی ایک معمولی مرض ہے جو آئے دن بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے علاج میں تساہلی نہ کرنا چاہیے اور اسے ایسا معمولی مرض نہ سمجھنا چاہیے کہ اسے کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ ٹونیا، دمہ، دق و غیرہ خطرناک امراض اسی کھانسی سے پیدا ہو سکتے ہیں اور جب کھانسی مزمن ہو جاتی ہے تو بڑی مشکل سے جاتی ہے۔

اگر سردی کے باعث کھانسی ہو گئی ہو تو مریض کو گرم رکھیں۔ سرد ہوا دھوئیں اور گرد و غبار سے مریض کو بچائیں۔ تیل کی چیز سے پرہیز کریں۔

چٹنی اور سالہ دار اور اسی قسم کی دیگر تیز اشیاء نہ کھائیں، آئس کریم اور برف کا استعمال جائز نہ رکھیں، بلغم کو آسانی سے خارج کرنے کے لیے گرم پانی کا بھپارہ لیں۔ سینہ پر نیل گرم تیل کی مالش کریں۔ اور امراضِ دق و سل یا دمہ میں مناسب پرہیز اور احتیاط کریں جیسے دیکھو اپنے موقع پر۔

علاج :- (۱) اگر کھانسی خشک ہو یعنی بلغم نہ نکلتا ہو۔ سینہ پر بوجھ یا درد معلوم ہوتا ہو۔ کھانسی رات کو زیادہ تکلیف دیتی ہو اور بات چیت کرنے سے کھانسی میں اور بھی زیادتی ہو جاتی ہو، قبض کی شکایت ہو تو برائی اونیادینا چاہیے۔ موسم سرد یا میں کھانسی کے لیے عموماً برائی اونیادینا ہی دوا ہوتی ہے۔

(۲) اگر بلغم کی گھر گھراہٹ سنائی دیتی ہو لیکن بلغم نکلتا نہ ہو یا بدقت تمام تھوڑا سا خارج ہوتا ہو تو انٹم ٹارٹ مفید ہے۔ یہ علامت بچوں میں اکثر ذاتِ الجنب یعنی پسلی چلنے میں ملتی ہے۔

(۳) سینہ میں بلغم بھرا ہوا معلوم ہو مگر کھانسنے سے نہ نکلے۔ بچوں میں کھانسی کے وقت دم گھٹے اور بلغم کی قے ہو جائے۔ دم بدم متلی معلوم ہو اور کھانستے وقت چہرہ نیلگوں ہو جائے تو اپیکاک دوا ہے۔

(۴) نزلاوی کھانسی، جس میں بلغم بہت آسانی سے نکلتا ہو۔ رطوبت کافی خارج ہوتی ہو تو ڈلکارا دینا بہت مفید ہے۔ عموماً ڈلکارا کی کھانسی سرد تر موسم میں پائی جاتی ہے۔

(۵) تشنجی خشک کھانسی، تیز بخار، لیٹنے سے کھانسی بڑھ جائے۔

رات کو تکلیف زیادہ ہو چہرہ سرخ ہو اور سر میں تپکن اور درد ہو، گلے میں سرسراہٹ ہوتی رہے تو بیلا ڈونا دینا بہت مفید ہے۔

- (۶) اگر بلغم سرد از نکلتا ہو، جس کا رنگ زرد، نیلا یا خون آمیز ہو اور بلغم ڈورے کی مانند خارج ہو تو کالی بائیکرام نہایت عمدہ دوا ہے۔
- (۷) مزمن خشک کھانسی، حجرہ میں پھیلنے کا احساس ہو، آواز بھاری ہو جائے، پھیپھڑے میں بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ سُنانی دے، بلغم کا ذائقہ نمکین یا میٹھا ہو۔ سینہ میں دکھن ہو تو سلفر دینا چاہیے۔ اگر خون بلا بلغم پھیپھڑوں سے آئے تو سلفر اور بھی بالمثل دوا بن جاتی ہے۔
- (۸) خنازیری مزاج کے مریضوں کے لیے جن کے غدود بڑھے ہوئے اور متورم ہوں، رات کو سینہ اور قلب پر پسینہ آتا ہو۔ کمزوری لاحق ہو چکی ہو اور بلغم گاڑھا زردی مائل خارج ہوتا ہو تو کلکیر یا کارب دینا چاہیے۔
- (۹) باپو کیمک میں فیرم فاس، کالی میوہ اور نیٹرم میوہ اکثر حالات میں معمولی کھانسی میں مفید ہے۔

- (۱۰) دیگر اہم ادویہ جو مفید ہیں وہ آرٹک۔ سینجیا۔ مرک۔ اگنیشیا۔ سلیشیا۔ ہیپر۔ ڈر و سرا۔ رشاکس۔ کیو پریم۔ کاربودج۔ اکونائٹ۔ الیومن۔ امونیا کارب۔ کالی کارب نکس و امیکا اور پائٹا ہیں۔ اگر اوپر کی ادویہ میں تمام علامات نہ پائی جائیں تو سمبوکس سیپیا۔ شافم۔ کریازوٹ۔ کونیم۔ سنگوئیریا۔ آئیوڈیم۔ لاروسیرس۔ ہیومس۔ چائنا۔ کاسٹکم۔ کیمو ملا اور برٹیا کارب کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

اشارات

- (ا) جتنا زیادہ کھانسنے اتنی ہی سرسراہٹ زیادہ ہو۔ اگنیشیا۔
 (ب) کھانسی میں خون کا مزہ مگر خون نہ ہو۔ رٹاکس۔
 (ج) کھانسی صرف دن کو۔ رات کو ندارد۔ ریوٹکس۔
 (د) کھانسی کے دورے ٹھنڈے پانی کے چند گھونٹ سے رفع۔
 کوکس کیکٹائی۔

- (س) کھانسنے کے بعد کھانسی۔ نکس و امیکا۔
 (س) صرف کروٹ لینے سے کھانسی۔ کریازوٹ۔
 (ص) ہر دفعہ زکام کے بعد کھانسی۔ سنگونیریا۔
 (ط) نہایت کمزور کر دینے والی کھانسی۔ فاسفورس۔

سل (پھیپھڑے کی دق)

TUBERCULOSIS

اسباب :- یہ مرض عموماً موروثی ہوتا ہے علاوہ ازیں نزلہ ،
 زکام ، کھانسی ، نونیہ ، پلیوریسی ، خسرہ ، چیچک ، ٹائیفائیڈ بخار ،
 آتشک ، گٹھیا بائی ، عام کمزوری ، امراض جگر ، ہاضمہ کی خرابی ،
 نامناسب غذا ، تفکرات ، غم و غصہ ، حسد ، محنت شاقہ ، کثرت

یا بلغم کے ساتھ کھانسی آتی ہے، کبھی بلغم خون آمیز نکلتا ہے۔ بخار عموماً ہر روز بعد دوپہر تیز ہوتا ہے۔ طبیعت پڑمردہ اور ست رہتی ہے۔ کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ سینہ زیادہ نکلتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔

اس مرض میں دراصل پھیپھڑوں میں غار پڑ جاتے ہیں اور وہ سٹرنے لگتے ہیں، ان میں مواد پڑ جاتا ہے۔ بعض وقت پھیپھڑوں سے خون آنے لگتا ہے۔ شدید حالات میں مریض چند ہفتوں کے اندر راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ ابتدائی درجہ میں تو علاج سے اکثر فائدہ ہو جایا کرتا ہے مگر بعد کو قریب قریب لا علاج ہو جاتا ہے۔ البتہ ہومیو پتھک بالمثل صحیح ادویہ اور مناسب پرہیز سے مریض صحت یاب ہو سکتا ہے۔

تشخیص اور تفریق: اس کی تشخیص کرنے میں بعض اوقات خود معالج تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ خون پھیپھڑوں کے علاوہ معدہ، جگر، تلی، دماغ اور حجرہ سے بھی آجایا کرتا ہے۔ جو خون پھیپھڑوں سے آتا ہے وہ کھانسی کے ساتھ خارج ہوتا ہے اور بعد کھانسی کے خون آمیز بلغم بھی نکلتا رہتا ہے۔ نیز سینہ میں درد اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے خون کا رنگ نہایت سرخ ہوتا ہے جو بعض وقت پھٹکی پھٹکی سا درد سے نکلتا ہے۔ چت لیٹنے سے کھانسی بڑھ جاتی ہے۔ جو خون معدہ سے آتا ہے وہ بغیر کھانسی کے قے کے ساتھ نکلتا ہے اور معدہ میں بے چینی کا احساس ہوتا ہے۔ جگر یا تلی سے خون آنے کی حالت میں جگر یا تلی کے مقام پر جلن اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ دماغ سے جو خون

آتا ہے وہ کھنکھار کے ساتھ آتا ہے۔ خون نکل جانے کے بعد سر ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ حجرہ کا خون نہایت شوخ رنگ کا ہوتا ہے اور بلا کھانسی کے آتا ہے۔

نوٹ: بعض وقت خون پھیپھڑوں سے کھنکھار کے ساتھ نکلتا ہے جو چنداں سرخ نہیں ہوتا اور سینہ میں درد وغیرہ بھی نہیں پایا جاتا یہ حالت زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔

پرہیز و ہدایات: مریض کو تبدیل آب و ہوا کے لیے چار پانچ ہزار فٹ بلند پہاڑوں پر لے جانا چاہیے۔ کھلی اور صاف ہوا مریض کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ زیادہ سردی اور مرطوبیت سے مریض کو بچانا چاہیے اور اُسے ہر وقت تفریح میں لگائے رکھنا چاہیے۔ رنج و غم اور تفکرات کو پاس نہ آنے دینا چاہیے۔ غذا مقوی اور مفرح دیں۔ انڈا، دودھ، پلاؤ، بالائی، کھن، قورمہ، یخنی اور ڈبل روٹی وغیرہ ایسے مریض کے لیے عمدہ غذاؤں میں سے ہیں۔ پھلوں میں سیب، انار، سنگترہ اور انگور وغیرہ دینا مناسب ہے۔

انتباہ: چونکہ یہ مرض عموماً بذریعہ تھوک دوسروں میں پھیلتا ہے اس لیے مریض کو زمین پر یا دیوار پر ہرگز نہ تھوکنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی اگالہ ران میں چونا راکھ ڈال دی جائے اور اس میں تھوکا جائے یا اُس میں لکڑی کا برادہ ڈال کر اُس میں تھوکا جائے بعد ازاں مٹی کا تیل ڈال کر اُسے جلا دیا جائے۔ نصفائی کا خاص طور سے خیال رکھا جائے۔

ایسے مریض یا مریضہ کے عزیز و اقارب میں سے کسی کو بھی بوس و کنار کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔

علاج :- اس مرض کی اہم دوائیں ٹوبرکولینم، فاسفورس، کلکیر یا کارب، آرسنک، آیوڈائنڈ، چائنا، اکلیفانڈ کا، برائی اونیہ اور کلکیر یا فاس ہیں۔

(۱) ابتدائی حالت میں ٹوبرکولینم بہت مفید ہے۔ مریض کو سہ پہر کو یا رات کو بخار ہوتا ہے۔ (دریافت کرنے سے اس کے خاندان میں وق کی ہسٹری ملتی ہے اور عموماً نزلہ یا مونہ کے بعد مریض میں پھیپھڑے کی تکلیفات شروع ہوتی ہیں) پھیپھڑوں سے خون آتا ہے اور لاغری دن بدن بڑھتی جاتی ہے اس دوا کو نمبر ۲۰۰ سے کم نہ استعمال کرنا چاہیے۔ نیز جلد دھیرا نامناسب نہیں ہفتہ میں ایک خوراک کافی ہے۔

(۲) جب وق و سل ہونے کا اندیشہ ہو، لاغری ہوتی جاتی ہو، مریض کا دم پھولتا ہو اور مریض کو خنازیری مادہ بھی ہو تو کلکیر یا کارب دوا آکسیر کا کام کرتی ہے۔

(۳) جب پھیپھڑوں میں زخم بنا شروع ہو گئے ہوں، پھیپھڑوں سے خون آتا ہو، کمزوری بہت ہو، کھانسی کے ساتھ لیسڈارٹغم نکلے جو خون ملا یا سبزی مائل زرد یا پیپ ملا ہوا ہو، رات میں پسینہ زیادہ مقدار میں نکلتا ہو اور سہ پہر سے بخا ہو جاتا ہو تو آرسنک آیوڈائنڈ x ۳ بہت مفید ہے۔ پھیپھڑے کی کل بیماریوں میں چاہے وہ نئی ہوں یا

پرانی یہ دوا فائدہ ضرور کرتی ہے۔

(۴) اگر مریض گورا اور دبلا پتلا ہو، مریض صرف دماہنی کروٹ لیٹنے سے بہتر محسوس کرتا ہو۔ مرض ترقی کر کے خطرناک صورت اختیار کر چکا ہو، کمزوری حد درجہ پہنچ چکی ہو، پھیپھڑوں سے خون آتا ہو تو فاسفورس کی ادبھی طاقتیں عجیب و غریب کام کرتی ہیں۔

(۵) ابتدائی مرحلہ میں جبکہ پھیپھڑوں سے بار بار خون آتا ہو، بخار نہ ہو، صبح کے وقت پھیپھڑوں سے چمکدار سرخ خون آئے جو مقدار میں زائد نہ ہو اور دوپہر کے بعد سے سیاہی مائل منجمد خون آنے لگے۔ کھانسی خشک ہو تو اکیلفا انڈکا مدرٹنکچر یا ۳ دینا نہایت مجرب ہے۔

(۶) اگر بدبودار دست آتے ہوں جو عموماً کھانا کھانے کے فوراً بعد یا رات کے وقت ہوتے ہوں، پھیپھڑوں میں دم اور پک جانے کی وجہ سے خون آتا ہو، رات کو پسینہ آتا ہو اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہو تو چائنا بہت مفید ہے۔

(۷) شروع یا آخری درجہ میں، بلغم میں پیپ کی گولیاں، سینہ میں سوئیاں چھنے کے سے درد کسی کسی وقت متلی اور قے ہو جائے خصوصاً دماہنے پھیپھڑے کا بچلا حصہ ماؤف ہو تو کالی کالی کارب دینا چاہیے۔ اگر نمونیہ کا کیس بگڑنے سے سل کا اندیشہ ہو جائے تو یہ دوا نعمت غیر ترقیہ ثابت ہوتی ہے۔

(۸) با یو کیمیک میں کلکیر یا فاس یا سلیشیا کا دینا کافی ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ برائی اونیا۔ چائیم آرس۔
 آرسنک۔ آئیوڈیم۔ ریوٹکس۔ پلساٹیل۔ بسی لینیم اور لائیکو پوڈیم وغیرہ
 اس مرض کی خاص دوائیں ہیں۔

دومہ

ASTHMA

اسباب :- عموماً یہ مرض موروثی ہوتا ہے جو باپ سے بیٹے کو
 ودیعت ہوتا ہے۔ نزلہ زکام، کھانسی، سرد ہوا کا لگنا، امراض بفصل،
 خرابی معدہ، بد ہضمی، غذا کی بے اعتدالی، پھیپھڑے کے بعض امراض،
 امراض حلق و حنجرہ اور اچانک صدمہ وغیرہ بھی اس مرض کے اہم اسباب ہیں۔
 علامات :- مریض کو کھانسی اور دم کشی کی شکایت رہتی ہے۔
 اس بیماری کا دورہ اکثر رات کو ہوتا ہے۔ مریض کو سانس لینے میں
 تکلیف ہوتی ہے۔ دم گھٹنے لگتا ہے۔ ہوا کی نالیوں میں تشنج ہوتا ہے۔
 مریض کی حالت ناگفتہ بہ ہو جاتی ہے بستر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یا باہر
 ہوا میں نکل بھاگتا ہے۔ کھانٹے کھانٹے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مریض
 سے بولا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی قدر بلغم خارج ہو جاتا ہے
 اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ عموماً اس کا دورہ دس پانچ منٹ رہتا
 ہے لیکن بعض وقت ایک منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک اس کا دورہ

رہتا ہے۔ یہ مرض بڑھاپے میں نسبت جوانی کے زیادہ ہوتا ہے۔
 دوسرے دو قسم کا ہوتا ہے خشک اور تر۔ اگر کھانسی کے ساتھ بلغم
 نہ نکلے اور ہوا کی نالی میں تشنج نہ ہو تو اسے خشک دسمہ کہتے ہیں۔ اور اگر
 تشنج کے ساتھ ہوا کی نالیوں میں بلغم پھنس جاتا ہو تو اسے تر دسمہ کہتے ہیں۔
 اگر دسمہ والے مریض کو آلہ سے دیکھیں تو تنفس کی صحیح آواز کم سنائی دیتی ہے
 بلکہ سیٹی کی سی آواز کانوں میں آتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- دسمہ کے مریض کو سونے سے چار پانچ گھنٹے
 قبل کھانا کھالینا چاہیے اور سردی سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ تیل
 کھٹائی۔ مرچ۔ نفاق اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چاول کا
 استعمال بھی بند کر دیں۔ غذا نہایت لطیف اور زود ہضم دیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں تا وقتیکہ کسی خاص دوا کے
 صاف علامات نہ پائے جائیں۔ اپیکاک نہایت عمدہ دوا ہے۔ مریض کو
 دم کشی کے دورے اُٹھتے ہوں، سینہ پر بلغم کی گھڑ گھڑاہٹ پائی جائے مگر
 اخراج نہ ہوتا ہو۔ کھانسی سے دم گھٹتا معلوم ہو۔ اور بعض وقت قے ہو جائے
 تو اپیکاک ہی دوا ہے۔ اگر اس دوا کی تمام علامات پائی جائیں مگر
 پورے طور پر اپیکاک شفا دینے سے قاصر رہے تو سلفر کی ایک خوراک
 دے دینا چاہیے۔

(۲) زینہ چڑھتے وقت سانس پھولے۔ حد سے زیادہ دم گھٹتا ہوا
 معلوم ہو۔ بے چینی اور تکلیف بہت زیادہ ہو، سانس لینے کے لیے

مریض اٹھ کر بیٹھ جائے تنفس کی آواز دوسروں کو سنائی دے تو آرنک بہت مفید ہے۔ دورہ کے وقت دینے سے فوراً سکون ہوتا ہے۔ یہ دوا اس وقت بھی مفید ہے جبکہ مرض پُرانا ہو چکا ہو اور بوڑھے لوگوں میں سانس کی ہر وقت شکایت رہا کرتی ہو۔

(۳) اگر دمہ کے دورے نہایت شدید ہوتے ہوں، دورے یکایک ہوتے ہوں اور کچھ دیر رہ کر یکایک رک جاتے ہوں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ملتا ہو، تنفس میں دقت ہو تو کیو پرم عمدہ دوا ہے۔

(۴) اگر معدہ کی خرابی سے سانس پھولتی ہو۔ ڈکار سے آرام ہوتا ہو۔ صبح کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد تکلیف بڑھنے لگتی ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔ شرابیوں کے لیے یہ دوا اور بھی اکسیر ہے۔

(۵) حلق میں گولے کا احساس ہو۔ بوقت دورہ جی متلاتا ہو، دمہ کے دورے مسلسل اور لمبے ہوتے ہوں تو لوبیلیا انفلاتا دینا چاہیے۔ (۶) دمہ میں دورہ کی شدت کو رفع کرنے کے لیے بلاٹا اوری مدیٹر اکسیر کا کام کرتا ہے۔ فی خوراک دس قطرہ ایک ایک گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔ دورہ ختم ہو جانے کے بعد دن میں تین بار دیں۔ کثرت بلغم کی حالت میں اپیکا ک نمبر ۲۰۰ کی بھی ایک خوراک ہر ہفتہ دیدیا کریں چند ہی ہفتوں میں عجیب و غریب فائدہ نظر آنے لگتا ہے۔

(۷) اگر دورہ صبح کو ۳ یا ۴ بجے ہوتا ہو، سانس لینے کے لیے مریض کو اٹھ کر بیٹھ جانا پڑتا ہو اور زرد رنگ کا لساہرہ بلغم تانگے کی

مانند خارج ہوتا ہو تو کالی بانی بہت مفید ہے ۔

(۸) بایو کیمک میں کالی فاس دمہ کی عمدہ دوا ہے ۔

(۹) دیگر ادویہ جو نہایت ضروری ہیں وہ برائی اونیا۔ بیلا ڈونا ،

درٹرم البم ، زنکم ، لائیکو ، چائنا ، گرینڈیلیا ، سٹرامونیم ، سپنجیا ،
انٹم ٹارٹ اور امونیا کارب ہیں ۔

درد پیلو

PLEURISY

(دیکھو ذات الجنب حصہ دوم ۔ باب سوم میں)

منونیا

PNEUMONIA

اسباب :- سردی لگنا ، سینہ میں چوٹ اور زخم ، امراض مفصل ،
آتشک ، پلوریسی اور ضعف و لاغری وغیرہ مگر جدید تحقیق کے بموجب
یہ مرض بھی متعدی مانا گیا ہے ۔ کیونکہ اس مرض کا باعث ایک باریک
قسم کا کیڑا نیوکا کس ہے ۔

علامات :- یہ ایک خطرناک مرض ہے ، مریض کو یکا یک

جاڑا لگ کر بخار آتا ہے، جلد بہت گرم ہو جاتی ہے، سانس جلد جلد اور
 شکل سے لی جاتی ہے۔ سانس لینے میں پشت اور سینہ میں سخت درد ہوتا
 ہے۔ خشک کھانسی آتی ہے، کھانسنے سے درد ہوتا ہے، تھوڑی مقدار
 میں لسدار، سرخی مائل بھورے رنگ کا بلغم خارج ہوتا ہے۔ کبھی ایک
 پھیپھڑے پر درم آتا ہے جس کو سفل نو نیا کہتے ہیں اور کبھی دونوں پھیپھڑے
 ماؤف ہو جاتے ہیں جسے ڈبل نو نیا کہتے ہیں۔ شدید حالات میں مرض کو
 غفلت اور الجھن ہوتی ہے اور ہذیانی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب
 اس مرض کے ساتھ ہذیان یرقان اور جگر کی دیگر تکالیف شروع ہو جاتی ہیں
 تو مرض پیچیدہ ہو جایا کرتا ہے اسی طرح دستوں کا آنا اور تشنج کا ہونا اس
 مرض میں ایک خطرناک علامت ہے اس مرض کی مدت دو تین ہفتہ تک
 ہے لیکن اکثر ایک ہی ہفتہ کے بعد بخار جاتا رہتا ہے اور رفتہ رفتہ مریض
 اچھا ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو فوراً گرم کپڑے پہنا دیں۔ سردی سے
 بالکل محفوظ رکھیں کمرہ کو خوب گرم رکھیں لیکن خیال رہے کہ کمرے کی
 کھڑکیاں ہوا کی آمد و رفت کے لیے کھلی رہیں۔ مریض کے سینہ پر سرسوں کا
 تیل نیم گرم ملیں یا شکر برائی ادنیا کو تیل میں شامل کر کے سینہ پر ملیں
 اور رولی سے سینہ کو اور اس کے مقابل پشت کو اچھی طرح میسجیں۔
 ٹھنڈی اشیاء کھانے کو ہرگز نہ دیں۔ دودھ، شوربا، یا مونگ کی
 دال کا پانی وغیرہ دیں۔ برت کا پانی ہرگز نہیں دینا چاہیے۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جبکہ بخار تیز ہو اور مریض میں الجھن اور پریشانی کے آثار نمایاں ہوں تو اکونائٹ $\times$ ۳ بہترین دوا ہے اس کی تین چار خوراکیں پہنچ جانے پر مریض خطرہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اکونائٹ دینے کے بعد اگر اسی روز رات کے وقت مریض کو ایک خوراک سلفر کی کھلا دی جائے تو بہت جلد تکلیف دور ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر اوپر کی دونوں ادویہ کسی وجہ سے فیل ہو جائیں اور سینہ میں شدید قسم کی سوسٹیوں کی سی چھن ہوتی ہو۔ مریض جلد جلد سانس لیتا ہو اور قبض ہو تو برائی ادویہ دینا چاہیے۔ برائی ادویہ منویا کی خاص دوا ہے۔ تین چار خوراکیں میں اگر خاص تفاوت نہ معلوم ہو اور مریض کے پھیپھڑے ڈل ہوتے ہوئے معلوم ہوں تو برائی ادویہ کے بعد سلفر کا دینا عقلمندی ہے۔

(۳) عموماً منویا کی قریب قریب تمام علامات میں اگر دن کو برائی ادویہ کی چند خوراکیں دی جائیں اور رات کے وقت فاسفورس دینا شروع کیا جائے تو کسی قسم کی پیچیدگی نہیں پیدا ہوتی اور یہی دونوں دوائیں مریض کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوتی ہیں۔ بعض کیسوں میں ان دونوں دواؤں کو حسب دستور بالادینے کے باوجود کچھ نہ کچھ کسر رہ جاتی ہے تو سلفر کی صرف ایک خوراک دینے سے شفا کے کلی ہو جاتی ہے۔ گویا یہ تینوں دوائیں منویا کے علاج میں عجیب و غریب ہیں۔

(۴) اگر بخار تیز ہو، سر سام ہو گیا ہو، چہرہ سُرخ اور تھمایا ہوا ہو،

بیاس زائد ہو تو بیلا ڈونا نمبر ۶ دینا مفید ہے۔

(۵) اگر میعاد بخار میں منو نیا ہو جائے یا بھیگ جانے سے تکلیفات رونما ہوئی ہوں مریض کو حرکت کرنے سے آرام ملتا ہو تو رساکس دینا چاہیے۔

(۶) آخری درجہ میں جب مریض کی قوت روحانی کمزور ہو گئی ہو، تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ ہو، ہاتھ پیر سرد ہو گئے ہوں چہرہ زرد پر چکا ہو، نبض نہایت کمزور چل رہی ہو، مریض کو پنکھا کرنے کی خواہش ہو تو کار بوج بہت مفید ہے۔

(۷) لسدار بلغم، سانس لینے میں سینہ میں سوئیاں سی چٹھیں، خشک کھانسی اور دم گھٹنے سے مریض رات کو سونہ سکے۔ دھنا پھیپھڑہ خاص طور پر ماؤٹ ہو، بلغم کھڑکھڑاتا معلوم ہو تو کالی کارب دوا ہے۔ کالی کارب کے مریض کو عموماً رات کو پچھلے پتر تکلیف زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔ بچوں کے منو نیا میں اس کا اثر اور بھی نمایاں ہوتا ہے۔

(۸) بایو کیمک میں فیرم فاس ابتدائی درجہ میں بہت مفید ہے اگر اس کے ساتھ کالی میور کو بھی یکے بعد دیگرے دیں تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ نیٹرم میور، لائیکو پوڈیم، انٹم ٹارٹ، لیکسیس، ہیسپر، آرسنک، کالی ٹارٹ، ہیوسمس، کالی آئیوڈائیڈ، ویرٹرم، چائنا اور سنگوئیر یا وغیرہ خاص دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

درد دل

ANGINA PECTORIS

اسباب :- یہ مرض عموماً عورتوں کو ہوتا ہے۔ اوائل عمری میں یہ بیماری کم ہوتی ہے۔ پچاس برس کے بعد ہی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ عام کمزوری۔ امراض مفاصل، جوش، معدہ کی خرابی، کثرت سے نوشی و تمباکو کشی، امراض قلب اور دوران خون میں اتیری سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ گرم ہونے کے بعد یکایک سرد ہونا، انتہائی رنج و غصہ، اچانک علامات اور حد سے زیادہ جسمانی و دماغی محنت وغیرہ بھی اس کے اہم اسباب ہیں۔ علاوہ ازیں جن اشخاص کے قلب میں چربی پیدا ہو گئی ہو وہ اس کا اکثر شکار ہو جاتے ہیں۔

علامات :- اس بیماری میں دل کے اندر سختی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یکایک دل میں شدت کا درد ہوتا ہے جس کی ٹیس عموماً بائیں جانب کندھے تک جاتی ہے، مریض کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ پسینہ سے تمام جسم شرابور ہو جاتا ہے، درد کی شدت ناقابل برداشت ہوتی ہے، مرض کا دورہ صرف چند سکنڈ اور بعض حالات میں چند منٹ تک رہتا ہے، دیر تک رہنے میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا اندیشہ ہو جاتا ہے، دورہ کے بعد زیادہ مقدار میں پیشاب ہوتا ہے۔ جس کا رنگ پانی کا سا ہوتا ہے۔

پر ہینر و ہدایات :- مریض کو فوراً آرام سے بستر پر لٹا دینا چاہیے۔ شدت مرض کی حالت میں اگر انتخاب دوا میں وقت لگ جائے تو سر دست کوئی مناسب نخلہ سونگھا دینا چاہیے یا درد کی جگہ پر گلاب کا عطر مل دیں۔ وقفہ کے دوران میں اصل سبب مرض کو معلوم کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے نفاخ اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ محنت کے بعد یہ کیفیت ہو جاتی ہو تو مریض کو چاہیے کہ دماغی یا جسمانی محنت میں اعتدال سے کام لے، اگر جوش غم اور غصہ وغیرہ سے درودل کا دورہ ہو جاتا ہو تو مریض کو ان سے بچنا چاہیے۔ منشی اشیاء کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اور مقوی، مفرح اور زود ہضم غذا کا استعمال مناسب ہے۔

علاج :- (۱) دورہ کے وقت اگر قلب کی ضربات مشکل سے سنا دیں تو کیفیر نمبر ۱ کے چند قطرے ناک کی نوک پر مل دیں تاکہ اُس کی بو کو مریض سونگھے۔ اسی دوا کے پانچ قطرے ملک شوگر پر ڈال کر مریض کو پانچ پانچ منٹ کے بعد دیں۔

(۲) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا آرسنک ہے بشرطیکہ دل پر کوئی زخم یا چوٹ نہ ہو۔ آرسنک کو دورہ کی حالت میں بھی دے سکتے ہیں اور وقفہ کے دوران میں بھی۔ لیکن اس کو ادنیٰ ہی طاقت میں دینے سے عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۳) اس مرض کی دوسری اہم دوا سپائی جیلیا ہے، دل کی خرابی میں یہ دوا خوب کام کرتی ہے۔ دھڑکن، حرکت سے تکلیف اور

درد کا بائیں جانب سے دیگر اعضاء میں پھیلنا، قلب میں غراہٹ کی
سی آواز کا ہونا اس دوا کی خاص علامات ہیں۔

(۴) دماغی پریشانی، غم و غصہ یا کھانا کھانے کے بعد اگر دورہ
پڑ جاتا ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۵) اگر مریض کو احساس ہوتا ہو جیسے کہ دل کو لوہے کی ٹپی سے
کس کر باندھ دیا گیا ہے، سینہ میں بے چینی ہوتی ہو سانس لینے
میں دقت ہو تو کیکشس بہت مفید ہے۔

(۶) اگر زور سے درد اور دھڑکن ہو، دل میں بے چینی۔
کھنچاؤ اور تنگی محسوس ہوتی ہو اور نزع کی سی حالت ہو جائے، دور سے
بار بار پڑتے ہوں تو اکیل نائٹریٹ نمبر ۳ دینا چاہیے۔

(۷) اگر ہائی بلڈ پریشر ہو، دل میں پھڑپھڑاہٹ معلوم ہو،
سانس لینے میں تکلیف ہو اور درد تمام جسم میں ہو تو گلوٹائٹ دینا
مناسب ہے۔

(۸) باپو کیمک میں گنیشیا فاس اور کالی فاس کے بعد دیگر
دینا چاہیے۔

(۹) ان ادویہ کے علاوہ پانچ اور دوائیں بھی عجیب و غریب ہیں۔
وہ ڈیجیٹلس، پلیم، اگنیشیا۔ انیسچور اور حلیم ہیں۔

اختلاجِ قلب - دھڑکن

PALPITATION

اسباب: عصبی کمزوری، جلق، کثرتِ مباشرت، کثرتِ تمباکو کشی و مے نوشی، جوش، رنج و غصہ، خوف، تفکرات، کمیِ خون، اور امراضِ مفاصل وغیرہ۔ عورتوں میں کثرتِ حیض یا بندشِ حیض یا اختناقِ الرحم (باؤ گولہ) سے یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات نفخِ شکم یا معدہ کے پھیل جانے سے دل پر سے دباؤ پڑنے سے دل دھڑکنے لگتا ہے۔ دل کی ساخت کا چربی میں بدل جانا بھی اس کا ایک سبب ہے۔ علاوہ ازیں امراضِ جگر، بواسیر اور کثرتِ ورزش سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں دل دھڑکتا ہے بعض دفعہ اس قدر زور سے دھڑکتا ہے کہ سینہ پر دُور سے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ طبیعت بہت زیادہ گھبراتی اور بے چین ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ دل ڈوبا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شدید حالات میں دل اس قدر زور سے دھڑکتا ہے کہ مریض کی چارپائی تک پہنچنے لگتی ہے اور مریض پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ دورہ ختم ہونے کے بعد عموماً پانی کے رنگ کا پیشاب دو ایک بار یا زیادہ مقدار میں آتا ہے۔

پر ہینر و ہدایات :- اصل سبب مرض کو معلوم کر کے مناسب پریز اور احتیاط برتیں ہر قسم کی بے اعتدالیوں سے بچیں ، وقت پر کھانا ، وقت پر سونا اور اعتدال کے ساتھ محنت کرنا مناسب ہے ۔ اگر کثرت متبا کوکشی و مے نوشی کے باعث دل دھڑکتا ہو تو اس سے تو بہ کر لیں ۔ نفخ شکم اور ترش ڈکار آنے سے یہ شکایت ہو جاتی ہو تو نہایت لطیف اور زود ہضم غذا استعمال کریں ۔ بادی ، نفاخ اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں ۔ اگر عام کمزوری اور کمی خون کے باعث یہ مرض ہو تو مقویات اور مفرحات کا استعمال کریں ۔ تازہ پھل اور میوہ کثرت سے کھائیں ، اور دودھ ، مکھن ، انڈا ، سبز ترکاریاں اور یخنی وغیرہ لیں ۔ رنج و غم کو پاس نہ آنے دیں ۔ اگر بلڈ پریشر کے باعث اختلاج قلب کی شکایت ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں اور غذا کم کھائیں نیز مقوی اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں ۔

علاج :- (۱) اگر نوجوانوں کو جن میں خون کی کثرت ہو اور جن کو سوزش قلب کے ساتھ اختلاج ہو تو اکونائٹ عمدہ دوا ہے ۔ خوف سے اختلاج ہو جانے کے لیے بھی یہی دوا ہے ۔

(۲) اعصابی مزاج والے مریض جن کا قلب کمزور ہو ، اختلاج میں ایسا معلوم ہو کہ حرکت قلب بند ہو جائے گی ۔ تنفس میں تیزی ہو ، اور بولنے یا حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جائے تو ڈیجیٹلس دوا ہے ۔ اکثر و بیشتر علامات میں یہ دوا عجیب و غریب اثر دکھلاتی ہے ۔

(۳) اگر دھڑکن کے مریض بائیں کردٹ دلیٹ سکتا ہو ، دھڑکن کے

وقت ایسا محسوس ہو کہ دل کے گرد لوہے کی پٹی بندھی ہوئی ہے ،
سانس لینے میں وقت ہو تو کیکٹس دینا بہت مفید ہے ۔

(۴) اگر زیادہ کام کرنے سے تھکان ہو جانے پر اختلاج ہو جاتا ہو تو آرنیکا

مفید ہے ۔

(۵) اعصابی مزاج اشخاص نیز نازک مزاج عورتوں میں اگر سنج اور

غم سے دھڑکن کا مرض ہو گیا ہو تو اگنیثیا دینا چاہیے ۔

(۶) اگر نوجوان عورتوں کو حیض رک جانے کے باعث شکایت

ہو گئی ہو تو پلسا ٹیلا دینا مفید ہے ۔

(۷) مستورات میں خون حیض کم مقدار میں آئے یا دفعتاً بند ہو جانے

سے اور دماغی جذبات سے دھڑکن ہو ۔ اُن واقعات کی یاد پر اختلاج

شروع ہو جائے جن کو بڑے سالوں گزر چکے ہوں تو سپیا ایک عمدہ دوا

ہے ۔ اس کے مریض کو جاگنے پر عموماً دھڑکن کی شکایت ہوتی ہے ۔

(۸) باپو کیمک میں کالی فاس اختلاج کے لیے مہربات میں سے ہے ۔

(۹) اعصابی دھڑکن ، درد قلب ، محنت یا جماع وغیرہ کی زیادتی سے

اختلاج قلب کے لیے کرٹیکس بدر شکر بہت مفید ہے ۔ اس کو دل کی کمزوری

میں بطور ٹانک استعمال کیا جاتا ہے ۔ فی خوراک دس قطرہ دن میں تین بار

دینا چاہیے ۔

(۱۰) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آرنیکا ، بیلا ڈونا ، کافیا ، نکس و امیکا ،

رٹاکس ، کنولیریا ، کیمو ملا ، کاربودج ، چائنا ، فاسفورس اور جلیسمیم وغیرہ بڑی

دوائیں ہیں ۔

ماہنامہ

امراض معدہ و امعاء

ورم معدہ

GASTRITIS

اس مرض کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ حاد ورم معدہ (اکیوٹ گیسٹرائٹیٹس) اور مزمن ورم معدہ (کروانک گیسٹرائٹیٹس)۔

اسباب ورم معدہ حاد:- غذا کی خرابی، خراب اور ثقیل اشیاء کا استعمال، زیادہ کھانا، بار بار کھانا، باسی اور شری ہوئی غذا کا استعمال بہت ٹھنڈا یا بہت گرم پانی پینا۔ چربیلا اور سخت گوشت اور مچھلی کا کھانا بالائی کی برت سے شوق رکھنا۔ تیز قسم کی شراب پینا۔ زیادہ ترشی اور بادی چیزیں کھانا، امراض مفاصل، امراض دل و جگر، سرخ بخار خسرہ اور قروح معدہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ معدہ کے زخم، نمونیہ اور

آنتوں کے ورم سے بھی معدہ میں ورم ہو جایا کرتا ہے۔

اسباب ورم معدہ مزمن :- حاد ورم کے علاج میں اگر تساہلی

برتی جائے تو مزمن ورم معدہ یعنی کرائیک گیسٹرائٹیٹس کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں غذا کی خرابی۔ غذا میں بے اعتدالی، ثقیل اور

بادی چیزوں کا کثرت استعمال، مٹھائی اور مرغن اشیاء کا بے دھڑک

استعمال کرنا۔ قہوہ، گرم مسالہ، چار اور شراب نوشی کی کثرت۔ کاہلی کی

زندگی بسر کرنا۔ ورزش نہ کرنا۔ دائمی قبض کی شکایت کا ہونا۔ دانتوں کی

خرابی۔ امراض دل، جگر، گردہ، طحال اور امعاء۔ امراض مفاصل

اور آنشک کے زہر کی موجودگی۔ دق۔ کمی خون اور مرض بواسیر وغیرہ

اس کے خاص اسباب ہیں۔ برت کا پانی پینا اور کھانا کھانے کے

فوراً بعد کوئی جسمانی یا دماغی کام کرنا بھی اس قسم کی شکایات کا موجب

ہوتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں کوڑی کے پاس بھراؤ معلوم ہوتا ہے۔

پیٹ میں گرانی اور بے چینی ہوتی ہے، جی مٹلاتا ہے تھوک زیادہ

آتا ہے، بھوک قطعی نہیں لگتی، قبض ہو جاتا ہے۔ بدبودار ریاح کا

اخراج ہوتا ہے، پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ کھٹا پانی منہ کو آتا ہے

اور خفیف سی حرارت بھی ہو جاتی ہے۔ شدیدہ حالت میں بخار تیز ہو جاتا

ہے۔ زبان میلی ہو جاتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ بار بار متلی

اڈرتے ہوتی ہے۔ فم معدہ پر دبانے سے درد ہوتا ہے۔ پیشاب سُرخ

رنگ کا کم مقدار میں آتا ہے جس میں رسوب بکثرت پائے جاتے ہیں۔
 جب یہ حالت کئی ہفتہ تک رہتی ہے تو مرض مزمن ہو جاتا ہے۔
 ایسی حالت میں مریض کے پیٹ میں ہر وقت درد رہنے لگتا ہے۔
 کمزوری بڑھتی جاتی ہے مریض زرد پڑ جاتا ہے۔ نیند نہیں آتی۔ منہ
 میں پھنسیاں نکل آتی ہیں، سوڑھے متورم ہو جاتے ہیں، کلیجہ جلنے لگتا
 ہے۔ مریض سست اور منہموم رہنے لگتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- معدہ میں ورم کی حالت میں اس بات
 کی سخت ضرورت ہے کہ معدہ کو آرام دیا جائے چنانچہ مریض کو
 دو ایک روز تک کسی قسم کی غذا نہ دیں، صرف تھوڑا تھوڑا دودھ دیں۔
 شدت پیاس کی حالت میں برت چوسنے کو دیں۔ مرض کی شدت
 کم ہو جانے پر غذا لطیف اور ہلکی دیں اور مریض کو ہدایت کریں کہ وہ
 خوب چبا کر کھائے، صبح و شام ہوا خوری کرے اور مٹھائی اور روغنی
 چیزوں سے پرہیز کرے۔ شراب، افیون اور قہوہ کا استعمال ترک
 کر دے۔ آتش جو، مونگ کی دال کا پانی، سا بودانہ اور مویز منقہ
 کھلائیں اور لوہے سے بچھا ہوا پانی پینے کے لیے دیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جب سردی سرایت کر جانے
 سے ورم معدہ ہو، درد اور بے چینی ہو تو اکونائٹ کی چند خوراکیوں سے
 حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) اگر کسی وجہ سے اکونائٹ ناکام ہے اور مریض کو پیاس

زیادہ ہو، زبان خشک ہو، معدہ کے مقام پر کوچن سی ہوتی ہو تو برائی اونیا دینا چاہیے۔

(۳) اگر معدہ کے منہ پر سوزش محسوس ہوتی ہو۔ بدبودار ریاح کا اخراج ہوتا ہو، بار بار پیاس معلوم ہوتی ہو، متلی اور قے ہوتی ہو، مریض کمزور ہو گیا ہو اور اوپر کی ہر دوا دویہ فائدہ پہنچانے سے قاصر رہی ہوں تو آرسنک سے عموماً تمام تکالیف رفع ہو جایا کرتی ہیں۔

(۴) اگر معدہ میں ٹھہر ٹھہر کر درد ہوتا ہو۔ چہرہ میں تتماہٹ پائی جاتی ہو، پانی پینے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو اس لیے مریض کو پانی سے نفرت ہو جائے۔ نزلاوی کیفیت موجود ہو تو بیلا ڈونا مفید ہے۔

(۵) اگر پھل، ثقیل اور مرغن چربیلی اشیاء کے کھانے سے ورم معدہ ہو جائے اور مریض کو احساس ہو کہ غذا جوں کی توں معدہ میں رکھی ہے۔ بھوک اور پیاس ندارد تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔

(۶) اگر قبض ہو، تکلیف پرانی ہو گئی ہو، بخار قطعی نہ ہو اور شراب کی کثرت یا گرم ادویہ یا راتوں کو جاگنے سے ورم معدہ کی شکایت ہوتی ہو تو نکس دامیکا عمدہ دوا ہے۔

(۷) اگر غذا معدہ میں سڑ گئی ہو معدہ میں درد ہو۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، غذا مضمم نہ ہوتی ہو، کھٹی تے پہلے پانی کی پھر غذا کی ہو تو سلفیورک ایسڈ دینا چاہیے۔

(۸) باپو کیمک میں ابتدائی درجہ میں مگنیشیا فاس عمدہ دوا ہے

جبکہ معدہ میں درد ہوتا ہو اور ریاح کے اخراج سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوتا ہو۔ اگر مریض کو بخار بھی ہو تو فیرم فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔ (۹) دیگر ادویہ جو نہایت ضروری ہیں وہ اپیکاک، وریٹرم البم، انٹم کرڈ، چائٹا اور لائیکو، کاربودج ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

زخم معدہ

GASTRIC ULCER

اسباب :- یہ مرض عموماً جوانوں کو ہوتا ہے اور عموماً اُن عورتوں میں ہوتا ہے جن کے حیض بند ہو گئے ہوں۔ پرانا ورم معدہ، مزمن ہیمپھی، عضلات شکم پر زور پڑنا اور معدہ کی شریان میں سدہ پڑ جانا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- معدہ میں کم و بیش ہر وقت درد رہتا ہے، معدہ کو دبانے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بعض وقت ٹھہر ٹھہر کر شدت سے درد ہوتا ہے اور مریض کو قے ہو جانے پر کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ درد عموماً کھانا کھانے کے بعد ہی ہوتا ہے، اگر معدہ کی بڑی شریان پھٹ جاتی ہے تو خالص خون کی قے آنے لگتی ہے اور یہ حالت اور بھی تشویشناک ہوتی ہے۔ اس مرض میں قبض اکثر و بیشتر حالات میں پایا جاتا ہے۔ غذا قلعی، مضم نہیں ہوتی جس سے مریض لاغر اور نحیف ہوتا جاتا ہے۔

ابتدائی حالت میں اگر توجہ اور مناسب پرہیز کے ساتھ علاج کیا جائے تو شفا ہو جاتی ہے ورنہ اس کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو صرف دودھ یا مونگ کی دال کے پانی پر رکھیں یا غذا ایک دم بند کر دیں اور غذائی انیما کے ذریعہ اس کی پرورش کریں۔ شدید کیفیت میں پیاس کو رفع کرنے کے لیے برف چوسنے کو دیں یا تھوڑا تھوڑا آب سرد دیتے رہیں۔ جریان خون اور درد کو روکنے کے لیے معدہ پر برف رکھیں۔ مرض کی شدت کم ہو جانے پر سا بودانہ شوربا، یخنی اور مونگ کی کھچڑی دیں۔ مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں، مرض تخفیف ہو جانے پر بھی مریض کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دیں جس سے معدہ کے عضلات پر بوجھ پڑے۔

علاج :- (۱) زخم معدہ جس میں صفرا یا خون آمیز غذا اور نفیم کی قے ہو معدہ کے اندر جیسے ہی کہ غذا یا پانی وغیرہ گرم ہو فوراً قے ہو جائے، بہت زیادہ کمزوری اور شکم میں خالی پن کا احساس ہو تو فاسفورس دینے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔

(۲) اگر معدہ میں زخم کے باعث سخت درد ہوتا ہو جو ہر جانب پھیلتا ہوا معلوم ہوتا ہے، ذرا سا بھی دبانے سے سخت ذکی اٹھتی ہوئی ہو۔ ڈکاریں زیادہ آتی ہوں، متلی معلوم ہوتی ہو، گرم اشیاء کے پینے سے درد میں سکون ہوتا ہو تو ارنیکا ٹیٹا دینا چاہیے۔

(۳) اگر کمزوری بہت زیادہ لاحق ہو گئی ہو، کھانے یا پینے کے

فوراً بعد تے ہو جاتی ہو، شکم میں جلن کا احساس ہوتا ہو، بے چینی اور پیاس ہو تو آرسنک دینا مفید ہے۔

(۴) معدہ اور آنتوں میں ٹھنڈک کا احساس ہو، معدہ میں درد، اور بوجھ کا احساس جس کو ڈکار سے عارضی سکون ہو جائے۔ درد کے باعث تنگ کپڑے، برداشت نہ ہوں، پتلی چمکدار رطوبت کی کھٹی اور غیر منظم غذا کی تے ہو، تھوک کے ساتھ خون آئے تو کالی بانی عمدہ دوا ہے۔

(۵) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ لائیکو پوڈیم، نائٹک ایسڈ، کاسٹک، کریازوٹ، کلکیریا آرس، یورے نیم نائٹ، نکس و امیکا اور مرک کار اس مرض کی اہم دوائیں ہیں۔

درد قونج - (آنتوں کا درد)

COLIC PAIN

اسباب :- آنتوں میں سدہ پڑ جانا۔ بد مضمی، نفاخ اور ثقیل اشیاء کا استعمال، غلیظ صفرا کا آنتوں میں پہنچ کر خراش پیدا کر دینا سردی لگنا، سرد یا برت کا پانی پینا وغیرہ۔

علامات :- آنتوں میں غیر منظم طریقہ پر تشنج ہوتا ہے۔ ناف کے ارد گرد دھڑ دھڑ کر رہتا ہے، پیٹ کو دبانے سے آرام ملتا ہے۔

کبھی متلی معلوم ہوتی ہے نیز قے ہو جاتی ہے۔ درد کے مارے مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ نہایت شدید حالت میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر درد زیادہ ہو اور انتخاب دوا میں دشواری ہو تو پہلے ذرا سا سن لائٹ صابن یا معمولی صابن اور گلیسرین گرم پانی میں ملا کر انیما دیں تاکہ سدے خارج ہو جائیں۔ اگر پہلی بار اچھی طرح سدے نہ خارج ہوں تو گھنٹہ آدھ گھنٹہ پیٹ پر سینک کرنے کے بعد دوبارہ انیما دیں۔ اگر انیما کسی وجہ سے نہ دیا جاسکے تو گرم پانی کی بوتل سے یا کسی دوسری چیز سے مقام درد پر سینک کریں۔ درد رفع ہو جانے کے بعد مریض کو چند روز تک برف کا پانی نہ پینے دیں اور زود ہضم و لطیف غذا از قسم دودھ، مونگ کی کھچڑی، شوربا اور سبز ترکاری وغیرہ دیں، گوشت، کباب، انڈا، مٹھائی، پراٹھا، پوری کچوری وغیرہ نفاخ اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرائیں۔

تشخیص و تفریق :- درد قویج کی تشخیص میں اکثر معالج سے غلطی ہو جایا کرتی ہے۔ درد معدہ، آنتوں میں ورم، درد گردہ کی تشخیص نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ (۱) درد معدہ ناف سے اوپر یعنی شکم کے اوپری حصہ میں معدہ کے مقام پر ہوتا ہے۔ (ب) آنتوں میں ورم ہو جانے کی حالت میں بخار ہوا کرتا ہے۔ (ج) گردہ کا درد گردہ کے مقام سے اٹھتا ہے اور رانوں اور فوطوں تک جاتا ہے اور پیشاب تھوڑا تھوڑا خارج ہوتا ہے۔ درد قویج میں درد شکم کے نچلے حصہ میں ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر

ہوتا ہے جس کا سبب اکثر و بیشتر حالات میں بد مضمی ہوتا ہے۔
علاج :- (۱) اگر درد کی شدت کے باعث مریض گھٹنے سمیٹ کر یا دونوں ہاتھوں سے پیٹ کو پکڑ کر دوہرا ہو جائے تو کالوسنتھ بہت عمدہ دوا ہے۔ درد قویٰ میں اکثر اس دوا کی علامات پائی جاتی ہیں اگر مندرجہ صدر علامات ہونے کے باوجود کالوسنتھ کام نہ کرے تو کاسٹمک دینا چاہیے۔

(۲) شدید درد، بے چینی، گالوں میں سرخی، گرم پسینہ، سینکے سے آرام ملتا ہو، ریا ح کا قبض ہو تو کیمو ملا دوا ہے۔ دراصل بچوں کے لیے یہ دوا خاص ہے اور بچوں ہی میں اس دوا کی علامات زیادہ پائی جاتی ہیں۔

(۳) اگر ریا حی شکایت ہو، کھٹا پانی منہ سے آتا ہو، ہاضمہ کی خرابی اور قبض ہو تو نکس و امیکا مفید ہے۔ بوا سیر کی حالت میں یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔ شرابیوں کے لیے درد قویٰ کی یہ خاص دوا ہے۔

(۴) اگر تکلیف برف کا پانی یا بالائی کی برف کھانے سے پیدا ہوئی ہو۔ درد کے ساتھ قبض کا بھی احساس ہو۔ سینکے سے سکون ہوتا ہو، کھانا کھانے سے تکلیف زیادہ ہو، بے چینی زائد ہو تو آرنک مفید ہے۔

(۵) اگر نافت کے گرد مسلسل درد ہو۔ جسم کو پھیلانے سے یا پیچھے کو

جھکانے سے آرام ملتا ہو، مریض آگے کو جھک کر دوہرا ہونا چاہے لیکن ایسا کرنے سے قطعی سکون نہ ہو تو ڈاکٹر یا دینا چاہیے۔

(۶) پھل یا ترکاری کھانے کے بعد درد قویج، کھٹی دکار اور ریا ح کی حالت میں مگنیشیا کارب دوا ہے۔

(۷) اگر آنتوں کے بالکل نچلے حصہ میں شدید درد ہو، مریض کا چہرہ تھمایا ہوا اور گرم ہو درد یکا یک بہت تیزی سے شروع ہوں اور کم و بیش وقت تک قائم رہ کر یکا یک غائب ہو جاتے ہوں، مریض کو بیٹھ جانے پر کچھ سکون ملتا ہو۔ شکم میں ذکی الحسی زیادہ ہو تو بیلادونا دینے کا وقت ہے۔

(۸) باپو کیمک میں مگنیشیا فاس اس مرض کی نہایت عمدہ دوا ہے۔ ۶ x دینا چاہیے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ پلمبم، پلسا ٹیلا، لائیکوپوڈیم، کیوپرم، کاربودج، ورپٹرم، رسٹاکس اور ہیوسمس وغیرہ اس مرض کی بڑی دوائیں ہیں۔

درد معدہ

GASTRALGIA

اسباب: قبض، بد ہضمی، کثرت تبا کوکشی دچائے نوشی،

دردِ زش نہ کرنا، امراضِ مفاصل، کمیِ خون، ٹو برکلو سس، غذا کی بے اعتدالی، ریا ح کا اجتماع، بلغم یا صفرے کی زیادتی وغیرہ۔ عورتوں میں خونِ حیض کے رک جانے سے یا مرضِ ہسٹیریا کے باعث معدہ میں درد ہو جایا کرتا ہے۔ بعض ستورات کو حمل کے ایام میں اکثر اس مرض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ لیکن دراصل دردِ معدہ عموماً بذہنی کی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔

علامات :- معدہ کے منہ یعنی کوڑی پر ٹھہر ٹھہر کر درد ہوتا ہے۔ کلیجہ جلتا ہے اور کھرجن سی ہوتی ہے۔ کبھی اچھا رہ جاتا ہے جس کو ڈکار یا ریا ح کے اخراج سے کمی ہوتی ہے۔ یہ درد کبھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض کو غش آ جاتا ہے۔ ہاتھ پیر سرد ہو جاتے ہیں اور مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے نبض باریک اور کمزور چلنے لگتی ہے۔ بعض دفعہ درد کی ٹیسیں مختلف اطراف میں پھیلنا شروع ہوتی ہیں۔ چنانچہ کبھی حلق تک اس کا احساس ہوتا ہے کبھی ناف کے نیچے تک اور بعض اوقات گردوں تک درد جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- درد کے مقام پر گرم پانی کی بوتل یا گرم روئی سے سینک کریں۔ ترشی، بادی، ثقیل اور نفاخہ آشیاء سے پرہیز کریں۔ اگر چاء، تمباکو یا شراب کی کثرت سے دردِ معدہ کی شکایت ہو تو ان اشیاء کو ترک کر دیں۔ ہلکی اور لطیف غذا کھانے کو دیں۔ مونگ کی دال، مونگ کی کھجڑی، دودھ (خفیف شکر ملا ہوا) آمشیں جو اور

سابودانہ وغیرہ ایسے مریض کے لیے عمدہ غذا ہے۔

تشخیص و تفریق :- معده میں زخم کے باعث بھی درد ہوا کرتا ہے جس کی تشخیص نہایت ضروری ہے۔ زخم نہ ہونے کی حالت میں تمام ضروری علامات کو اوپر لکھا جا چکا ہے۔ معده میں زخم کی حالت میں زبان کا رنگ صاف اور سرخ ہوتا ہے اور قے میں عموماً خون ملا ہوا ہوتا ہے علاوہ انہی جوانی کے بعد یعنی تقریباً چالیس سال کی عمر کے بعد ہی یہ شکایت ہوتی ہے اس میں گوشت گھٹنے لگتا ہے اور دن بدن کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ زخم معده چنداں علاج پذیر نہیں۔ معمولی درد معده میں اگر محض غذا میں احتیاط برتی جائے اور حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی کی جائے تو بنیر دوا کے خود بخود اچھا ہو سکتا ہے۔

درد قویج، درد معده، درد گردہ کی تشخیص :- دیکھو درد قویج۔
علاج :- سب سے پہلے پلسا ٹیلا اور نکس و امیکا کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔
 (۱) اگر قبض ہو، درد کھانے پینے کے بعد زیادہ ہو۔ کھٹا پانی منہ کو آئے تو نکس و امیکا دوا ہے۔ شرابیوں اور بادی بوا سیر کے مریضوں کے لیے یہ خاص دوا بن جاتی ہے۔

(۲) اگر مرغن اشیاء کھانے سے درد معده ہو۔ بھوک اور پیاس نہ ہو، کھٹی یا کڑوی قے ہو جائے تو پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔ کیلچہ کا جلنا یعنی کیلچہ میں کھرچن سی ہونا پلسا ٹیلا کی خاص علامت ہے۔
 اگر اوپر کی دونوں ادویہ فیل ہو جائیں تو کاربودج، چائٹا، لائیکو

اور کلکیر یا کارب میں سے کوئی ایک دوا حسب علامت تجویز کرنا چاہیے
(۳) کاربودج اُس وقت مفید ہے جب شکم کے نچلے حصہ میں
نفخ ہو، کھٹی قے ہو، ہاضمہ سُست ہو۔ جلن کے ساتھ درد ہو جو پیٹھ
اور شانوں تک ہو۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوں۔ سر پسینہ آتا ہو۔ نیکس و امیکا
کے بعد یہ دوا بہتر کام کرتی ہے۔

(۴) چائنا میں عموماً سارے پیٹ میں نفخ اور اچھار ہوتا ہے۔
کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ ہر چیز کا ذائقہ کڑوا معلوم ہوتا ہے ڈکاریں سے
محض بات کی بات آرام ہو جاتا ہے۔

(۵) لائیکو پوڈیم میں عموماً پیٹ کے اوپری حصہ میں نفخ اور اچھار
ہوتا ہے، کلیجہ جلتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے۔ ڈکار سے کوئی فائدہ
نہیں ہوتا۔ آنتوں میں یاج کا بے حد اجتماع معلوم ہوتا ہے تکلیف
فوراً کھانے کے بعد ہو جاتی ہے۔

(۶) کلکیر یا کارب اُس وقت مفید ہے جبکہ مریض کو متلی معلوم
ہوتی ہو اور منہ سے کھٹا پانی آرہا ہو اور کھٹی قے ہوتی ہو، حرکت کرنے
سے سکون ملتا ہو، کھانے کے بعد کلیجہ میں جلن کا احساس جو حلق
تک جائے۔

(۷) بایو کیمک میں گنیشیا فاس اور کلکیر یا فاس باری باری دینا
مفید ہے۔ ۶x دینا چاہیے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سلفر سلیشیا، گنیشیا کارب،

سیپیا، کالی کارب، ارجنٹم مسٹ، کاسٹکم، آرسنک اور نیٹرم سیورہ وغیرہ اس مرض کی مخصوص دوائیں ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

مضمی

INDIGESTION

اسباب :- غذا کی بے اعتدالی، بار بار کھانا، شکم سیری کی حالت میں دوبارہ کھالینا۔ غذا جلد جلد بغیر اچھی طرح چبائے ہوئے کھانا، ثقیل اشیاء از قسم پوری، پراٹھا، مٹھائی اور دیگر مجموعہ کی چیزیں کھانا، چار یا شراب کا کثرت سے پینا۔ اچار اور چٹنی چیزوں کا کثرت استعمال، خرابی جگر، آنتوں کی خشکی، تمباکو نوشی، ورزش نہ کرنا، انیمیا یعنی خون کی کمی کا ہونا، رنج اور تفکرات کا ہونا، امراض مفصل اور بواسیر کی شکایت وغیرہ اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- مضمی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی تو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، سینہ میں جلن کا احساس ہوتا ہے، متلی معلوم ہوتی ہے، منہ میں پانی آتا ہے، کبھی بار بار پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ دست آنے لگتے ہیں۔ ریا ح پیٹ میں گھومتے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات قبض ہو جاتا ہے۔ معدہ میں درد معلوم ہوتا ہے، پیٹ میں گرائی ہوتی ہے، سانس سے بدبو آنے لگتی ہے۔

بعض حالات میں خفیف حرارت بھی ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے علاج میں تساہلی کی جائے اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی پیروی نہ کی جائے تو یہ مرض مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے اس وقت فمِ معدہ میں ہر وقت خفیف سا درد رہا کرتا ہے، نفخ ہو جاتا ہے، کبھی دست اور کبھی قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ لاغری اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے، سر میں درد اور اختلاج وغیرہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کا معلوم کرنا معالج کا پہلا فرض ہے۔ ہر حال میں غذا میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مرغن اور ثقیل غذا سے پرہیز کریں، بار بار یا شکم سیری کی حالت میں کوئی چیز نہ کھائیں۔ غذا چبا کر کھائیں تاکہ اس میں تھوک بھی شامل ہوتا رہے کیونکہ تھوک کی شمولیت چورن کا کام کرتی ہے، تبا کو پینا، اور شراب کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے۔ صبح و شام ہوا خوری اور مناسب ورزش کرنا چاہیے۔ پانی میں نمک ملا کر ہر روز غسل کرنا اور کھانے کے بعد نصف گھنٹہ تک آرام کرنا ضروری ہے، خود کو تفکرات سے دور رکھنا چاہیے۔

اگر معدہ میں ترشی زیادہ ہو گئی ہو جس سے کھٹی ڈکادیں آتی ہوں تو کھٹی اشیاء اور کچالو و کباب وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر معدہ میں ترشی کم پیدا ہوتی ہو جس سے بدبودار ڈکادیں آتی ہوں اور ہضمی کی شکایت ہو گئی ہو تو نمک والی اشیاء مثلاً شوربا اور دال چپاتی وغیرہ

گرم مسالہ ڈال کر کھائیں۔ ایسی حالت میں مرتبہ اور اچار کھانا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر جگر کا فعل درست نہ ہو تو آتش جو، دودھ اور نہایت ہلکی غذا کا استعمال مناسب ہے۔

بد ہضمی کی صورت میں بہر صورت غذا نہایت لطیف اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ نیز معدہ کو پورا آرام پہنچانا اشد ضروری ہے۔

علاج :- بد ہضمی کے علاج میں دست اور قبض کا بھی بیان دیکھنا چاہیے۔ (۱) کثرت مے نوشی، زیادہ دماغی کام، جاگنے، بیٹھے رہنے اور غذا کی بے اعتدالی سے بد ہضمی ہو جائے، سندھ سے پانی آئے، کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بھوک نہ لگتی ہو نوکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۲) ٹھنڈی اشیاء یا برت کا استعمال، کثرت متبا کو نوشی، کلیجہ کا جلنا، تیزابی اور جلن دار ڈکار جو حلق کو چھیلیتی ہوئی معلوم ہو، پیٹ میں جلن اور درد جو فوراً کھانے کے بعد ہو جس کے ساتھ متلی اور قے کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ مریض بہت کمزور ہو گیا ہو۔ ایسی حالت میں آرٹک بہت عمدہ دوا ہے۔

(۳) کھانا کھانے کے بعد پیت بھاری ہو جائے، غذا کی خوراک ہوش ہو لیکن ایک لقمہ کھانے کے بعد پیٹ حلق تک بھرا معلوم ہو۔ پیٹ میں ریا ح ادھر ادھر گھومیں اور گھڑ گھڑاہٹ سی پیدا کریں۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، کھانے کے بعد غنورگی معلوم ہوتی ہو تو لائیکو پوڈیم دینا چاہیے۔ سن رسیدہ لڑکوں میں نیز مزمن حالت میں یہ دوا اور بھی بہتر کام کرتی ہے۔

(۴) اگر منہ کا ذائقہ کڑوا یا کھٹا ہو، متعفن ڈکاریں آتی ہوں، معدہ کے مقام پر درد ہوتا ہو، دائمی قبض نیز بواسیر کی شکایت ہو، صبح کے وقت اکثر دست آجاتے ہوں تو سلفر دینا چاہیے۔

(۵) کھانے کے بعد غذا کے ذائقہ کی ڈکاریں آئیں، چرم بیلی اور مرغی اشیاء کے کھانے سے بد ہضمی ہو گئی ہو منہ میں پانی چھوٹے، پیٹ سخت ہو، ریا ح اوپر کو چڑھتے ہوئے محسوس ہوں جو سینہ میں آکر درد پیدا کر دیں جس کو ڈکاریں سے سکون ہو تو پلسا ٹیلا بہت مفید ہے۔

(۶) رطوبات زندگی کے ضائع ہو جانے سے ہاضمہ کی شکایت رہے، پیٹ میں گرائی معلوم ہو، پیٹ ہمیشہ بھرا معلوم ہو، جس کو ڈکاریں سے کوئی فائدہ نہ ہو، دست آنے کے باوجود مریض کھانے کی خواہش کرے، کمزوری زیادہ ہو تو چائنا دینا چاہیے۔

(۷) غذا یا پانی جیسے ہی معدہ میں گرم ہو، لمبے، پتلے اور سخت سدرے خارج ہوں تو فاسفورس دینا چاہیے۔ مزمن حالت میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے۔

(۸) دودھ کسی حال میں برداشت نہ ہوتا ہو، غذا یا پانی پیٹ میں پہنچتے ہی بذریعہ قے خارج ہو جائے، دودھ پینے کے فوراً بعد دہی کی صورت میں قے ہو جائے۔ غذا کو دیکھتے ہی متلی معلوم ہو، معدہ میں پھاڑنے والا درد ہو جو غذا کی نالی تک جائے تو ایتھوزا دینا چاہیے۔

(۹) کثرت ریا ح جو اوپر کو اٹھتے محسوس ہوں، دست آنے کی

طرف طبیعت رجوع ہو۔ ہلکی غذا بھی موافق نہ آئے، کمزوری بڑھ گئی ہو، شکم میں جلن ہوتی ہو، متعفن اور کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو کاربودج دینا چاہیے۔ یہ دوا دودھ پلانے والی مستورات اور سن رسیدہ لوگوں کے ہاضمہ کی خرابی میں بہتر کام کرتی ہے۔

(۱۰) ان ادویہ کے علاوہ کلکیریا کارب۔ گریفائیٹس، سیپیا، ارنیٹم نائٹ۔ بسمتھ چیلیڈونیم۔ مرک۔ پاڈوناٹلم، ایس نائٹرا۔ نیٹرم میور۔ اناکارڈیم۔ اگنیشیا۔ امونیا میور۔ الیومنا۔ سلیشیا۔ ہائڈراسٹس۔ ہیپر۔ کالی بائی اور کالی کارب وغیرہ وغیرہ ادویہ نہایت ضروری اور مفید ہیں۔

بھوک مرجانا

LOSS OF APPETITE

اسباب :- مرغن اشیاء کا کثرت استعمال، بدہضمی، ورم معدہ، عام کمزوری، کسی خون، خرابی جگر، طحال کا بڑھ جانا، ورم امعاء، کثرت شرب نوشی، معمول سے زیادہ غذا کھانا، اعضائے ہضم کی کمزوری، برودت معدہ یا حرارت معدہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ معدہ میں سرطان ہونے کی حالت میں مریض کو بھوک قطعی نہیں لگتی گویا اس مرض کی دیگر علامات کے علاوہ یہ بھی ایک بڑی علامت ہے۔

علامات :- مریض کو بھوک بہت کم لگتی ہے یا قطعی بھوک نہیں

معلوم ہوتی، غذا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بعض حالات میں غذا کو دیکھنے سے متلی معلوم ہوتی ہے۔ کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ مریض لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر اُسے جبراً تھوڑی بہت غذا کھلا دی جائے تو وہ بادل نا خواستہ کھا لیتا ہے ورنہ اُسے کوئی اشتہا نہیں ہوتی۔

پرہیز و ہدایات :- معالج گوجا ہے کہ سب سے پہلے اس مرض کا اصل سبب دریافت کر کے اس کے مطابق مناسب پرہیز بتلائے۔ اگر مرض کا باعث معدہ کی حرارت ہو تو گرم اشیاء بند کر دینا چاہیے۔ اس کی شناخت یہ ہے کہ مریض کو پیاس بہت معلوم ہوتی ہے اور معدہ میں گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر معدہ میں برودت کی وجہ سے بھوک غائب ہو گئی ہو تو گرم اور مقوی اشیاء دیں۔ برودت معدہ میں مریض کو پیاس کم معلوم ہوتی ہے اور ہاضمہ کی خرابی سے تڑپ ڈکاریں آتی ہیں جب بظاہر کوئی سبب نہ معلوم ہوتا ہو تو آلات ہضم کو تقویت دینا چاہیے۔ غذا میں ادک، لیموں اور نمک لاہوری کے استعمال سے آلات ہضم کو مدد ملتی ہے۔ مرغن اور چمبیلی اشیاء کا استعمال، کثرت چار نوشی اور شراب خوری بہت مضر ہے۔

علاج :- اگر غذا کی قلعی خواہش نہ ہوتی ہو تو انٹیم کروڈیکس دیکھا۔ پلسا ٹیلا، اور وریٹرم البم میں سے کوئی ایک دوا حسب علامات دینی چاہیے۔ (۲) اگر آلات ہضم کی خرابی کے بغیر بھوک مرگئی ہو تو کلگیر یا چائنا، لیگسیس، لائیکو، نکس و امیکا، سلفر اور وریٹرم البم میں سے

کسی ایک دوا کا انتخاب کرنا چاہیے۔

- (۳) اگر موسم گرما میں گرمی کے باعث بھوک جاتی رہی ہو تو برائی اونیہ، کاربودج، انٹم کروڈ، لائیکو اور نیٹرم میور وغیرہ عمدہ دوائیں ہیں۔
- (۴) اگر مریض کو دودھ سے نفرت ہو تو آرسنک، برائی اونیہ، کلکیریا، کاربودج، آئیشیا، ٹکس و امیکا، سیپیا اور سلفر میں سے کوئی دوا انتخاب کرنا چاہیے۔

بھوک بہت لگنا

BULIMIA

اسباب :- خراش معدہ، سوزش معدہ یا خرابی سودا، صفرا یا بلغم، اور مرض ذیابیطس وغیرہ۔ بچوں میں عموماً پیٹ میں کیٹروں کے باعث بھوک بار بار لگتی ہے۔ بعض وقت لمبی بیماری کے بعد رطوبات بدن کے زیادہ تحلیل ہو جانے سے اشتہا بڑھ جاتی ہے۔

علامات :- مریض دن میں بار بار کھانا کھاتا ہے۔ شدید حالات میں رات کو بھی دو ایک بار اٹھ کر کھانا پڑتا ہے۔ طبیعت سست اور مضحمل رہتی ہے۔ بچوں میں پیٹ نکل آتا ہے۔ باوجود عمدہ غذا کھانے کے دن بدن لاغری بڑھتی جاتی ہے۔ قلب کمزور ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر مرض ذیابیطس کے باعث پیشکایت ہو

تو میٹھی اشیاء قطعی بند کر دیں۔ اور مناسب پرہیز کرائیں (جسے دیکھو اپنے موقع پر) بچوں میں اگر پیٹ کے کیڑوں کی شکایت ہو تو ان کو بھی حتی الوسع میٹھی چیزیں نہ دیں۔ اگر خراش معدہ کے باعث بھوک بار بار لگتی ہو تو مریض کو ترش، کھٹی اور تیز مسالہ دار اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ ہمارے میوہ جات از قسم بادام، اخروٹ اور چلغوزہ وغیرہ کھلائیں غذا میں کسی قدر زعفران ملا کر دینے سے بھی کثر بھوک کم ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کسی لمبی بیماری کے بعد یہ شکایت ہو گئی ہو تو مریض کو مقوی غذا اور کسی ٹانک کا استعمال کرائیں۔

علاج ۲۔ (۱) اگر بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کے باعث بھوک بہت لگتی ہو تو سنا بہت مفید ہے۔

(۲) اگر مریض کڑوی اشیاء پسند کرتا ہو تو ڈیجیٹیس، نیسرم میور، اور نکس و امیکا میں سے کوئی دوا دینا چاہیے۔

(۳) اگر مریض کھٹی چیزوں کا شوقین ہے تو آرسنک، چائنا، پلسا ٹیلا، سلفر اور وریٹرم البم میں سے ایک دوا حسب علامت دینا چاہیے۔

(۴) اگر مریض ہر وقت میٹھی اشیاء کھانا چاہتا ہو تو امونیا کارب، چائنا، اپیکاک، کالی کارب اور سلفر وغیرہ میں سے کوئی ایک دوا انتخاب کر کے دینا چاہیے۔

(۵) میں نے اکثر و بیشتر حالات میں تین دواؤں پر اکتفا کیا ہے، کبھی میں کلکیر یا کارب دیتا ہوں۔ کبھی سٹیسٹیا بھی دینا پڑتا ہے اور بعض اوقات

متلی اور قے

NAUSEA & VOMITING

اسباب :- اس مرض کے کئی اسباب ہیں مثلاً مرض ہرنیا میں آنت کا پھنس جانا۔ زیادہ تمباکو کھا جانا یا پے درپے تیز قسم کی تمباکو کے کش لگانا۔ کوئی زہر از قسم سنگھیا اور افیون وغیرہ کھالینا یا کوئی تیز قسم کی بدبو یا خوشبو کو سونگھ لینا۔ دماغ میں چوٹ وغیرہ کا لگنا، موٹر، ریل، جہاز، یا گاڑی کی سواری سے بھی بعض اشخاص کو قے آنے لگتی ہے۔ امراض معدہ از قسم سوزش معدہ یا معدہ کا دب جانا وغیرہ بھی اس مرض کا باعث ہوا کرتا ہے۔ رحم کے بعض امراض سے نیز مستورات کو حمل کے ایام میں اکثر متلی کی شکایت رہا کرتی ہے۔ متلی اور قے کا ہونا ہمیشہ کی بھی ایک خاص علامت ہے۔ سینہ پر بلغم کے اجتماع سے بعض وقت زور سے کھانسی آنے پر قے ہو جاتی ہے۔ اکثر بد مضمی کے باعث منہ میں پانی چھوٹا کرتا ہے، متلی معلوم ہوتی ہے اور کبھی قے بھی ہو جاتی ہے۔ نامرغوب غذا کے کھانے سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔

نوٹ :- اکثر اوقات متلی اور قے کا ہونا قدرت کی طرف سے کسی بیماری کا دغیہ ہوا کرتا ہے مثلاً کسی زہر کے استعمال کے بعد قے ہونے سے

زہر بذریعہ قے خارج ہو جاتا ہے یا اگر ثقیل اور نامرغوب غذا کھالی گئی تو معدہ اُسے قبول نہیں کرتا بلکہ اُسے بذریعہ قے خارج کر دیتا ہے۔ گویا متلی اور قے بذاتِ خود کوئی مرض نہیں بلکہ بعض امراض کی علامات ہیں جن کا دریافت کرنا اشد ضروری ہے۔

علامات :- کبھی صرف منہ میں پانی چھوٹا کرتا ہے بعض وقت صرف متلی ہوتی ہے اور قے نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متلی اور قے ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں متلی اور قے سے بہت ضعف آجاتا ہے اور مریض نڈھال ہو جاتا ہے۔ سینہ پر طغم کے اجتماع سے یا معدہ کی ابتری سے اگر قے ہو جاتی ہے تو عموماً مریض اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔

تشخیص و تفریق :- قے کی دو بڑی قسمیں ہیں، معدہ کی قے اور دماغی قے۔ معدہ کی قے کی پہچان یہ ہے کہ اس میں پہلے متلی ہوتی ہے اور اس کے بعد قے ہوتی ہے جس سے طبیعت کسی قدر بحال ہو جاتی ہے۔ لیکن دماغی قے میں متلی نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں قے کے بعد بھی سکون نہیں ہوتا۔

پرہیز و علامات :- اگر معدہ پر ہو جانے پر اور نامرغوب غذا کے استعمال سے قے آنے لگیں تو ان کا روکنا مناسب نہیں بلکہ معدہ کے اندر کی غیر منہضم اور ناخوشگوار غذا کا باہر نکل جانا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ اسی صورت سے اگر سکھیا یا ایون وغیرہ کھا لینے سے شکا ہو گئی ہو تو

حلق میں انگلی ڈال کر اچھی طرح سے قے کر دینا ہی عقلندی ہے۔ اگر خراش معدہ کے باعث متلی اور قے ہوتی ہو تو مریض کی گدی پر برف رکھیں اور برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوسنے کو دیں۔ ثقیل اور نقاخ اشیاء سے سخت پرہیز کریں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی عمدہ دوا اپیکاک ہے۔ اس میں مسلسل متلی ہوتی ہے اور قے ہو جاتی ہے۔ اگر اپیکاک سے شفا نہ ہو تو نکس و امیکا دیدینے سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۲) اگر متلی شدید ہو صبح کے وقت زیادتی ہوتی ہو اور متلی میں غیر منظم غذا یا صفرا خارج ہوتا ہو تو نکس و امیکا بہتر کام کرتا ہے۔
(۳) متلی جبکہ خطرناک صورت اختیار کرتی جائے۔ بے چینی بڑھ جائے اور شدید کمزوری لاحق ہو جائے تو آرنک الہم دینا چاہیے۔
(۴) اگر خون کی قے ہو تو چمکدار خون میں اپیکاک اور سیاہی مائل خون کی قے میں ہما میلس دینا مفید ہے۔ بعض حالات میں کاربودج یا فاسفورس دینا پڑتا ہے۔

(۵) اگر قے میں دہی کی مانند منجمد پھٹکیاں پائی جائیں تو ایتھوزا اور کلکیریا کارب مفید ہیں۔

(۶) اگر معدہ کی خرابی سے متلی اور قے ہوتی ہو تو انٹیم کروڈ، برائی اونیٹا، اپیکاک، نکس و امیکا اور پلسا ٹیلا بہت مفید ہیں۔

(۷) جہاز یا گارمی کی ساری سے متلی ہو تو کوکولس انڈیکا اکسیر ہے۔

(۸) حاملہ مستورات میں متلی کے لیے اپیکاک، سپیا اور سلفر چوٹی پر کی دوائیں ہیں۔ بایوکیماک میں صبح کو ایک خوراک کالی فاس اور شام کو ایک خوراک فیرم فاس دوران حمل میں دیتے رہنے سے تمام تکلیفوں سے نجات رہتی ہے۔

(۹) اگر براز (پاخانہ) کی قے ہو جائے تو یہ نہایت خطرناک علامت ہے۔ مریض کو فوراً نکس و امیکا کی چند خوراکیں دینا چاہیے۔ اگر نکس فیل ہو جائے اور مریض حد سے زائد کمزوری محسوس کرے بے چینی بڑھ جائے تو آرسنک دینا چاہیے۔

(۱۰) اگر غذا کی قے ہو جائے تو آرسنک، اپیکاک، کیموٹلا اور ورٹیرم وغیرہ مفید ہیں۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ زنکم، ٹو بیسم، سلیشیا، بیلادونا، چائنا، انٹم ٹارٹ، کیو پر مٹ، آئیو ڈیم، اوپیم، کریا زوٹ، آئرس، کیمفر، بسمتھ اور پیپیم وغیرہ نہایت اہم ادویہ ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

اشارات

(الف) کھانا یا پانی شکم میں جاتے ہی قے ہو جائے۔ بسمتھ۔
 (ب) بالی جوں ہی معدہ میں گرم ہوتے ہو جائے۔ فاسفورس۔
 (ج) بکری قے یا سواری سے قے۔ کوکولس ٹافی سیکریا۔

(د) شام کو یا کھانے کے بعد متلی - پلسا ٹیلا -

(س) ٹھنڈا پانی پینے کے بعد فوراً تے ہو جائے - آرسنک -
دیر کے بعد تے ہو - فاسفورس -

(س) غذا دیکھتے ہی متلی - یو پیٹوریم برون -

غذا کی خوشبو سے تے - ڈیجی ٹیلیس -

(ص) حرکت سے متلی - برائی او نیا -

(ط) نہ بند ہونے والی متلی یا رال کی زیادتی معدہ کی خرابی سے -
اپیکاک -

(ع) صبح سویرے متلی - نکس دامیکا - پلسا ٹیلا - کلکیریا کارب -

قبض

CONSTIPATION

اسباب :- غذا میں بے احتیاطی، ثقیل اشیاء کا استعمال، کثرت شراب و چار نوشی، امراض جگر و معدہ، مناسب ورزش نہ کرنا، عورتوں میں رحم کا دباؤ پڑنا اور دیگر رجمی امراض، صفرا کا کم پیدا ہونا، آنتوں میں رطوبت کی کمی، مرض بواسیر، آنتوں کا فاج یا ان کی قوت دافعہ کا کمزور پڑ جانا، آنتوں کا تشنج اور آلات ہضم کی کمزوری وغیرہ -

علامات :- پاخانہ قبض سے ہوتا ہے، رفع حاجت کے وقت

زیادہ دیر لگتی ہے۔ پیٹ میں گرانی رہتی ہے۔ کبھی نفخ ہو جاتا ہے۔ پاخانہ کبھی خشک اور کبھی سیاہی مائل متغضن خارج ہوتا ہے۔ طبیعت کسلند رہتی ہے۔ سر میں ہلکا ہلکا درد ہوا کرتا ہے۔ بعض حالات میں دھڑکن کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ مزمن حالات میں قبض کے باعث دیگر امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور مریض کا جسم زرد پڑ جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات: سب سے پہلے قبض کی وجہ دریافت کرنا چاہیے۔

غذا کی احتیاط اس میں بہت ضروری چیز ہے۔ غذا وقت مقررہ پر خوب چبا کر کھانا چاہیے۔ ہلکی اور زود ہضم غذا کا استعمال رکھیں، اگر شراب نوشی یا سگریٹ و چار کے پینے سے قبض کی شکایت ہو تو ان چیزوں کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ پانی میں نمک ملا کر غسل کریں۔ اگر مرض مزمن ہو گیا ہو تو جلاب ہرگز نہ دیں (عطائی علاج نا تجربہ کاری کے باعث عموماً جلاب دینا ہوا کرتا ہے جو کہ مزمن قبض کے لیے بالکل بے سود بلکہ اکثر حالات میں سخت مضر ہے) حیوانی اور نباتی دونوں قسم کی غذائیں کھانی چاہئیں۔ مثلاً روٹی، سبزی، ترکاری، میوہ جات اور گوشت کا شوربہ (بوٹی مضر ہے) وغیرہ۔ گوشت میں کوئی ترکاری ضرور ڈالنا چاہیے تاکہ گوشت کی اصلاح ہو جائے۔ پرول، تری، لوکی، پالک، سلجم اور چندر وغیرہ عمدہ ترکاریاں ہیں۔ لوبیا، مٹر، بیگن اور آلو سے پرہیز کریں۔ انڈا، میدہ کی پوری اور مٹھائی وغیرہ بھی قابض چیزیں ہیں۔ اسی طرح باریک آٹے کی روٹی اور حلو اور نیا چاول قبض پیدا کرتا ہے۔ سیب اور بھی کو چھوڑ کر بقیہ تمام

پھلوں کا استعمال رفع قبض کے لیے بہت مفید ہے۔ خواہ غذا سے قبل استعمال کریں یا بعد۔ آم، امرود، انگور، انجیر، آڑو، آلوچہ، خوبوزہ اور سنگترہ وغیرہ پھلوں کا استعمال بہت مفید ہے۔

علاج :- اس مرض کی سب سے عمدہ دوا نکس و امیکا ہے جو اکثر وبیشتر علامات پر حاوی ہو جاتی ہے بادی بوا سیر کے مریضوں کے لیے خاص چیز ہے۔ بعض مصنفین نے اس کو چھوٹی طاقت میں دینا بہتر بتایا ہے لیکن چھوٹی ہی طاقت پر منحصر نہیں ہے اس کو اونچی طاقت میں بھی دینے سے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض وقت نکس و امیکا نمبر ۳ یا ۶ دینے سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہونے پر دوسو نمبر کی ایک خوراک نے جادو کا سا اثر کیا۔

(۲) اگر قبض مستقل طور پر رہنے لگا ہو اور نکس و امیکا سے کام نہ چلا ہو تو سلفر بہت عمدہ دوا ہے۔ صبح نہار منہ سلفر نمبر ۳۰ اور دن میں تین خوراک نکس نمبر ۶ دینے سے قبض رفع ہو جایا کرتا ہے۔ بادی بوا سیر کے مریضوں کے لیے بھی یہ تجربہ کیا ہوا نسخہ ہے۔

(۳) اگر آنتوں کے سکڑے جانے یا آنتوں کی خشکی سے قبض ہو، پاخانہ سخت اور مچھلسا ہوا ہوتا ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو۔ درد سر کی شکایت ہو تو برائی ادویہ دینا چاہیے۔

(۴) ایسا قبض کہ پاخانہ کی حاجت ہی نہ ہوتی ہو، پاخانہ میں چھوٹی سخت اور سیاہ رنگ کی ادغٹ کی سی مینگنیاں خارج ہوں،

مہرز قطعی اپنا فعل نہ کرے، آنتوں میں خشکی ہو، مریض سُست رہتا ہو تو اوپیم دینا چاہیے عموماً نمبر ۲۰۰ بہتر کام کرتا ہے۔

(۵) سخت قبض، پاخانہ میں سخت سدے خارج ہوں یا پتلا پاخانہ بھی بہت مشکل سے آئے، پاخانہ کی حاجت نہ ہو لیکن فضلہ کا اجتماع آنتوں میں پایا جائے۔ مہرز میں پاخانہ خارج کرنے کی نا اہلیت اور سُستی ہو تو الیومنا بہت مفید ہے۔ نوجوانوں کے مقابلہ میں بوڑھوں اور بچوں میں یہ دوا خصوصیت سے مفید ہے۔

(۶) اگر جگر خراب ہو، معدہ میں ریا ج بھرے معلوم ہوتے ہوں۔ پاخانہ کی بے سود حاجت ہوتی ہو یا پاخانہ ہونے کے بعد بھی یہ احساس ہو کہ اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو لائیکو پوڈیم نہایت مفید ہے۔ یہ دوا عموماً بوڑھے لوگوں کی ہے۔

(۷) دائمی قبض کے لیے سلی کا میرنیا $\times ۳۴$ بقدر پانچ گرین صبح و شام دو گھونٹ پانی کے ساتھ کئی روز استعمال کرنے سے قبض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ بہت مستند نسخہ ہے

(۸) پاخانہ نہایت سخت ہو اور تراشا ہوا معلوم ہوتا ہو۔ جس کو انگلی سے نکالنا پڑے تو سینی کو لا بہت مفید ہے۔

(۹) ثقیل غذا سے یا مرغی چیزوں کے استعمال سے قبض ہو یا مستورات میں حیض کے بگاڑ سے قبض ہو گیا ہو تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔

(۱۰) مستورات میں حمل کے ایام میں قبض ہو جائے تو سیبیا،

پلاٹنا کولین ، سونیا یا برائی اونیا میں سے کوئی دوا حسب علامت دینا چاہیے۔
 (۱۱) باؤکیمیک میں نیٹرم میور ، نیٹرم سلف اور کلکیریا فلور خاص
 دوائیں ہیں۔ بواسیری مریضوں کو کلکیریا فلور مفید ہے۔
 (۱۲) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کاسٹکم ، گریفائٹس ، پلمبم ،
 کلکیریا اور ایلو ادویہ نہایت اہم ہیں۔ ان ادویہ کے بعد انا کارڈیم ،
 فاسفورس ، فاسفورک ایسڈ ، انٹم گروڈ ، چلیڈونیم۔ لیکسیس اور
 ورٹیم الیم کی طرف توجہ کریں۔

(۱۳) اگر علامات صاف نہ ملتی ہوں اور ادویہ کے انتخاب میں
 دشواری ہو تو ہائیڈراسٹس مدرٹنکچر کے دس قطرے ایک آؤنس پانی میں
 ملا کر ایک خوراک دیدینا چاہیے۔ اگر ایک خوراک سے کام نہ چلے تو
 پہلی دوا دینے کے آٹھ گھنٹہ بعد دوسری خوراک اسی قسم کی دیدینے سے
 اکثر اجابت ہو جاتی ہے۔

دست

DIARRHOEA

اسباب :- کمزوری معدہ ، بد ہضمی ، مرغن اشیاء اور گھی وغیرہ کا
 زیادہ مقدار میں کھانا ، کچے پھل ، ثقیل غذا اور نفاخ اشیاء کا بکثرت
 کھانا ، زیادہ گرمی یا سردی سرایت کر جانا ، آنتوں میں صفرا کا زیادہ گرنا ،

عام کمزوری، جگر کے فعل کا خراب ہونا، بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ سرد اشیاء کا استعمال کرنا، بار بار تیز جلاب لینا، آنتوں میں کیڑوں کا ہونا یا ان میں درمی کیفیت کا ہونا، آنتوں میں سدے ہونا اور امراض مہینہ، سیل، دق، ٹائیفائڈ اور فالج وغیرہ، آنتوں کی کمزوری، دق الامعاء اور عفونتی بخار وغیرہ، بچوں میں اکثر دانت نکلنے کے زمانہ میں دست آنے لگتے ہیں اور حاملہ عورتوں کو بعض اوقات بجائے تے کے دوران حمل دست آیا کرتے ہیں۔

علامات :- بار بار پتلے پاخانے ہوتے ہیں۔ کبھی پاخانہ میں سخت تعفن ہوتا ہے۔ پیٹ میں اپہار ہوتا ہے۔ بعض وقت جی بھی متلاتا ہے، منہ میں پانی آتا ہے۔ کبھی ڈکاریں آتی ہیں۔ اجابت کبھی بغیر درد کے ہوتی ہے اور بعض اوقات پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں اینٹھن سی معلوم ہونے لگتی ہے، کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ پاخانہ کارنگ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے، دست کبھی زرد، کبھی سیالے اور بعض اوقات سیاہ رنگ کے یا جھٹک دار ہوتے ہیں۔ نوٹیا اور ٹائیفائڈ، دق اور عفونتی بخاروں میں دستوں کا آنا بہتر نہیں سمجھا جاتا۔

پرہیز و ہدایات :- دستوں کی حالت میں مریض اگر کھانے کی خواہش کرے تو اسے دس بارہ گھنٹہ تک غذا ہرگز نہ دیں بلکہ دودھ کو پھاڑ کر اس کا پانی دیں یا صرف جوش دے کر سرد کیا ہوا سادہ پانی

دو دو تین تین گھنٹہ کے بعد دیں۔ افاقہ ہو جانے پر گائے کا دودھ،
سابودانہ، یا شوربا یا مونگ کی دال کا پانی دیں۔ جب مرض رفع ہو جائے
تو کھجڑی، پھلکا شوربا اور برادل، تڑنی، لوکی، پالک وغیرہ ترکاریاں
دے سکتے ہیں۔

نوٹ :- دودھ کو جوش دے کر سرد کر لینا چاہیے اور خیف سی شکر
ملا کر پینا چاہیے۔ شکر ڈالنے سے دودھ کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ایسا
کرنے سے وہ نفخ کم پیدا کرتا ہے۔

چونکہ دست آنا بعض امراض کا قدرتی علاج ہے چنانچہ بعض حالات
میں دستوں کا آجانا ہی شفا کی دلیل ہوتی ہے ایسی حالتوں میں دستوں کو
بند کرنے سے بجائے فائدے کے نقصان پہنچتا ہے۔

علاج :- اگر پانی کے سے متعفن، جھاگ دار اور سبز دست آتے
ہوں، متلی اور قے کی شکایت ہو تو اپیکاک بہت عمدہ دوا ہے۔

(۲) اگر مرغن غذا کھانے یا ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے دست
آتے ہوں چانغانے سبز یا رنگ برنگ کے ہوتے ہوں، پیٹ میں
گھڑ گھڑاہٹ اور گائے والا درد ہوتا ہو اور دستوں کی زیادتی رات کو
خصوصیت سے ہو جاتی ہو مریض ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرتا ہو تو پلسا ٹیلا
نہایت مجرب دوا ہے۔ اپیکاک کے فیل ہو جانے کے بعد اکثر حالتوں
میں یہ دوا کافی ہوا کرتی ہے اور بعض وقت آرسنک دینا پڑتا ہے۔

(۳) اگر معدہ کی خرابی سے، سالہ دار اور ثقیل چیزوں کے کھانے

یا گرم ادویہ کے پینے سے دست آنے لگیں جو پتلے اور بھورے رنگ کے ہوں۔ تو نکس و امیکا دینا چاہیے پلسا ٹیلا کے ناکام رہنے پر عموماً نکس دینے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ شرابیوں کے اسہال کے لیے نکس و امیکا خاص دوا ہے اکثر اس دوا میں پھیٹش کی بھی علامات پائی جاتی ہیں۔ شب بیداری سے دستوں کے لیے بھی نکس ہی دوا ہوتی ہے۔ (۴) اگر دست متعفن قسم کے ہوتے ہوں۔ دستوں کا رنگ سبز یا بھورا یا سیاہ ہو۔ مریض تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار پانی پیے، کمزوری زائد ہو اور مریض بے چین معلوم ہوتا ہو، غذا کی بے احتیاطی، تیزابی اشیاء، پھل اور ٹھنڈی چیزوں کے پینے سے دست آنے لگے ہوں تو آرسنک مفید ہے۔

(۵) بار بار پانی کے سے پتلے دست، پیٹ میں پانی کی سی گھڑ گھڑاہٹ ہو، یا صبح اٹھتے ہی بلا درد کے دھار باندھ کر بڑے بڑے دست آنے لگیں تو پاڈوفاٹلم دوا ہے۔ اس کا مریض دستوں کے باوجود کمزور نہیں معلوم ہوتا۔ (۶) اگر معدہ خراب ہو، بغیر درد کے اسہال ہوں جن میں غیر منہصم غذا کے ٹکڑے پائے جائیں، پیٹ میں نفخ ہو اور بدبودار ریح کا اخراج ہوتا ہو۔ کمزوری زائد ہو تو چائنا بہت مفید ہے۔

(۷) سفیدی مائل یا سبز رنگ کے اسہال جن میں مٹھے ہوئے انڈوں کی سی بو آئے، درد منگی اور قے کی شکایت ہو تو کیمو ملا دوا ہے۔ یہ دوا بچوں کے لیے مخصوص ہے جبکہ بچے کے دانت نکل رہے ہوں۔

بچہ حد سے زیادہ چڑچڑا ہو گیا ہو، ایک گال سرخ اور دوسرا زرد ہو۔
(بچوں کے دانت نکلنے کی حالت میں اسہال کے لیے اگر کمیو ملانا کام
رہے تو کلکیر یا کارب کی طرف توجہ کرنا چاہیے بشرطیکہ اس کی علامات
پائی جائیں)۔

(۸) اگر دست مٹیا لے یا سیاہ رنگ کے ہوں جن میں سخت تعفن ہو،
اور اس کا سبب مادہ سورا ہو یا کسی سخت مرض کے بعد دست آنا
شروع ہو گئے ہوں، مریض کے جسم، منہ اور پسینہ سے بھی تعفن آئے
تو سورنیم بہترین دوا ہے۔

(۹) متعفن دست از خود پہاں تک ریا ح کے ساتھ خارج ہو جائے،
شکم میں زور زور سے گھڑ گھڑا ہٹ ہو۔ ریا ح بدبودار ہوں اور میرز
ڈھیلی ہو جائے۔ مریض یہ خیال کرے کہ صرف ریا ح خارج ہوئی ہے
مگر اس کے ساتھ پاخانہ بھی نکل جائے تو ایلو عمدہ دوا ہے۔

(۱۰) اگر دست مزمن ہو گئے ہوں یا دانے دب جانے سے دست
آنے لگے ہوں تو سلفر دوا ہے۔ مصنف کا ذاتی تجربہ ہے کہ سلفر کی
اونچی طاقتیں پُرانے اسہال میں حیرت انگیز کام کرتی ہیں۔ یہ دوا
اُس وقت خصوصیت سے مفید ہوتی ہے جبکہ دست علی الصباح ہوتے
ہوں، پاخانہ جھاگ دار، سبز، زرد، اور متعفن ہوتا ہو۔ نیز رنگ بدلنے والے
اسہال ہوں اور مریض کی چاند پر جلبن ہوتی ہو اور مریض کے اخراج سے
سوزش ہوتی ہو۔

(۱۱) اگر بچوں میں چنچنوں یا کیڑوں کی وجہ سے دست آتے ہوں تو سنا دینا چاہیے۔

(۱۲) با یو کیمک میں فیرم فاس عمدہ دوا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو گنیشیا فاس دینا چاہیے یا دونوں دواؤں کو یکے بعد دیگرے دیں۔

(۱۳) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ فاسفورس، فاسفورک ایسڈ، کلکیر یا کارب، رشاکس، برانی ادینا، مرک سال، انٹم کروڈ اور وٹیم الیم نہایت عمدہ دوائیں ہیں۔ علاوہ ازیں سیکیل، سلیشیا، ہسپر، نائٹرک ایسڈ، کلکیر یا فاس، آرنیکا، اکونائٹ، بیلاڈونا، آئرس، کاربودج، ٹیٹرم میور اور ڈیجی ٹیلیس وغیرہ بھی عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامات دینا چاہیے۔

سنگرنی

SPRUE

(نیز دیکھو دست)

اسباب :- آنتوں کی کمزوری۔ پرانے اسہال، آنتوں کی دیواروں کا پتلا پڑ جانا، آنتوں میں سطحی خراش کا پیدا ہو جانا، آلات ہضم کی خرابی، اعصابی کمزوری، بد ہضمی، مزمن سچش، آنتوں کے اعصابی مرکز کا ذکی اس ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اکثر دلی صدمات اور رنج و غم کی کثرت کے باعث بھی اس قسم کے دست آجاتے ہیں، عورتیں اور بچے

اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

علامات :- ذرا سا کھانے پینے کے بعد فوراً پتلا دست آجاتا ہے۔ دستوں میں عموماً غیر منہضم شدہ غذا خارج ہوتی ہے۔ مریض کو بار بار بھوک لگتی ہے، اس کا جسم زرد پڑ جاتا ہے اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔

یہ رہنمائی دے ایاات :- مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ اگر معدہ کی کمزوری سے یہ شکایت ہو تو معدہ کو پورا آرام پہنچائیں۔ ثقیل اور نفاخ اشیاء سے سخت پرہیز کرائیں۔ تندرست گائے کا عمدہ تازہ دودھ جوش دے کر قدرے شکر ملا کر استعمال کرنے کی ہدایت کریں۔ اگر مریض کو دودھ موافق نہ آتا ہو تو مونگ کی دال کا پانی دیں۔ رفتہ رفتہ مونگ کی کھچڑی (جس میں ساٹھی کے چاول ہوں) اور پھل وغیرہ کا استعمال بھی کرائیں۔

علاج :- آرسنک اور سلفر چوٹی پر کی دوائیں ہیں۔ ان کے علاوہ ایو، کاربووج، کلکیر یا کارب، کیو ملا، ہائڈروکس، ایتھوزا اور نائٹرک ایسڈ بہت مفید ادویہ ہیں۔ حسب علامات دیں۔

آنتوں کے کیڑے

INTESTINAL WORMS

(دیکھو پیٹ کے کیڑے حصہ دوم باب سوم میں)

آنتوں کا ورم

ENTERITIS

اسباب :- ثقیل یا باسی اشیاء کے کھانے سے آنتوں میں خراش کا ہونا، خرابی معدہ، سالہ دار غذا اور زیادہ شیرینی یا زیادہ سرخی کا کھانا، تیز قسم کی شراب پینا، آنتوں میں ضرب یا زخم کا ہونا، آنتوں میں صفراوی گنگریوں کا جمع ہو جانا، پیٹ کو سردی لگنا، امراض جگر و امراض سل، ہیضہ و بخار وغیرہ۔

علامات :- پیٹ میں قولنج کا سادہ ہوتا ہے، شکم میں بعض وقت گھڑ گھڑاہٹ سی معلوم ہوتی ہے۔ بلغمی یا صفراوی رنگ کے دست آتے ہیں۔ سردی لگ کر بخار آتا ہے، پیاس بار بار لگتی ہے، نبض میں تیزی اور سختی پانی جاتی ہے، شدیدہ حالات میں مریض بیہوش ہو جاتا ہے یا تشنجی کیفیت ہونے لگتی ہے۔ جو اس مرض میں بُری علامت ہے۔ بعض حالات میں مریض کو ہڈیاں ہو جاتا ہے، بدبودار قے کا اخراج ہوتا ہے

یافتے میں براز خارج ہونے لگتا ہے یہ علامت بھی مریض کے لیے موت کا پیغام ہوا کرتی ہے۔

اگر بارہ انگشتی آنت میں ورم ہو جاتا ہے تو مریض کو ریقان ہو جاتا ہے۔
 بہرہائیز و ہدایات :- اس مرض میں غذا کی احتیاط سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر ابتدا ہی سے مناسب پرہیز اور علاج کیا جائے تو رفتہ رفتہ مریض کو صحت ہو جاتی ہے۔ مریض کو آرام سے بستر پٹا رکھیں، اگر پیاس کی شدت ہو تو ذرا ذرا سا پانی دیتے رہیں اور مقام درد کو سینک پیس اور بدمعہ دینا سہ سے وغیرہ خارج کر دیں۔ غذا میں دودھ میں سوڈا واٹر ملا کر دیں بعد ازیں مونگ کی دال کا پانی یا پتلا سا بودا نہ دیں۔ باسی ثقیل غذا، پوری، کچوری اور نفاخ اشیاء سے سخت پرہیز رکھیں۔

تشخیص و تفریق :- آنتوں کا ورم، پیری ٹونائٹس، درد قولنج اور پیٹ کے پھوڑے کی تشخیص کرنا ضروری ہے۔ آنتوں کے ورم میں مریض کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بخار بھی ہوتا ہے جبکہ درد قولنج میں مریض کو بخار نہیں ہوتا۔ پیری ٹونائٹس میں مریض ٹانگیں سکڑ لیتا ہے۔ پیٹ کو چھونے سے سخت درد ہوتا ہے اور مریض سانس لینے میں اپنے پیٹ کو روکتا ہے۔ نفخ ہر وقت رہتا ہے۔ پیٹ میں پھوڑے کی حالت میں آنتوں کے فضل میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔

علاج :- اس مرض میں چار دوائیں کوٹاٹ میلا ڈونا برائی ادینا اور کالوسنتھ عجیب و غریب ہیں۔ عموماً انھیں چاروں ادویہ سے شفا

ہو جایا کرتی ہے اور دوسری دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی یا ان ادویہ کے استعمال کے بعد مرض میں کسی قسم کی پیچیدگی کا خدشہ نہیں رہتا۔
مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ بعض وقت نکس و امیکا، مرک سال، آرٹک اور سلفر دینا پڑتا ہے، مرک سال اس وقت دینا چاہیے جبکہ مریض میں مرک کی دیگر علامات کے ساتھ ساتھ پاخانہ سے مواد آتا ہو۔ اس کی ادبھی طاقتیں ایسی حالت میں عمدہ کام کرتی ہیں۔
اگر قولنجی درد ہوتا ہو اور پاخانہ میں لچھے دار رطوبت خارج ہوتی ہو تو اکونائٹ اور کالوسنتھ باری باری سے دینا چاہیے ان علامات میں یہ نسخہ بہت مجرب ہے۔

آنتوں میں درم، بدہمی، ریاحی تکلیف اور قبض کی حالت میں لائیکو پوڈیم عمدہ دوا ہے۔

مزمن درم الامعاء میں آرٹک، ہیلڈونا، اور نکس نہایت مجرب ادویہ ہیں۔ درمیان میں کبھی کبھی سلفر بھی دینا چاہیے۔

ورم زائدہ - اپنڈی سائٹس

APPENDICITIS

اسباب :- مزمن قبض، مرض انفلوئنزہ، امراض مفاصل، نفرس، زائدہ کی نالی میں برازیامیوہ مثلاً جامن، انگور، سنترہ وغیرہ کی

گٹھلی کا پھنس جانا۔ زائدہ مذکور میں شدید چوٹ کا لگ جانا وغیرہ۔

علامات :- مریض کو یکایک ناف کے ارد گرد درد ہوتا ہے جو اس قدر شدید ہوتا ہے کہ مریض مانند ماہی بے آب کے تڑپتا ہے رفتہ رفتہ وہ درد سمٹ کر دائیں پیڑوں میں آجاتا ہے۔ لرزہ سے بخار آجاتا ہے۔ شدید حالات میں بخار ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتا ہے، بار بار متلی ہوتی ہے۔ دائیں پیڑو کو دبانے سے وہاں پر ایک ابھار سا معلوم ہوتا ہے جو چھونے سے درد کرتا ہے۔ بعض حالات میں پیشاب قطرہ قطرہ ہونے لگتا ہے یا اُس میں البیومن آنے لگتی ہے۔ دورہ کی کیفیت عموماً دو تین دن تک رہتی ہے لیکن مقام ماؤفہ پر درد کی کھٹک باقی رہتی ہے۔ اگر زائدہ یعنی اپنڈکس میں پسپ پڑ جاتا ہے تو پھوڑا بننے لگتا ہے تو مریض کو لرزہ سے بخار آتا ہے۔ قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اور بار بار قے ہوتی ہے۔ جس کا انجام عموماً خراب ہی ہوتا ہے۔

بہتر ہمدایات :- ایلو پیتھک طریقہ علاج میں اس مرض کے لیے سوائے آپریشن کے اور کوئی چارہ نہیں لیکن ہومیو پیتھک علاج نے ہزاروں مریضوں کو اس مرض سے نجات دلادی اور آپریشن کی تکالیف سے بچا لیا ہے۔ مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں مقام ماؤفہ کو اچھی طرح سینکیں، آنتوں کی صفائی کے لیے گرم پانی میں صابن گھول کر انیما لینا چاہیے۔ غذائیں مونگ کی دال کا پانی دودھ یا آتش جو وغیرہ دیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں سیلا ڈونا بہترین دوا ہے۔
اس کی کئی خوراکیں دینا چاہئیں۔ عموماً یہ دوا تنہا مرض پر حاوی
ہو جاتی ہے۔

(۲) اگر کسی وجہ سے پہلی دوا فیل ہو جائے اور درد مستقل طور پر
رہنے لگے نیز اچھا پیدا ہونے لگے تو ڈاٹسکوریہ کی چند خوراکیں
حیرت انگیز کام کرتی ہیں۔

(۳) اگر درد نہایت تیز ہو، چھوٹے سے یا حرکت سے تکلیف
بڑھ جاتی ہو۔ بار بار قے ہوتی ہو تو پٹیم دوا ہے۔

(۴) اگر مریض کے آپریشن کے باوجود درد باقی ہو، مریض درد
کے باعث انتہائی مغموم ہو گیا ہو تو اگنیشیا دینا چاہیے۔

(۵) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ ایکی نیشیا، ہسپر، کالی آئیوڈائیڈ،
رٹاکس، سلفر، لائیکو اور لیکسیس وغیرہ عمدہ دوائیں ہیں۔
حسب علامت دیں۔

ہوا سیر

PILES

اسباب :- قبض، بار بار جلاب لینا، نفاخ، مسالہ دار اور
مرغن اشیاء کا کثرت استعمال، زیادہ بیٹھے رہنا، کمزوری جگر، کثرت

مے نوشی، آنتوں میں چُن چُننے، یا سوتی کیڑوں کا ہونا سرد یا گرم جگہ پر بیٹھنا وغیرہ۔ بعض مستورات میں حمل کے ایام میں بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے جو وضع حمل کے بعد خود بخود رفع ہو جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض کی دو بڑی قسمیں، باوی اور خونی۔

باوی بواسیر میں پیٹ میں قراقرہ ہوتا ہے، اندرونی مٹے پائے جاتے ہیں جن سے خون کا اخراج نہیں ہوتا، مقعد پر بوجھ کا احساس ہوتا ہے، بعض وقت خارش اور درد کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ شدید قبض رہا کرتا ہے۔

خونی بواسیر میں مبرز کے کنارے مسوں کی کثرت ہوتی ہے بعض وقت مٹے انگور کے گچے کی مانند رفع حاجت کے وقت باہر نکل آتے ہیں جو بعض اوقات بڑی مشکل سے اندر کو جاتے ہیں۔ مسوں سے خون کا اخراج ہوتا ہے۔ بعض وقت پاخانہ پھرنے کے بعد ایک ایک قطرہ ٹپکتا رہتا ہے لیکن کبھی دھار باندھ کر خون گرتا ہے، بعض حالات میں اس قدر خون نکل جاتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مسوں میں غضب کا درد ہوتا ہے، کبھی خارش اور ٹیس ہوتی ہے۔ جب خون بکثرت آتا ہے تو مریض دن بدن کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے، جسم زرد پڑ جاتا ہے۔ یوں تو یہ مرض کم و بیش ہر وقت موجود رہتا ہے۔ مگر عموماً اس کی شدت دورہ کی شکل میں ہوتی ہے چنانچہ اکثر مریضوں کو ہر ماہ تین چار دن تک اس مصیبت سے دوچار رہنا پڑتا ہے۔ شدید

حالات میں کئی ہفتہ تک افاقہ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے مریض پائے جاتے ہیں جن کو سال میں دو ہی ایک دورے اس قسم کے پڑتے ہیں۔ بواسیر کی تکلیف عموماً اسی وقت ہوتی ہے جب بھی ثقیل اشیاء کا استعمال کیا جائے اور قبض کی شکایت ہو جائے۔

پرہیز و ہدایات :- چونکہ قبض ہی اس کا اہم سبب مانا گیا ہے اس لیے نہایت ہلکی غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھٹائی، مرچ، مسالہ دار اشیاء اور تیل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تری، لوکی، بھنڈی اور مولیٰ وغیرہ کی ترکاری مفید ہے۔ گوشت بغیر سبز ترکاری کے پکا ہوا نہ کھانا چاہیے۔ شراب، آلو، مینگن، میٹھی، لہسن، اور گرم دبا دی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ورزش اور ہوا خوری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آبدست کے پانی میں چند قطرے ٹنکچر کیلنڈولا کے شامل کر لینا مفید ہوا کرتا ہے۔

جب مستوں میں غضب کا درد، درم اور ٹلیسن ہوتی ہو، مریض بارے درد کے بے تاب ہو تو وقتی سکون کے لیے بورک ایسڈ سے سینکنا چاہیے یعنی تھوڑے سے پانی کو گرم کر کے اُس میں بورک ایسڈ ڈال دیں اور اُسی میں کپڑا بھگو کر مستوں پر ٹپکائیں اور یہ عمل بار بار کرتے رہیں حتیٰ کہ درد کی شدت جاتی رہے۔

علاج :- بادی بواسیر میں صبح کو نہار منہ ایک خوراک سلفر اور شام کو سوتے وقت ایک خوراک نکس دامیکا نہایت مشہور و معروف نسخہ ہے جو بارہا تجربہ میں آچکا ہے۔ امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے بادی بواسیر کا

یوں علاج کیا ہے کہ ایک روز صبح کو ایک خوراک سلفر اور دوسرے دن صبح کو ایک خوراک نکس و امیکا کی دی ہے۔ اسی طور سے دو ہفتہ کرنے سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔

(۲) بواسیر بادی ہو یا خونی سلفر دوا عجیب و غریب کام کرتی ہے۔ پاخانہ کی بار بار حاجت کا ہونا اور پتلا خون آمیز پاخانہ کا ہونا، مقعد کے اندر نیز باہر نیش زنی کا سادرد ہونا۔ پیٹھ اور ریڑھ میں کوچن کا سادرد یا سختی و سکڑن کا سہا حساس وغیرہ اس کی خاص علامتیں ہیں۔

(۳) اگر سالہ دار غذا، گرم اشیاء، شراب وغیرہ سے بواسیر ہوگئی ہو یا مسلسل بیٹھے رہنے، سخت دماغی کام اور قبض سے یہ شکایت ہوگئی ہو تو نکس و امیکا دینا مفید ہے۔ مسوں میں جلن اور چھین کا ہونا، ٹھنڈے پانی سے آبدست لینے میں سکون کا ہونا، دائمی قبض کا ہونا اور پیٹھ و پیٹ میں درد کا ہونا، مسوں میں خارش کا ہونا جس کے باعث مریض رات کو سونہ سکے، مسلسل پاخانہ کی حاجت وغیرہ اس دوا کی بڑی بڑی علامتیں ہیں۔

(۴) اگر مسے انگور کے گچھے کی مانند باہر نکل آئیں جن میں جلن اور کھجلی ہو جسے سرد پانی سے آبدست لینے پر آرام ہو تو ایلو مفید ہے۔ اس دوا کے مریض میں عموماً بجائے قبض کے پتلا پاخانہ ہوتا ہے اور بعض وقت ریاح کے ساتھ پاخانہ خارج ہو جاتا ہے۔

(۵) سخت قسم ہنض، پاخانہ دے کے ساتھ ہو، خونی بواسیر مسلسل

خون کا اخراج ہو مہرز اور مقعد میں لکڑیوں کا احساس ہو یا ریت بھری ہوئی معلوم ہو تو کولن سو نیا دینا چاہیے، بہت مفید ہے۔ حیض کے زمانہ میں مستورات کے لیے بوا سیری شکایت میں یہ دوا عمدہ کام کرتی ہے۔

(۵) بادی بوا سیر، مہرز میں ریت یا لکڑی بھرے ہونے کا احساس، پیٹھ میں درد جو کمر تک جائے اور جس کی زیادتی چلنے سے ہو، مستوں میں کھجلی اور جلن ہو، مستوں کا رنگ نیلگوں ہو، پاخانہ کے بعد کمر میں درد ہو، اور مہرز (کانچ) باہر نکل آئے تو ایسکولس دینا چاہیے۔ گویا پیٹھ اور کمر میں درد اور مہرز میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے بھرے ہونے کا احساس اس دوا کی رہنما کن علامات ہیں۔ یوں تو یہ بادی بوا سیر کی خاص دوا ہے مگر بعض وقت مستوں سے تھوڑا تھوڑا خون نکلنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے۔

(۶) اگر زچہ خانہ میں یا وضع حمل کے بعد بوا سیر کی شکایت ہو جائے جس میں کانچ باہر نکل آئے رحم اپنی جگہ سے گر جائے یا ایسا معلوم ہو کہ آلات تناسل باہر نکل پڑیں گے، مریضہ کو قبض بھی ہو تو پاڈوفا ٹلم عمدہ دوا ہے۔

(۷) خونی بوا سیر، زیادہ مقدار میں خون کا اخراج جس کا رنگ

سیاہی مائل ہو، مستوں میں شدت کا درد ہو تو ہامیلنس x ۳ دینا چاہیے۔

(۸) بادی بوا سیر جس میں آگ کی مانند جلن ہو، مریض کمزور ہو گیا

ہو، گرم پانی سے آبدست لینے پر آرام ہوتا ہے۔ بار بار تھوڑے پانی کی

پیاس ہوا بے چینی زیادہ ہو رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو تو آرسنک دینا چاہیے۔

(۹) بادی بوا سیر، جس میں متے انگور کے گچھے کی مانند بامہر نکل آئیں جو اس قدر ذکی احساس ہوں کہ کپڑے کا چھوا جانا بھی برداشت نہ ہو سکے۔

مستوں کا رنگ نیلگوں ہو جس میں صلبن اور دکھن اور پھوڑے کا سادرد ہو، پیشاب کرتے وقت کالچ بامہر نکل آئے تو میورٹیک ایسڈ بہت مفید ہے۔

(۱۰) خونی بوا سیر جس میں زیادہ مقدار میں چمکدار خون نکلے جس سے مریض پر کمزوری طاری ہو جائے تو اپیکاک یا فاسفورس دینا چاہیے اگر

یہ دونوں دوائیں ناکام ہو جائیں تو کلکیر یا کارب دیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دوا بھی فیل ہو جائے تو ہیلڈونا دینا چاہیے۔ اگر مریض میں سخت

کمزوری کے باعث بے ہوشی طاری ہونے کا اندیشہ ہو تو درمیان میں ایک آدھ خوراک چائنا کی دے دینا چاہیے۔

(۱۱) پایو کیمک میں کلکیر فلور اس مرض کی خاص دوا ہے دونوں قسم کی بوا سیر میں دینا چاہیے۔

(۱۲) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ ٹائٹریک ایسڈ۔ کالی کارب۔

سیپیا، پلسا ٹیلا۔ سلفیورک ایسڈ۔ کالی میور۔ گریفائٹس اور کاسٹکم وغیرہ اس مرض کی عمدہ دوائیں ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

پیش

DYSENTRY

اسباب :- خرابی معدہ و اسعا، آنتوں میں خراش ہو جانا، ثقیل اشیاء کے استعمال سے آنتوں میں سدے پڑ جانا، خراب پانی پینا، آتشک، ہیضہ، ملیریا وغیرہ کچے پھل کھانا، غلاظت اور گندگی اور آنتوں کی خشکی وغیرہ وغیرہ۔ علاوہ ازیں بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مرض متعدی ہے اور مریض کے پاخانہ و پیشاب کے ابخرات سے دوسروں کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ موسم کی خرابی بھی پیش کی ایک خاص وجہ ہوا کرتی ہے۔ موسم گرما میں لوگ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

علامات :- اس مرض میں پہلے دو ایک پتلے پتلے پاخانے ہوتے ہیں۔ پھر پاخانہ میں آؤں آنے لگتی ہے۔ بار بار پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ پاخانہ پھرتے وقت مریض کا نکھتا (زور لگاتا) ہے پاخانہ مروڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض وقت خالص آؤں یا خالص خون آتا ہے۔ کبھی پاخانہ میں آؤں اور خون دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پیٹ میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اینٹھن اور مروڑ ہوتا ہے خاص کر نان کے نیچے بائیں طرف درد معلوم ہوتا ہے۔ شدید حالات میں مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ نیند نداد ہو جاتی ہے اور کمزوری زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے۔ مزمن حالات میں سبز یا زرد رنگ کے دست

آنے لگتے ہیں جس میں خون کی کافی مقدار خارج ہوا کرتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے اور دیگر قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔

پرہیز و پدایات :- مقام درد پر سینک کریں۔ ثقیل اور باسی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ اگر سبب خشکی کے یہ مرض ہو گیا ہے تو تر چیزوں کا استعمال کرائیں۔ مونگ کی دال کا پانی، دہی و پیرا نے چاول۔ ملائم کھچڑی (تین حصہ مونگ کی دال مع چھلکا اور ایک حصہ پرانا چاول) بھنڈی کی ترکاری اور شورباد وغیرہ ہلکی غذا دینا چاہیے۔ مریض کو سرد پانی سے غسل نہ کرنے دیں۔

پھلوں میں کیلا، سنگترہ، انگور اور انار وغیرہ دیں لیکن سیب اور بہی سے پرہیز کرائیں۔ کیونکہ یہ پھل عموماً قبض پیدا کر دیتے ہیں اور اُن سے ریاح کی تولید زیادہ ہوتی ہے۔

علاج :- اس مرض کی چوٹی پر کی دوائیں حسب ذیل ہیں :-
مرک سال۔ مرک کار نکس دامیکا۔ اپیکاک۔ سلفر۔ اکونائٹ،
پلسا ٹیلا۔ ایلو اور فاسفورس۔

(۱) ابتدائی حالت میں اگر مریض کو پیچش کے ہمراہ بخار بھی ہو تو اکونائٹ کی چند خوراکیں کافی ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایک خوراک سلفر کی دیدینا چاہیے۔ اگر مرض بالکل دور نہ ہو جائے تو پھر اکونائٹ کی چند خوراکیں دے کر آخر میں ایک خوراک سلفر کی دیدیں۔

(۲) اگر پہلی دونوں ادویہ کے استعمال کے باوجود آؤں کا آنا موقوف نہ ہو تو مرک سال کا نمبر ہے۔ اس دوا کی خاص علامت یہ ہے کہ پاخانہ میں آؤں کے ساتھ ساتھ کسی قدر خون بھی پایا جاتا ہے، تو لمبی قسم کا درد ہوتا ہے اور مریض کو دفع حاجت کے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی اور پاخانہ ہوگا لیکن اگر شدید قسم کی پھیش ہو جائے اور پاخانہ میں خون کی مقدار زیادہ ہو یا محض خون ہی خون آنے لگے تو مرک کار بہترین دوا ہے۔ یہ دونوں دوائیں موسم گرما کی پھیش میں خصوصیت سے کام آتی ہیں۔ مرک مریض پاخانہ کے لیے قدمچہ پر بیٹھا برابر زور لگایا کرتا ہے۔

(۳) تھوڑا تھوڑا پاخانہ آؤں اور خون کے ساتھ ہو۔ پاخانہ کی بار بار حاجت ہو، پاخانہ کے بعد سکون اور راحت ہو جائے، پیٹ میں مروڑ ہو۔ سہلہ کی خرابی اور بد پرہیزی سے یہ شکایت ہوگئی ہو تو نکس دایمکا دینا چاہیے۔ کثرت مے نوشی سے اگر پھیش ہو جائے تو نکس دایمکا اکثر و بیشتر حالات میں مفید ہے۔ نکس کا مریض پاخانہ میں دیر تک نہیں بیٹھا کرتا۔

(۴) اگر آؤں سبز رنگا کی ہو اور خون کی مقدار بھی کافی ہو مریض کو غذا سے نفرت ہو۔ نیز متلی اور قے کی شکایت ہو تو اپیکاک دینا چاہیے۔ جاڑے کے موسم میں عموماً پھیش میں اپیکاک کی علامات پائی جاتی ہیں۔

(۵) اگر ثقیل اور مرغن اشیاء کے کھانے سے پھیش ہوگئی ہو، زبان پر زرد میل ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ پیاس نہ ہو اور پاخانہ میں آؤں اور خون دونوں پائے جاتے ہوں۔ رات کو تکلیف خاص طور پر بڑھ جاتی ہو۔

تو پلسا ٹیلا مفید ہے -

(۶) مزمن پیمپش میں یا بواسیر والے مریضوں کے لیے جبکہ پیٹ میں
وٹھن ہو اور درد کی وجہ سے ایسا معلوم ہو کہ اندر چھل گیا ہے - پاخانہ
آنے سے مروڑ بند ہو جائے لیکن آؤں اور خون نکلتا رہے تو سلفر دینا
چاہیے - سلفر کا مریض پاخانہ کے لیے قدمچہ پر برابر زور لگایا کرتا ہے -

(۷) پیمپش میں ریاچ کے ساتھ پاخانہ ہو جائے اور مریض کو علم نہ ہو -
بواسیری سے باہر نکلے ہوئے ہوں مقعد میں جلن ہو، پیٹ میں ایسی
گھڑ گھڑاہٹ ہو گویا کوئی بوتل خالی کر رہا ہے تو ایلو دینا چاہیے -

(۸) شدید اور ترقی شدہ پیمپش میں جبکہ مریض نڈھال ہو جائے،
ہاتھ پاؤں سرد ہو جائیں، قوت جاتی رہے بلا درد کے پیمپش ہو، پاخانہ
کے بعد مقعد کھلی رہ جائے گویا مفلوج ہو گئی ہے، مریض ٹھنڈا پانی مانگے
جو عمدہ میں گرم ہو جانے کے بعد قے ہو جائے تو فاسفورس عمدہ دوا ہے -

(۹) بایو کیمک میں فیرم فاس اور گنیٹشیا فاس $\times$ ۶ باری
باری دینا چاہیے -

(۱۰) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کاربودج، رشاکس، کالی بانی
چائنا، آرسنک، پٹیشیا، بیلاڈونا، سیکیل اور پاڈو فائلم عمدہ دواؤں
میں سے ہیں

ہرنیا (فتق)

HERNIA

فتق کے لغوی معنی ہیں پھٹ جانا۔ یہ ایک مرض ہے جس میں پردہ صفاق کے پھٹنے سے یا کنج مان کے کشادہ ہو جانے سے کوئی چیز مثلاً آنت، چربی، پانی یا ریح فوطوں میں اتر آتی ہے۔

اسباب :- جن میں فوطوں کی تھیلی میں خصلوں کا دیر سے اترنا، عضلات اور دیوار ہائے شکم اور کنج مان کا نازک ہونا، آنتوں پر کے چربی کے پردے کا غیر طبعی طور پر لمبا ہونا، پیٹ پر چوٹ لگنا، وزنی چیز کو بجایک اٹھالینا۔ قبض یا دقت سے پیشاب ہونے کی حالت میں رفع حاجت یا پیشاب کے لیے زور لگانا، دیوار ہائے شکم کا ڈھیلا یا بڑھانا۔ بوڑھے لوگوں میں پیٹ نکل آنے کی حالت میں شدید کھانسی کا آنا، پیٹ میں زیادہ چربی ہونے کی وجہ سے احتشاء شکم پر دباؤ پڑنا وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں فوطے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے۔ مثلاً آبی الجھی اور رمی وغیرہ۔ اس کے علاوہ بلحاظ مختلف مقامات وقوع کے ہرنیا کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً چڑے کا ہرنیا۔

پیٹ کا ہرنیا ————— معدہ کا ہرنیا ————— آنت کا ہرنیا —————

چربی کا ہرنیا ————— ران کا ہرنیا ————— فوطہ کا ہرنیا وغیرہ وغیرہ

ہر قسم کے ہرنیا یعنی فتق میں کم و بیش درد پایا جاتا ہے۔

تشخیص :- اگر فوطوں میں پانی اُتر آیا ہو تو اس کو ہلا کر معلوم کریں۔

اس میں عموماً مریض کو تھوڑا تھوڑا پیشاب ہوتا ہے اور مارچ یعنی میٹری سے دیکھنے پر فوطوں کے آ رہا رد کھلائی دیتا ہے کیونکہ پانی شفاف ہوا کرتا ہے۔ آبی اور لحمی فتق گھٹتے نہیں ہیں بلکہ قائم رہتے ہیں یا رفتہ رفتہ بڑھتے جاتے ہیں۔ آنت اُتر آنے کی حالت میں عموماً رات کو سوتے وقت آنت اوپر چڑھ جایا کرتی ہے اور فوطوں میں درم یا گرائی نہیں رہتی۔ ریح اُترنے کی حالت میں دبا کر دیکھنا چاہیے۔ دبائے سے قراقر کی آواز ریح کی خاص شناخت ہے۔

پرہیز و ہدایات :- پانی اُترنے کی حالت میں مریض کو پانی کم پینا چاہیے فتق کے مریض کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد چت نہ سوئے اور ہر وقت گدی باندھے رکھے یا پٹی کا استعمال کرے جو اس مقصد کے لیے بازار میں ملتی ہیں۔ کھانسی پیدا کرنے والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ بادی، ثقیل اور نفاخ اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ نرم اور زود ہضم چیزیں استعمال میں لائیں۔

بیٹنی لگانے سے پہلے مریض کو چت لٹا کر اور ٹانگیں سکیر کر فتق کو اندر جانے دیں۔ اگر وہ خود سے نہ جائے تو ہاتھ سے نہایت آہستگی کے ساتھ اندر کو داخل کریں اگر یہ عمل بھی کارگر نہ ہو اور مریض درد کے مارے بے چین ہو رہا ہو تو مریض کو گرم پانی میں بٹھا کر آہستہ آہستہ اندر کو دبائیں۔ اندر داخل ہو جانے پر سچی باندھ کر یا پٹی لگا کر اوندھا لیٹنے کی ہدایت

کریں۔ اگر درمی کیفیت پیدا ہو جائے تو مریض کو قطعی حرکت نہ کرنے دیں۔ اس کے مریض کو دست آور دوا کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شدید قبض کی حالت میں آب گرم سے انیما لیں۔

علاج :- بچوں میں آنت اُترنے کی حالت میں کلکیریا کا رب نمبر ۲۰ عمدہ دوا ہے۔ کلکیریا کی دیگر علامات کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔
(۲) داہنی طرف کے ہرنیا میں جب سوئیوں کی ٹچھن کا سادرد ہو، ریاچ پیٹ بھر میں گھومتے معلوم ہوتے ہوں تو لائیکو پوڈیم نہایت عمدہ دوا ہے۔

(۳) اگر کوئی سخت چیز اٹھانے سے آنت اُتر آتی ہو۔ کمر کے مقام پر لیٹھن کا سادرد ہو تو رسٹاکس دینا چاہیے۔
(۴) ہر قسم کے ہرنیا میں نکس و امیکا ایک مفید دوا ہے۔ اس کا مریض صبح اٹھنے پر شکم کے اندر کمزوری محسوس کرتا ہے۔ بچوں کے فرق میں بھی یہ دوا عجیب و غریب کام کرتی ہے۔ اگر نکس و امیکا فیل ہو جائے تو کوکولس انڈیکا دینا چاہیے۔

(۵) اگر بائیں جانب کی آنت اُتر آئی ہو تو کلکیریا فاس مفید ہے۔
(۶) حاد کیفیت میں اکثر پلیم بہت عمدہ کام کرتا ہے جبکہ اعصاب اپنا صحیح فعل نہ کرتے ہوں۔ آنتوں میں بے حسی اور قبض ہو۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ تھو جارا، روڈو، ڈنڈرن، سپاسٹیل، کلچٹس، لیکسیس، سلفیڈرک ایڈ، سلفر اور زینکم نہایت اہم ادویہ ہیں۔

خون کی قے

HAEMATEMESIS

اسباب :- ورم معدہ، معدہ میں زخم، معدہ میں سرطان، جگر کا سکڑ جانا، مستورات کا خون حیض بند ہو جانا، بواسیری خون کا رگ جانا، ہائی بلڈ پریشر، مرض سکروسی، تکلیفات قلب اور چوٹ وغیرہ۔

علامات :- معدہ پر جلن یا سوئیوں کی سی ٹچھن ہوتی ہے۔ خون کبھی مقدار میں زیادہ اور کبھی کم قے کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض اوقات منجمد خون کے ٹکڑے یا غلیظ خون نکلتا ہے۔ کبھی نہایت چمکدار اور رقیق شکل کا ہوتا ہے۔ اکثر غذا کے ساتھ ملا جلا خون نکلتا ہے۔ خالص خون کا زیادہ مقدار میں آنا ایک خطرناک علامت ہے۔

تشخیص اور تفریق :- (نیز اس کے لیے دیکھو مرض سل کے تحت میں) خون کی قے اور خون تھوکنے میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ معدہ سے خون بذریعہ قے خارج ہوتا ہے اور اس کا رنگ عموماً سیاہی مائل ہوا کرتا ہے اور اس میں کسی قدر غذا ملی ہوئی ہوتی ہے۔ مقام معدہ پر درد، گرمی اور جلن کا احساس ہوتا ہے۔ خون تھوکنا ایک علیحدہ مرض ہے جو مرض سلی، امراض حلق، حنجرہ، شدت گرمی، کثرت درزش وغیرہ سے ہو جاتا ہے اور سینہ میں درد ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- خون کی قے کا ہونا بعض اوقات ایک خطرناک

صورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے علاج اور تدارک میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ مریض کو حرکت نہ کرنے دیں، بلکہ آرام سے فوراً چست لٹا دیں۔ شدید حالات میں برف کو کوٹ کر کپڑے میں لپیٹ کر معدہ پر رکھیں۔ غذا قطعی طور پر بند کر دیں اور بذریعہ انچا غذائی مریض کی پرورش کرتے رہیں۔ اگر مریض کو قبض ہو تو گلیسرین سپازمیری سے پاخانہ کرا دیں۔ اس مرض میں ۲۴ گھنٹے تک سوائے ٹھنڈے پانی یا دودھ کے اور کوئی غذا نہ دینا چاہیے۔ جب قے بالکل رک جائے تو رفتہ رفتہ دیگر زود ہضم اور سبک اشیاء دینا چاہیے۔

علاج :- (۱) خون کی قے جس کا رنگ سرخ ہو تو اپیکاک دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں اس کی خوراکوں کو جلد از جلد دہراتا چاہیے۔ عجیب المنفعت دوا ہے۔

(۲) اگر خون کا رنگ سیاہ ہو، مریض میں بے چینی، گھبراہٹ اور کمزوری زائد ہو۔ جسم ٹھنڈا ہو گیا ہو تو آرسنک نہایت عمدہ دوا ہے۔ چند خوراکوں سے سکون ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آرسنک فیل ہو جائے یا آرسنک پلوٹ طور پر شفا دینے سے قاصر رہے تو کاربودج دینا چاہیے۔

(۳) اگر چوٹ کے باعث خون کی قے ہونے لگے تو آرنیکا مفید ہے۔ لیکن کورنیکا میں عموماً کھانسی کے ساتھ خون آنا پایا جاتا ہے۔

(۴) بوا سیر میں مبتلا شدہ یا معدہ کی شکایت والے مریضوں کو اگر خون کی قے ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۵) اگر قے مقدار میں کم ہو لیکن خون کا رنگ نہایت چمکدار سرخ ہو، مریض کا چہرہ تنہا یا ہوا ہو تو بیلا ڈونا مفید ہے۔
 (۶) اگر بلڈ پریشر کے باعث خونی قے ہو تو اکونائٹ یا گلوٹائٹ دینا چاہیے۔

(۷) اگر قلبی تکلیف کے باعث خون کی قے ہو تو ڈیجیٹلس یا آرسنک مفید ہے۔

(۸) باپوکیک میں فیرم فاس اور کلیریا فاس یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔ اگر مریض پر غشی طاری ہونے لگے تو کالی فاس کی بھی چند خوراکیں دیدینا چاہیے۔

(۹) ان ادویہ کے علاوہ ہامیلس، فاسفورس، بیلا ڈونا اور پلساٹیلانہایت اہم دوائیں ہیں اگر مندرجہ صدر تمام ادویہ میں بھی پوری علامات نہ ملتی ہوں تو سیکیل، کنولیریا، لیکسیس، ورٹرم، چائنا اور ہیڈیمس وغیرہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

حکلی

HIE COUGH

اسباب :- بد ہضمی خشکی، جگر میں درم کا ہونا، کثرت مطالعہ، غلیظ ریاح کا پیدا ہونا، گرم گرم چیزیں کھانا وغیرہ۔ عموماً یہ مرض

غلط ریاح کی پیدائش کے باعث ہوتا ہے جن کو دفع کرنے کے لیے
معدہ کو شش کرتا ہے جس سے ایک قسم کی تشنجی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
بعض اوقات جگر میں درم کے باعث رطوبت پیدا ہو کر معدہ میں
چپک جاتی ہے جو اچکی کا موجب بنتی ہے۔ علاوہ ازیں دیر تک پانی
نہ پینے کی حالت میں بھی بعض وقت اچکی آنے لگتی ہے شدید امراض
میں اچکی آنا ایک بُری علامت ہے۔ تزع کی حالت میں اچکی آنا موت کا
پیغام ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر بطنی کے باعث اچکی آتی ہو تو
مریض کو گرم پانی اور نمک سے قے کرا دیں دیر تک سانس روکنے یا
لمبی سانس لینے سے بعض وقت اچکی بند ہو جاتی ہے۔ چھینک لینے
سے یا مریض کو دفعہ کسی ہولناک خبر سے ڈرایا جائے تو بھی اچکی اُڑک جایا
کرتی ہے۔ اکثر دو چار گھنٹہ سرد پانی پی لینے سے فوراً فائدہ ہو جاتا
کرتا ہے۔ اگر پانی سے فائدہ نہ ہو تو برت چوسنا چاہیے اور معدہ کے
مقام پر بھی برت رکھنا چاہیے۔ فائدہ ہونے کے بعد چند روز تک
مریض کو شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھانا چاہیے۔ ہلکی اور زود ہضم اشیاء ہر
اکتفا کرنا چاہیے۔

علاج :- (۱) اچکی کی سب سے عمدہ دوا سیلابوٹا ہے خواہ وہ
اعصابی ہو یا درمی۔ اس کے نیل ہو جانے کے بعد سفیورک ایسڈ یا
مانڈر دیاتک ایسڈ کی طرف توجہ کریں۔

(۲) اگر ہچکی کئی دن تک آتی رہے جس کے ساتھ متلی بھی پانی اُجائے یا کونین کے بیجا استعمال کے بعد یہ شکایت لاحق ہو گئی ہو تو نیشترم میو ر دینا چاہیے۔

(۳) اگر بغیر کسی ظاہری سبب کے ہچکی آنے لگے یا زیادہ کھانے اور ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے ہچکی آئے تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔
(۴) اگر ہیفضہ کے مریض کو ہچکیاں آنے لگیں جس کے ساتھ تے اور تشنچ بھی پایا جائے تو کیو پرم کا دینا عجیب المنفعہ ثابت ہوتا ہے۔

(۵) اگر مستورات کو حمل کے دوران میں ہچکیاں آنے کا مرض ہو جائے تو کریا زوٹ دینا چاہیے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو سائیکلیمن دیں۔
(۶) اگر ہچکیوں کی آواز بہت کراخت اور بہت زور کی ہو تو سائیکوٹا بہت مفید ہے۔

(۷) بائیو کیمک میں گنیشیا فاس اس مرض کی سب سے عمدہ دوا ہے۔
(۸) اگر علامات نہ ملنے پر دوا کا صحیح انتخاب نہ ہو سکے تو سنا موئم مدر پھر کے پانچ قطرے ملک شوگر یا سادی شکر میں ملا کر دیدینا بہت مفید ہے۔
(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ وریٹرم الیم، جلسیم، کار بودج، لارڈ سیریس، آرٹنک اور ہیوسمس عجیب و غریب دوائیں ہیں۔ ان کے بعد کالجیکیم، ہائڈروسیانک ایسڈ، مشک، اگنیشیا اور پلسا ٹیلا وغیرہ ہیں۔
حسب علامت دینا چاہیے۔

ہشتم

امراض جگر و طحال

استسقاء - جلد ہمر

DROPSY

اسباب :- وریدی دوران خون کا مسست ہو جانا، سردی لگنا یا بھیگ جانا، خونی بوا سیر یا حیض کے زیادہ جلدی ہونے سے جگر کے مزاج کا بار د ہو جانا، ضعف طحال، ضعف معدہ، ضعف جگر، ضعف گردہ کثرت سے پانی پینا، کمی خون اور دل کے دہانوں کے کواڑوں کا ماؤن ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔

در اصل استسقاء بذات خود کوئی مرض نہیں بلکہ بعض امراض کی علامت ہے۔ عام طور سے جگر کی خرابی اور اس کے مزاج کا سرد ہو جانا اس بیماری کی خاص وجہ ہوا کرتی ہے اس کے علاوہ دل اور گردہ کی تکالیف سے بھی یہ شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض میں پیٹ کے اندر پانی آ جاتا ہے یعنی
اعضاء اندرونی کی آبی جھلیوں کے جوڑوں میں آب خون تراوش پا کر
مجموع ہوتا رہتا ہے۔ پیٹ ڈھول کی مانند پھول جاتا ہے۔ اگر مریض کو
چت لٹا کر اس کے پیٹ کو بجا کر آواز سنیں تو پیٹ کے ہر دو جانب
پانی کی موجودگی معلوم ہوتی ہے اور طبل کی سی آواز نکلتی ہے۔ پیٹ کا
چمڑا صاف اور تنہا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پیشاب پاخانہ کم ہوتا ہے، پیاس، اچھاری
اور بے چینی زیادہ ہوتی ہے۔ ذرا سا کھالینے سے فوراً اچھار پیدا ہو جاتا ہے جس سے سخت
پریشانی ہوتی ہے۔ ہاتھ سے پیٹ کو دبانے سے پانی کی تھپک محسوس ہوتی ہے۔
نوٹ :- یہ بڑا موذی مرض ہے۔ بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ فائدہ
ہو جانے کے بعد عموماً پھر سال دو سال کے بعد ہو جاتا ہے شدید حالات میں
مریض کی جان لے کر جاتا ہے۔

دل یا پھیپھڑوں کی خرابی سے جب استسقا ہوتا ہے تو پہلے مریض
کے پاؤں پر درم آتا ہے جو بعد میں اوپر کو جا کر پیٹ اور تمام جسم میں
پھیل جاتا ہے۔ اگر جگر کی خرابی سے یہ مرض ہوتا ہے تو پہلے پیٹ پر
درم آتا ہے اور بعد میں پاؤں پر۔ گردوں کی خرابی میں آنکھوں کے
پونے اور چہرے پر درم آتا ہے۔ بعض حالات میں پاؤں بھی متورم
ہو جاتے ہیں مگر چلنے پھرنے سے یہ درم کم ہو جاتا ہے اور لیٹے رہنے سے
بڑھ جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- معالج کو مرض کی اصل وجہ دریافت کر کے

اسی کے مطابق پرہیز بتلانا چاہیے۔ پانی کو جوش دے کر سرد کر کے دینا چاہیے۔ اونٹ کا دودھ اس مرض کے لیے نہایت عمدہ غذا ہے۔ اگر پانی اور غذا کے بجائے اسی پر اکتفا کیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ مولی یا لکڑی بھجیا یا مرغ یا بیٹر کا شوربا (بغیر گھی کے) گرم مسالہ ڈال کر دیں۔ اور جہاں تک ہو سکے کھانا اور پانی کم دیں۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اس مرض میں مضر ہے۔ چاول، دہی اور دیگر سرد اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ گرم اور خشک چیزوں پر اکتفا کریں۔

علاج :- (۱) میں نے کئی کیسوں میں اسٹرومنٹس، شکم کے پانچ قطرے فی خوراک دن میں تین بار دے کر نہایت عمدہ نتائج حاصل کیے ہیں۔

(۲) اگر استسقاء کے مریض کو دل کی کمزوری ہو۔ پیشاب بہ کثرت ہوتا ہو بلکہ بعض وقت اند خود ہو جاتا ہو، پیاس زیادہ ہو، نبض کمزور ہو، کمزوری بڑھ گئی ہو، چہرہ بھر بھرا یا ہوا ہو، مریض سے لیٹا نہ جاتا ہو تو ایپوسائٹم x دینا بہت مفید ہے۔

(۳) اگر دل کا فعل بے قاعدہ اور کمزور ہو گیا ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں پرورم ہو جس میں انگلی سے دبائے سے گڑھا پڑ جائے، پیشاب کی حاجت تو زیادہ ہو مگر پیشاب کم آتا ہو یا بند ہو گیا ہو تو ڈیجیٹلس دینا چاہیے۔

(۴) اگر جگر کی خرابی سے یا کثرت سے ناشی سے استسقاء ہو گیا ہو

پیشاب پاخانہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہو تو نکس دینا چاہیے۔

(۵) اگر چوٹوں میں سوجن ہو، گردہ یا دل کی خرابی سے استسقاء،

پیشاب میں البیومن کی زیادتی اور جسم کے بعض حصوں میں غیش زنی کے
سے درد کی حالت میں ایسپس نہایت عمدہ دوا ہے۔

(۶) اگر ایسپس، ایپوسائٹم یا سمبوس وغیرہ ادویہ فیل ہو جائیں اور

مریض کا پیشاب یا تو بالکل بند ہو گیا ہو یا بہت کم آتا ہو تو اکسانی ڈنڈرن

مدر ٹنکچر کے پانچ قطرے تازہ پانی میں ملا کر دن میں تین بار دیں نہایت مفید ہے۔

(۷) بایو کیمک میں کالی میوہ اس مرض کی خاص دوا ہے۔ کمزوری

کی حالت میں اس کو کالی فاس کے ساتھ ملا کر یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۸) مندرجہ بالا ادویہ کے علاوہ آرسنک، اکونائٹ، سلفر، لائیکو،

کاپچیکم، فلورک ایڈ وغیرہ نہایت اہم دوائیں ہیں۔

دردِ جگر

BILIARY COLIC

اسباب :- امراضِ جگر، مرارہ میں صفراوی پتھریوں کا پیدا

ہو جانا، پتہ میں ورم، دائمی قبض، کثرت سے نوشی و گوشت خوری وغیرہ

عموماً یہ مرض پتہ میں پتھریوں کی پیدائش ہی سے ہوا کرتا ہے۔

علامات :- جگر کے مقام پر یعنی دائیں طرف کی سپلیوں کے نیچے

نہایت شدید درد ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض مانند ماہی بے آب
 رہنے لگتا ہے۔ درد کی ٹیس داسے کندھے تک جاتی ہے بعض اوقات
 پیٹھ تک درد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ درد نیچے کو نہیں جایا کرتا۔ درد کی
 نوعیت تو لمبی ہوتی ہے۔ متلی، قے اور لرزہ و شیرہ ساتھ میں ہوتا ہے۔
 جگر میں پتھری کے باعث جب ایک بار درد ہوتا ہے تو وہ اکثر عود کر آتا
 ہے۔ شدید حالات میں مریض پر بے ہوشی تک طاری ہو جاتی ہے۔
 یہ مرض عموماً جوانی میں ہوتا ہے۔ اور دُبے پتلے لوگوں کے مقابلے میں
 موٹے آدمی اس مرض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- درد کے دورہ کی حالت میں مریض کو آرام
 سے لٹائے رکھیں اور درد کے مقام پر سینک کر دیں۔ غسل ہمیشہ
 تیز گرم پانی سے کریں۔ گوشت، انڈا، پھلی، شراب اور مٹھائی وغیرہ
 سے سخت پرہیز کریں۔ گھی کے بجائے روغن زیتون استعمال کریں۔
 اگر پانی کے بجائے سوڈا واٹر پییں تو بہت مفید ہے۔ ساگ پات
 سبز ترکاریاں اور میوہ جات کا استعمال زیادہ موزوں ہوا کرتا ہے۔

علاج :- (۱) اگر مریض درد سے تڑپتا ہو متلی اور کڑوے قسم کی
 قے ہوتی ہو یا سبز لسدار دست آتے ہوں درد نہایت شدید ہوتا ہو اور
 معلوم ہوتا ہو کہ جیسے آنتیں کھینچ کر یک جا ہو گئی ہیں تو کیو ملا دینا چاہیے
 دراصل یہ دوا اکثر و بیشتر حالات میں مفید ہوا کرتی ہے۔ اگر کیو ملا سکون
 دینے سے قاصر رہے تو کالوسنتھ دینا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کالوسنتھ بھی

فیل ہو جائے تو ڈائسکوریادینا از حد مفید ہے۔

(۲) اگر درد کاٹنے والا ہو اور جو چاروں طرف کو پھیلتا ہو یا اپنی جگہ بدلتا رہتا ہو، نفخ زیادہ ہو تو ڈائسکوریادینا چاہیے۔ پتہ کی پتھریوں کے لیے اس کو اہم دواؤں میں شمار کرنا چاہیے۔

(۳) اگر تمام ادویہ ناکام ہو جائیں اور مریض کی حالت ابتر ہو جائے، سبز قسم کی قے ہو اور مریض کی نبض نہایت کمزور یا غیر منتظم ہونے لگے۔ تو ڈیجیٹلس دینے کا وقت ہے۔

(۴) شدید درد، صفراوی قے، از حد کمزوری اور انٹین یا ہینچن کے سے شدید درد کی حالت میں آرسنک دوا جادو کا سا کام کرتی ہے۔

(۵) جب درد کی نوعیت تشنجی ہو، پتھری کے باعث درد ہوتا ہو یرقان کی بھی شکایت ہو درد یکایک آئیں اور تھوڑی جگہ پر اگر رک جائیں۔ تو بربرس ونگرس دینا چاہیے۔

(۶) صفراوی تو لنج، جگر کا مقام درد کے مارے چھوانہ جاسکے، قبض اور تغیر بہت زیادہ پایا جائے تو لائیکوپوڈیم دینا چاہیے۔

(۷) درد جگر کے لیے اگر علامات ملنے میں دشواری ہو تو کارڈس مدرٹنکچر کے دس قطرے فی خوراک دن میں تین بار دینا مجرب علاج ہے۔

(۸) باپوکیماک میں نیٹرم سلف عمدہ دوا ہے اس کو فیرم فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے دینا اور بھی مفید ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ بیلا ڈونا، چائنا، کوکولس،

ورٹیرم الیم، نکس و امیکا، کلکیریا، سلفر اور کاسٹم نہایت عمدہ
دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

ورم جگر

HEPATITIS

اسباب :- بخار آنا۔ بہت زیادہ کھانا، جگر پر چوٹ لگنا۔ مرض
پیش۔ کثرت شراب نوشی۔ مرغن اور مسالہ دار اشیاء کا کثرت استعمال۔
شدید قبض اور ملیریا کا زہر وغیرہ۔

علامات :- جگر میں ورم کی حالت میں مریض کو حرارت رہتی ہے۔
مریض کو لٹا کر اگر دائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے ہاتھ سے ٹولیں تو وہ
مقام کسی قدر سخت معلوم ہوتا ہے، نیز کسی قدر اونچا معلوم ہوتا ہے۔
چھونے سے درد ہوتا ہے۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے کبھی قبض ہوتا
ہے اور کبھی دست آنے لگتے ہیں طبیعت سُست اور کسلند رہتی ہے۔
آنکھوں میں خفیف سی زردی آ جاتی ہے۔ مریض کو بائیں کروٹ لیٹنے
سے تکلیف ہوتی ہے۔ شدید حالات میں لمبی سانس لینے یا کھانسنے سے
بھی درد معلوم ہوتا ہے متلی اور قے کی شکایت بھی لاحق ہو جاتی ہے۔
بعض اوقات ہچکیاں بھی آنے لگتی ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو رقیق اور پتلی غذا کھانے کو دیں۔

مقام درد پر سینک کریں۔ مونگ کی دال کا پانی، شوربہ، آتش جو اور دودھ وغیرہ ہلکی غذا دینا چاہیے۔ دیرم یا ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ شراب کا نام نہ لینا چاہیے۔

نوٹ: بعض اوقات ورم جگر بڑھ کر پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

علاج ۱۔ (۱) اگر جگر میں زخم کا سادرو ہوتا ہو۔ مقام جگر سخت اور سونپا ہوا ہو۔ جلد زرد ہو گئی ہو۔ بخار کی بھی شکایت ہو تو چائنا دینا چاہیے۔

(۲) جگر میں میٹھا میٹھا درد ہو۔ چہرہ کا رنگ زرد ہو، پاخانہ خشک ہوتا ہو تو چیلڈ و نیم مفید ہے۔ یہ دوا اس وقت اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے جبکہ یرقان کی بھی شکایت ہو اور پیشاب اور پسینہ زرد رنگ کا آتا ہو۔

(۳) اگر جگر بڑھ جائے اور مزمن شکل اختیار کر لے یا بخار رفع ہونے کے بعد مقام جگر میں درد اور دم قائم ہو جائے، درد سراور مثل کی شکایت ہو۔ معدہ خراب ہو گیا ہو تو نکس و امیکا عمدہ دوا ہے۔ اگر نکس و امیکا شفا دینے سے قاصر رہے تو سلفر دینا عقلمندی ہے۔

(۴) سوئیوں کی سی چھین ہوا بخار کم و بیش ہر وقت قائم رہے۔ منہ میں خشکی ہو، حرکت کرنے یا چلنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو تو براچی اونیا دینا چاہیے۔

(۵) اگر جگر متورم ہو اور اس میں پھوڑے کا سادرو ہوتا ہو، ہاتھ سے چھونا برداشت نہ ہو۔ لمبی سانس لینے میں مریض سخت تکلیف محسوس کرے، جگر پکنے کی طرف مائل ہو تو مرکب سال دینا مفید ہے۔ یرقان کی

شکایت بھی اسی دوا کے تحت میں آجاتی ہے۔

(۶) اگر جگر متورم ہونے کے بعد پکنے کا خدشہ پیدا کر دے تو لیکسیس دینا چاہیے۔ اگر لیکسیس ناکام رہے تو سلفر دینے سے خاطر خواہ فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۷) اگر یہ یقین ہو گیا ہو کہ جگر پاک رہا ہے تو لیکسیس اور ہیپر سلفر تجویز کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے یہ دونوں ادویہ مرض پر قابو نہ حاصل کر سکیں تو سلینیا اور کلکیریا کارب دینے کے بعد کسی دوسری دوا کی ضرورت بہت کم پڑتی ہے۔

(۸) با یوکیک میں اگر کلکیریا سلف $4 \times$ کی چند خوراکیں دیدی جائیں تو اس دوا سے پیپ کا بغنا بند ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو کالی سلف کے ہمراہ یکے بعد دیگرے دینا بہت مفید ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ لائیکو پوڈیم، سیپیا، آرسنک، کیمولا، اکونائٹ، بیلادونا اور کنیشیا میور نہایت عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامات دیں۔

خون کا پھیلا پڑ جانا

LEUKEMIA

اسباب :- لیمریا بخار کے اثرات مابعد، مرض انیمیا، بہت زیادہ

محنت و جانفشانی کرنا، کثرت تفکرات، امراض جگر و طحال، ہڈیوں کے گودے کی خرابی وغیرہ۔ عموماً بڑھاپے کے آغاز میں یہ مرض ہوا کرتا ہے۔
علامات :- یہ بیماری بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اس مرض میں چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ سرخ دانہائے خون بہت کم ہو جاتے ہیں، طحال اور جگر بڑھ جاتے ہیں۔ خون پتلا پڑ جاتا ہے۔ پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ یا ضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ روز بروز لاغری اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ اگر علاج میں تساہلی برتی گئی تو مریض چار پانچ برس کے بعد راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔ دراصل انیمیا کی شکایت جب حد کو پہنچ جاتی ہے اور طحال بڑی طرح ماؤف ہو جاتا ہے تو یہ مرض آدبا تا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو تفکرات سے دور رہنا چاہیے۔ صاف اور تازہ ہوا میں صبح و شام ٹہلنا چاہیے۔ شدید حالات میں کھلی ہوا میں مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں۔ غذا میں دودھ، آتش جوا، شوربا وغیرہ دیں۔ ثقیل اور دیرمضم غذا سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔

علاج :- اس مرض میں پہلے نیٹرم سلف، تھوجا، پیرک ایرڈ اور آرسنک کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ یہ چاروں دوائیں اس مرض کیلئے بہت کافی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ چاروں دوائیں حسب علامت دینے کے باوجود پورے طور پر شفا نہ دے سکیں تو پھر ارے نیا، کالی فاس، نیٹرم میور، کاربودج، کلکیریا، ٹاکٹرک ایرڈ اور کو نیم میں سے کوئی بھی دوا

حسب علامت دینا چاہیے۔

یرقان - کانور

JAUNDICE

اسباب :- درم جگر یا جگر کے فعل کا خراب ہو جانا، طحال کی خرابی، دائمی قبض، بد ہضمی، فاسفورس، سنکھیا، پارہ اور سیسہ کا زہر، نمونیہ، پتہ کی نالی میں صفراوی پتھری یا کسی دوسری شے کا پھنس جانا، صفراوی نالیوں کا بند ہو جانا (جس کی وجہ سے صفرا (پت) بجائے پتہ کی تھیل میں جمع ہونے کے خون کے ساتھ تمام جسم میں دوڑنے لگتا ہے)۔ بارہ انگشتی آنت کے سوراخ کا متورم ہو جانا یا بالکل بند ہو جانا وغیرہ۔

علامات :- اس مرض میں آنکھوں کی رنگت زرد ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ لب، چہرہ اور تمام جسم زردی مائل یا بھورا سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ پیشاب بھی بالکل زرد یا بھورا سیاہی مائل رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ جگر میں درد، متلی اور قبض کی شکایت رہا کرتی ہے۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ طبیعت کسل مند اور سست رہتی ہے۔ پاخانہ میلے اور مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ دن بدن کمزوری اور لاغری بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ مرض پرانا ہو جاتا ہے تو مریض کو ہر چیز زرد

دکھائی دینے لگتی ہے۔ ضعف، ہڈیان اور تشنج پیدا ہو جاتا ہے جو مریض کی جان لے کر جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو نہایت ہلکی اور زود ہضم اشیاء کھانے کو دیں۔ شوربا، مونگ کی کھجڑی، سبز ترکاریاں، آتش جو اور آب نخود وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ گرم اور نفاخ اشیاء سے سخت پرہیز رکھیں۔ شدید حالات میں دودھ میں سوڈا واٹر ملا کر دیں۔ افاقہ ہونے پر اُسی میں آتش جو شامل کر لیں۔ پھر رفتہ رفتہ نشاستہ دار غذا صحت ہو جانے پر دیں۔

علاج :- (۱) یرقان، جس میں تمام جس پر زردی آ جائے، بھوک نہ ارد، ڈکار اور متلی سہر بار کھانے کے بعد تکلیف بڑھ جائے جگر کے مقام میں درد ہو، پاخانہ مروڑ کے ساتھ ہو تو مرک سال بہترین دوا ہے۔ (۲) اگر آنتوں کا فعل سُست پڑ گیا ہو، کثرت مے نوشی اور چربی و مرغن اشیاء کے کثرت استعمال سے یا زیادہ کھانے سے یرقان ہو گیا ہو جس کے ساتھ کم دبیش بخار بھی پایا جائے۔ بد ہضمی اور قبض کی شکایت ہو، کھانے سے نفرت ہو گئی ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔ یہ دوا ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ موزوں ہو جاتی ہے جو ایسا پیشہ کرتے ہوں جس میں انھیں بیٹھے رہنا پڑتا ہو۔

(۳) اگر پاخانہ خشک اور قبض کے ساتھ ہوتا ہو، ہونٹ خشک ہوں، دبانے سے جگر میں درد ہوتا ہو، حرکت کرنے یا چلنے پھرنے سے

تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ کڑوے پت کی قے ہو، بخار کم و بیش موجود ہو تو برائی اونیا دینا چاہیے۔

(۴) غذا سے نفرت، متلی، کھانے کے بعد نفخ، یکے بعد دیگرے قبض اور دست، مٹی کے رنگ کے پاخانے یا دست، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، کمزوری زائد ہو تو چائنا مفید ہے۔ یہ دوا ان لوگوں کے لیے اور بالمثل ہو جاتی ہے جو رطوبات زندگی کو ضائع کر چکے ہوں یا جنھوں نے پارہ کا بیجا استعمال کیا ہو یا جن کو میسر یا بخار کے بعد یرقان نے کو پایا ہو۔ اگر کسی وجہ سے چائنا حاوی نہ ہو سکے تو مرگ سال دینا چاہیے۔

(۵) اگر مریض کی ہسٹری میں پتہ میں پتھری کا وجود پایا جائے، جگر میں دُکھن اور درد ہو، جگر متورم ہو گیا ہے، پاخانہ مٹیالے رنگ کا ہو اور دونوں شانوں کے نیچے کی ہڈی میں درد ہو یا محض داہنے شانہ میں درد پایا جائے، آنکھ کا رنگ زرد ہو گیا ہو تو چیلڈ و نیم 1×1 یا 3×3 دینا چاہیے۔

(۶) اگر بوڑھی عورتوں کو حیض بند ہو جانے کی حالت میں یرقان ہو جائے جو نہایت شدید اور تھلک قسم کی علامات پیدا کرے تو لیکسیس دینا مفید ہے۔

(۷) اگر غیر منظم اور بدبودار پاخانہ ہوتا ہو، بے چینی، کمزوری اور موت کا خود مریض میں موجود ہو بار بار پیاس معلوم ہوتی ہو، آنکھ میں زردی آجائے تو آرسنک دینا بہت مفید ہے۔

(۸) نہایت شدید سیاہ رنگ والا یرقان، استسقاء اور پیروں میں ورم، پیشاب کا رنگ بھورا ہو تو منسی نیلا دینا چاہیے۔
 (۹) اگر علامات کے غلط ملط ہو جانے کے باعث دوا کے انتخاب میں دشواری ہو تو کارڈس مریانس مدرٹشکچرفی خوراک دس قطرہ دن میں چار بار پلانا چاہیے۔

(۱۰) باپوکیماک میں نیٹرم سلفٹ اس مرض کی خاص دوا ہے۔
 اس کو کالی میوور کے ہمراہ باری باری دینا زیادہ مفید ہے۔
 (۱۱) مندرجہ بالا ادویہ کے علاوہ کیمو ملا۔ بیلا ڈونا، پاڈوفائلیم، فاسفورس، ڈیجیٹلیس، ہائڈراسٹس، پلسلا ٹیلا، سلفر اور لائیکو نہایت عمدہ دوائیں ہیں حسب علامت دیں۔

تلی کا بڑھ جانا

ENLARGEMENT OF SPLEEN

اسباب :- عموماً ملیریا (جاڑا بخار) میں بے ترتیبی سے پانی پینے سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ تلی کی ساخت کی خرابی سے یہ شکایت بھی ہو سکتی ہے۔

علامات :- تلی چھونے سے سخت معلوم ہوتی ہے اور بائیں سپلیوں کے نیچے ٹوٹنے سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض حالات میں تلی میں درد بھی

ہوتا ہے ، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے ، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے ۔
 مریض دن بدن دُبلتا جاتا ہے ۔ کیونکہ اس کے باعث جگر کا فعل
 بھی سست ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کم پیدا ہوتا ہے ۔ شدید
 حالات میں تلی تمام پیٹ کو چھاپ لیتی ہے ۔ جس کے علاج میں کافی
 وقت لگ جاتا ہے ۔

برہیز و ہدایات :- قابل اور ثقیل اشیاء سے پرہیز شد ضروری
 ہے ۔ میٹھی اشیاء کا استعمال بھی مضر ہے ۔ دودھ ، مونگ کی کھجڑی
 اور سبز ترکاریاں استعمال میں لائیں ۔ صاف اور کھلی ہوا میں مریض کو
 رکھیں اگر ضرورت سمجھیں تو تبدیل آب و ہوا کے لیے کسی عمدہ مقام پر
 مریض کو لے جائیں ۔ پھلوں میں پپیتہ اس کے لیے خاص چیز ہے ۔
 پانی ہمیشہ لوہے کا بچھا ہوا پیئیں ۔ اس مرض میں نیا چاول اور سوہدھی
 چیزیں نقصان کرتی ہیں ۔

علاج :- (۱) ورم طحال میں سنو تھس امریکانہ مدر ٹیکچر فی خوراک
 دس قطرہ دن میں چار بار پینا چاہیے ۔ اس دوا کو خارجی طور پر بھی
 لگانا چاہیے ۔ ٹیکچر کی شکل میں ہونے کی وجہ سے اس کو قریب قریب
 تمام علامات پر دے سکتے ہیں ۔ اگر تلی بہت زیادہ بڑھ گئی ہو جو ناف تک
 پہنچ چکی ہو ۔ مریض کو بائیں کروٹ لیٹنے میں تکلیف ہوتی ہو تو اس دوا کو
 پونٹسی میں دینے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں ۔

(۲) اگر طحال میں ورم ہو اور باری سے طیر یا بخار بھی آتا ہو ،

مریض کمزور ہوتا جاتا ہو۔ پھرہ اور تمام جسم زرد ہو گیا ہو تو چائنا مفید ہے۔
 (۳) اگر ملیریا بخار کے بعد طحال بڑھ جائے اور اس میں درد ہوتا ہو،
 یا سوئیوں کی سی چھین ہوتی ہو تو چائنا سلف مفید ہے۔ استثنائی کیفیت
 میں اس کا اثر اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔

(۴) اگر مندرجہ صدر ادویہ ناکام رہیں یا علامات صحیح نہ مل سکیں تو
 اسپرٹ گلنڈیم کرکس دس قطرہ فی خوراک ہر ۳ گھنٹہ بعد دیں۔ تلی خواہ حاد ہو
 یا پرانی اس کے چند یوم کے استعمال سے اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ تجرب ہے۔
 (۵) اگر تلی میں چیٹ کی وجہ سے درد ہو، مریض کو نرم بستر بھی سخت
 معلوم ہو تو آرنیکا مفید ہے۔

(۶) باپو کیماک میں فیرم فاس مفید ہے۔ مژمن حالات میں کالی میور
 کے ساتھ باری باری دینا چاہیے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ نیٹرم میور، آرسنک اسلفر اور
 کیسپکم نہایت اہم اور عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

پیشاب

امراض گردہ و مثانہ

(مفصل خارجی علاج کے لیے دیکھو کتاب مخزن خارجی علاج)

پیشاب بند ہو جانا

RETENTION OF URINE

اسباب :- سوزاک ، پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کا ہونا، پرائیٹ
گلینڈ یعنی غدہ قدامیہ کا ورم، ورم گردہ، ورم مثانہ، مثانہ کا ڈھیلا ہو جانا،
گردہ یا مثانہ میں کسی سدہ کا یا زائد گوشت کا پیدا ہو جانا، بواسیری
ستے، عورتوں میں خصیتہ الرحم کے امراض اور ہسٹیریا وغیرہ بعض وقت
پیشاب کو عرصہ تک روکے رہنے سے بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔
علامات :- اس مرض میں پیشاب مشکل سے آتا ہے یا بالکل

بند ہو جاتا ہے۔ پرانے سوزاک میں جوانوں یا بوڑھوں کو پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کی وجہ سے پیشاب رک رک کر آتا ہے اور پیشاب کی دھار بہت باریک ہو جایا کرتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر پیشاب خارج نہ ہوتا ہو تو مریض کو دس پانچ منٹ تک گرم پانی میں بٹھا دیں یا شورہ قلمی پانی میں حل کر لیں اور اس میں کپڑا تر کر کے پیرو پر رکھیں یا ٹنکچر کیفرناٹ کے اوپر لگائیں۔ پتھری یا درم کی صورت میں اصل مرض کا علاج کریں۔ (ہیضہ میں بھی پیشاب بند ہو جاتا ہے جس کا علاج دیکھو اپنے موقع پر)۔

علاج :- (۱) پیشاب رک جانے میں سبب سرد ٹنکچر فی خوراک پانچ سے دس قطرہ ہر تیسرے گھنٹہ دینا بہت مفید ہے۔ اس کو ۳x یا ۶x طاقت میں بار بار دہرانے سے بھی عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ (۲) اگر دونوں گردوں میں جلن اور درد ہو۔ پیشاب کھولتا ہوا اور قطرہ قطرہ ہوتا ہو، یا مثانہ میں سوزش ہو اور پیشاب جلن کے ساتھ ہوتا ہو تو کینتھرس بہت مفید دوا ہے۔

(۳) دامنے گردے سے لے کر کوٹھے تک جلن ہو، رات کو کئی بار پیشاب جلن کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ہو، پیشاب کا رنگ سیاہ یا خون آئینہ ہو تو ٹرنٹھنا بہت مفید ہے۔

(۴) سوزاک کے دب جانے سے یا غلط علاج سے اگر پیشاب کی تکلیفات رونما ہوں۔ پیشاب کے اختتام پر آخری قطرہ پر سخت

درد ہو تو تھو جا مفید ہے۔ اگر تھو جانا کام رہے تو میٹھو در نیم دیں۔

(۵) کمر میں درد، پیشاب دقت سے ہو جس میں نیچے سرخ پنچھٹ بیٹھ جائے تو لائیکو پوڈیم دینا چاہیے۔

(۶) شدید بے چینی، بار بار پیاس، پیشاب میں تکلیف، پیشاب جلن کے ساتھ مشکل سے ہو تو آرسنک مفید ہے۔

(۷) دیگر ادویہ جو مفید ہیں وہ کیو پریم، سیپیا، وریٹرم البم، کالوسنتھ، سٹرامونیم اور سیلا ڈونا ہیں اگر یہ ادویہ بھی کافی نہ ہوں تو پھر ڈیجیٹلیس، سیکیل، کوکس کیکٹائی اور ہیوسمس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

پیشاب کا زہر

URAEMIA

اسباب :- گردوں کے فعل کا خراب ہو جانا، گردہ اور مثانہ کی درمیانی نالی میں رکاوٹ، مثانہ میں پیشاب کا رک جانا، گردہ کے بعض امراض، اور پیشاب کا پیدا نہ ہونا وغیرہ۔

علامات :- اس مرض میں پیشاب رک جاتا ہے جس کی سمیت عروق شریہ کے ذریعہ خون میں جذب ہو جاتی ہے جس سے تشنج، ہڈیاں اور بیہوشی طاری ہو جاتی ہے یا سرسامی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے، سماعت اور

بصارت میں فرق آجاتا ہے۔ سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ شدید حالات میں سانس سے بھی پیشاب کی بو آنے لگتی ہے۔ اس بیماری میں کبھی تو پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے اور کبھی مقدار میں کم پھیکے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس مرض کو سرسام سے تفریق کرنا ضروری ہے۔

پرہیز و ہدایات :- گردوں کے مقام پر سینک کریں تاکہ گردے پیشاب پیدا کرنے لگیں۔ اگر ایسا کرنا سودمند نہ ہو تو مرض کو گرم غسل دیں یا گرم چادر میں لپیٹ دیں تاکہ پسینہ آجائے۔ اس مرض میں غذا قطعی نہ دینا چاہیے۔ مریض دودھ جس قدر بھی پی سکے اتنا ہی مفید ہے۔ دودھ کے علاوہ آتش جو بھی دے سکتے ہیں۔

علاج :- (۱) اگر پیشاب رک گیا ہو اور اس کا زہر خون میں سرایت کر گیا ہو۔ غفلت اور بے چینی ہو تو مارفینیم $x 4$ دینا چاہیے۔ اگر یہ دوا فیل ہو جائے تو کینتھر س چھوٹی طاقت میں دیں۔ (۲) اگر گردوں کا فعل خراب ہو گیا ہو، نبض غیر منتظم ہو گئی ہو، دل کی حرکات بے قاعدہ ہو گئی ہوں تو ڈیجیٹلس دینا چاہیے۔

(۳) باؤکیمیک میں فیرم فاس اور سلیشیا عمدہ دوائیں ہیں۔

(۴) مندرجہ صدر دواؤں کے علاوہ ہائڈروسیانک ایسڈ، آرسنک،

کیو پرم آرس، نکس دامیکا، سبل سر، ٹر بنتھنا، امونیا کارب، اڈکسٹرمونیم، وغیرہ بہت عمدہ دوائیں ہیں حسب علامت دیں۔

خونی پیشاب آنا

HEMATURIA

اسباب :- امراض گردہ و مثانہ، بواسیر کا خون بند ہو جانا، سخت سردی لگنا، مثانہ کی رگ کا پھٹ جانا، گردہ یا مثانہ میں پتھری کا ہونا، ورم گردہ، گردہ میں رسولی کا ہونا یا گردہ پر چوٹ لگ جانا اور چپکٹ غیرہ بعض مستورات کو خون حیض بند ہو جانے کے باعث پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں کبھی پیشاب خون آمیز آتا ہے اور کبھی بجائے پیشاب کے خالص خون آتا ہے۔ بعض وقت تھوڑا سا خون پیشاب سے پہلے یا بعد میں آتا ہے۔ جب سردی کے باعث خونی پیشاب آتا ہے تو مریض کو پہلے جاڑا معلوم ہوتا ہے اور اس پر لرزہ کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کے بعد خون آمیز پیشاب ہوتا ہے۔

تشخیص :- سردی سے خونی پیشاب ہونا چنداں تشویشناک نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں عموماً دس پانچ گھنٹہ کے بعد پیشاب خود بخود ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ گردوں سے جو خون آتا ہے وہ پیشاب میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ جب مثانہ سے خون آتا ہے تو وہ پیشاب کے آخری حصہ کے ساتھ آتا ہے۔ جو خون پیشاب کی نالی سے آتا ہے وہ پیشاب سے پہلے آیا کرتا ہے یا بغیر پیشاب کے قطرہ قطرہ ٹپکا کرتا ہے جب گردوں میں

خراش کے باعث خون آتا ہے تو اس میں مانند درد گردہ کے درد ہوتا ہے۔

نوٹ:- مثانہ کی رگ پھٹ جانے سے خالص خون زیادہ مقدار میں

آتا ہے مگر رگ کا سنہ کھل جانے کی حالت میں خون تھوڑا تھوڑا آتا ہے۔

پرہیز و ہدایات:- مریض کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ اگر

سردی کے باعث یہ شکایت ہوگئی ہو تو مریض کو سردی سے بچائیں۔

غذا میں صرف دودھ یا آش جو دیں۔ ثقیل اور نفاخ اشیاء سے

سخت پرہیز کرائیں۔

علاج:- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا کنابس سٹائیوا ہے۔

اگر یہ دوا ناکام رہے تو کینتھرس دینا چاہیے اور اگر خدا نخواستہ مندرجہ صدد

دونوں دوا میں مرض پر قابو نہ پاسکیں تو نکس و امیکا دیں۔

(۲) اگر بے چینی زیادہ ہو، پیشاب درد کے ساتھ ہوتا ہو، پیشاب

مقدار میں کم ہوتا ہو، پیشاب کی نالی میں جلن معلوم ہوتی ہو، بار بار

پیاس معلوم ہوتی ہو تو آرسنک مفید ہے۔

(۳) اگر پیشاب رک جائے یا خون آمیز درد کے ساتھ ہو، پیشاب

کی حاجت تو ہو لیکن صرف چند قطرے درد کے ساتھ خارج ہوں تو

ایری جیرن بہت مفید ہے۔

(۴) اگر مثانہ سے بغیر درد کے پیشاب کے بجائے خون آئے،

مریض میں کمزوری پائی جائے تو چائنم سلف بہت مفید ہے۔ حاد اور

مزمن دونوں قسم کے مریضوں پر یہ دوا حادی ہو جاتی ہے۔

(۵) اگر سردی سرایت کر جانے سے خون آتا ہو یا بھیگ جانے سے خونی پیشاب ہونے لگا ہو، گردہ میں درد، کمر میں درد اور مثانہ میں اینٹھن ہو، پیشاب کئی دھاروں میں منقسم ہو جاتا ہو، تو رٹاکس عمدہ دوا ہے۔
 (۶) مثانہ میں پتھری یا مثانہ میں ورم، بائیں گردہ کے مقام میں درد، پیشاب میں رکاوٹ سی معلوم ہو جس کے بعد خون آمیز پیشاب کا اخراج ہو تو ملی فولیم اکسیر کا کام کرتی ہے۔

(۷) اگر چوٹ کے باعث خون آنے لگے، مریض کو بستر سخت معلوم ہو۔ مثانہ میں اینٹھن ہو تو آرنیکا دینا چاہیے۔

(۸) بایو کیملک میں فیرم فاس نہایت عمدہ دوا ہے۔ ۶۴ دینا چاہیے۔
 (۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ ٹرنیٹھنا، بربرس، لائیگو، ہامیلیس، فاسفورس، اپیکاک اور زنکم نہایت اہم ادویہ ہیں۔ اگر ان ادویہ میں بھی علامات نہ مل سکیں تو چمافیل، سیپیا، کروٹیلس ہری، یواری، پلساٹیل، ٹریلیم اور سیکیل کار کی طرف توجہ کریں۔

درد گردہ

RENEL COINC

اسباب :- گردہ میں پتھری کا ہونا۔ گردہ کی رگ یا سنگریزہ کا گردہ سے مثانہ میں جاتے ہوئے یوٹیر یعنی گردہ اور مثانہ کی درمیانی

نالی میں وقت سے گزرنا جس کے باعث ناقابل برداشت تشنجی درد ہوتا ہے۔

علامات :- کمر میں گردے کے مقام پر سخت درد ہوتا ہے جس کی ٹیس مشانہ خصیہ اور کنج ران تک جاتی ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا یا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مارے درد کے مریض مچھلی کی طرح تڑپتا ہے۔ درد عموماً ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے لیکن بعض وقت مسلسل درد ہوا کرتا ہے۔ کبھی لرزدہ سے بخاوا جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا جاتا ہے، نبض کمزور چلنے لگتی ہے۔ پیشاب بار بار معلوم ہوتا ہے لیکن پیشاب کھل کر نہیں ہوتا اور اکثر پیشاب قطرہ قطرہ خون آمیز ہوتا ہے۔ ماؤفہ جانب کا حصہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے۔ شدید حالات میں اگر دونوں گردے ماؤف ہو جائیں اور پیشاب یکدم بند ہو جائے تو یورمیا کا خدشہ ہو جاتا ہے یعنی پیشاب کا زہر خون میں سرایت کر جاتا ہے۔

تشخیص اور تفریق :- درد گردہ، درد جگر، درد شکم اور درد کمر کی تشخیص ضروری چیز ہے۔ جگر میں بھی بعض وقت شدت کا درد ہوتا ہے۔ یہ درد دائیں طرف کی نچلی پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے۔ مقام ماؤفہ پر دبائے سے بھی درد معلوم ہوتا ہے۔ درد گردہ میں کمر کے نزدیک گردہ کے مقام سے درد شروع ہوتا ہے جس کی ٹیس خصیہ، کنج ران اور مشانہ تک جاتی ہے۔ درد شکم کی شناخت آسان ہے اس میں ناف کے ارد گرد درد ہوا کرتا ہے۔ مریض کو بدہضمی یا قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ کمر کا اعصابی درد بھی

اکثر دردہ کی شکل میں ہوتا ہے لیکن اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا کہ درد گردہ۔
اس کی ٹیس ران تک نہیں جاتی اور پیشاب کی بھی کوئی تکلیف دینا نہیں ہوتی۔
پرہیز و ہدایات :- درد کے مقام پر گرم اینٹ یا گرم روئی سے
اچھی طرح سینک کریں۔ اگر اس سے بھی افاقہ نہ ہو تو مریض کو کمر تک گرم
پانی میں بٹھا دیں اور دس پانچ منٹ کے بعد باہر نکال کر ٹنکچر بیلادونا
یا ٹنکچر بربرس و گرس لگا کر سینک کر باندھ دیں۔ شدت درد کی حالت
میں ٹنکچر ادیم لگائیں۔ مریض کو بار بار گرم پانی یا آتش جو یا سوڈا وائٹر لائیں
غذا میں چاء ملا ہوا دودھ دیں۔

علاج :- (۱) اگر گردوں میں شدید کاٹنے والا درد ہو، خصلیوں
میں کھینچن ہوتی ہو، درد کے باعث مریض ذرا سی بھی حرکت نہ کر سکے بلکہ
درد والی جانب جھکا ہوا بیٹھا رہے، پیشاب پیلے رنگ کا ہو تو بربرس
بہت مفید ہے۔ اکثر و بیشتر حالات میں یہ دوا اپنا معجزہ دکھاتی ہے۔
بالکل نیچی طاقتیں عمدہ کام کرتی ہیں۔

(۲) گردہ میں درد، پیشاب میں سرخی مائل ریگ آتی ہو۔ درد
کی ٹیس مشانہ تک پہنچتی ہو (کنج ران اور ٹانگوں میں نیچے تک نہیں)
تولائیکو پوڈیم بہت مفید ہے۔ داہنی جانب کے درد گردہ میں یہ دوا
اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۳) اگر گردہ میں تشنجی قسم کا درد ہو، خون آمیز پیشاب ہو، درد
پیشاب کی نالی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے مشانہ میں جائیں۔ مشانہ کی

گردن میں جلن اور مروڑ کا احساس ہو تو کینتھرس دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کینتھرس فیل ہو جائے تو ار جینٹم نائٹ دینا چاہیے۔

(۴) درد گردہ، چہرہ مرجھایا ہوا، پیشاب جلتا ہوا ہو، پیشاب کی یکایک حاجت ہوتی ہو اور خون آمیز پیشاب ہوتا ہو، درد پڑھ اور مثانہ کے مقام تک ہوتا ہو، پیشاب کی نالی میں درد ہونے کا احساس ہوتا ہو تو ار جینٹم نائٹ نہایت مفید ہے۔

(۵) گردہ میں پتھری، پیشاب میں مٹیالے رنگ کی باریک ریت، پیشاب بار بار ہو جس کے ساتھ اینٹھن اور درد ہو تو ایپی جیامدرٹشکرہ قطرہ ہر تین گھنٹہ کے بعد دیں۔ گردہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔

(۶) گردہ کے مقام میں درد، پیشاب گہرے رنگ کا اور پیشاب میں اینٹ کی طرح سرخ رسوب۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن، گردے سے مثانے تک کاٹنے والا درد، پیشاب بار بار تھوڑی مقدار میں ہو تو کوکس کیکٹائی مفید ہے۔ یہ دوا بھی درد گردہ کی پوری تصویر پیش کرتی ہے۔

(۷) گردہ میں درد کا علاج امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے صرف پانچ دواؤں سے کیا ہے وہ ادویہ لائیکوپوڈیم، سارسا پرپلا، بربرس، کیو ملا اور کلکیریا کارب ہیں۔

(۸) باپو کیمک میں نیٹرم سلفٹ درد گردہ کی عمدہ دوا ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کنابیس (نڈیکا، کنابیس شائیوا،

نکس و امیکا، پلسا ٹیلا اور نائٹرک ایسڈ نہایت اہم دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کے بعد پیرا، بیلا ڈونا، کیموٹلا، زونکم، لتھیم کارب، ڈالسکوریٹ اور اپومیا وغیرہ کی طرف توجہ کریں اور حسب علامت دیں۔

ورم گردہ

NEPHRITIS

(نیزدیکھوضف گردہ)

اسباب :- سردی لگ جانا یا بھیگ جانا۔ کثرت سے نوشی۔ مخزش اشیاء یا ادویہ کا استعمال جس سے گردوں میں خراش آجائے۔ گردہ میں چوٹ لگنا۔ مختلف قسم کا بخار۔ زرد بخار، ٹائیفائیڈ، سرخ بخار، ملیریا۔ ہیضہ۔ چیچک وغیرہ۔ مرض آتشک و سل، امراض مفاصل اور کثرت عیاشی وغیرہ۔ علامات :- پہلے جاڑے سے بخار آتا ہے۔ بے چینی اور پیاس ہوتی ہے۔ آبکائیاں آتی ہیں۔ شدید حالات میں استسقاء ہو کر تمام جسم بھول جاتا ہے۔ گردہ کے مقام پر درد ہوتا ہے، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ پیشاب میں البیومن کی کثرت ہوتی ہے یا پیشاب بدبودار زرد یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے جس میں بعض رسوب اور خون کے ذرات بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر پیشاب بالکل بند ہو جائے تو اس کا زہر تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور مریض مشکل سے بچتا ہے۔ اس مرض کے ساتھ نونیا کا

ہو جانا بھی علامت بد ہے۔ یہ مرض عورتوں کو بہت کم ہوتا ہے۔ اگر استسقاء کا مرض ہو گیا ہو اور چہرہ سو جا ہوا ہو۔ پیشاب کم مقدار میں البیومن ملا ہوتا ہو تو اس مرض کی شناخت آسان ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر سردی سراپت کرنے سے یہ شکایت ہو جائے تو عموماً دو ایک ہفتہ میں بالکل شفا ہو جاتی ہے۔ البتہ مریض کو سردی سے محفوظ رکھیں۔ اگر کمر کے مقام پر درد ہوتا ہو تو اسے سینکیں، سوڈا واٹر یا کھاری پانی پینے کو دیں۔ مریض کے دونوں جانب گرم بوتلیں رکھیں یا گرم پانی کا بھپارہ دیں یا اچھی طرح کسی کپڑے سے لپیٹ دیں تاکہ کھل کر پسینہ آجائے۔ غذا نہایت ہلکی دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ صرف دودھ اور آتش جو یا مونگ کی دال کا پانی دیں۔ شراب کباب اور گوشت سے پرہیز کریں۔

علاج :- اس مرض کے لیے گینتھر س، کالی کارب، ایپس، ٹرنٹھنا، بیلا ڈونا، پلیم، رسٹاکس، ریوہم اور فاسفورس بہت عمدہ دوائیں ہیں۔ کوئی بھی دوا حسب علامت دیں۔

ضعف گروہ (بول زلالی)

ALBUMINURIA

(نیز دیکھو ورم گروہ)

اسباب :- گردوں کی قوت ماسکہ اور ہاضمہ کا کمزور پڑ جانا، سسری سرایت کر جانا، کثرت جماع، جلق، چوٹ، ورم گروہ، ورم مشانہ، میعاد دی بخار، مرگی، امراض جگر، کمی خون، فکر و تردد، جگر میں اجتماع خون، وزنی بوجھ اٹھانا یا گھوڑے کی سواری کرنا جس سے گردوں پر زور پڑے وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- گردوں کے مقام پر بعض وقت درد ہوتا ہے۔ پیشاب میں البیومن (انڈے کی سفیدی خالص البیومن ہے جو اس کی بہترین مثال ہے) خارج ہوتی ہے رات کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ قوت باہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ جسم کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، کمزوری اور لاغری بڑھتی جاتی ہے اور آخر کار استسقاء کا مرض آدباتا ہے۔ مزمن کیفیت میں مریض کے پوٹوں پر ورم آ جاتا ہے، بلڈ پریشر یا حرکت قلب بند ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے جب اس مرض میں پیچیدگیاں ہونے لگتی ہیں تو مریض کو یوریمیا، سرخ بادہ اور سیلولائٹس وغیرہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے جو اکثر خطرناک صورت ہوا کرتی ہے۔ چونکہ اکثر حالات میں ضعف گروہ ایک خاص علامت ورم گروہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے

اس کے علاج میں عموماً وہی ادویہ زیادہ کام آتی ہیں، جو درم گردہ میں دی جاتی ہیں۔

پہلے تیز و ہدایات :- معالج کا فرض اولین ہے کہ وہ مرض کی اصل وجہ دریافت کرے۔ چنانچہ اگر حمل کے ایام میں ستورات کو یہ شکایت ہو جائے تو مریضہ کو آرام سے لٹائے رکھیں۔ عموماً غذا سے ہی یہ شکایت دو چار دن میں کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بخاروں کے بعد پیشاب میں البیومن آنے لگے تو بھی علاج کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ ہر حال میں صحت عامہ کو درست رکھنا ضروری ہے۔ کمی خون اور کمزوری کی حالت میں مناسب ٹانک اور مقوی اشیاء کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اگر شراب نوشی سے یہ شکایت ہو گئی تو شراب سے تو بیکرینا ہی بہتر ہے۔ ہر حال میں غذا نہایت لطیف اور زود ہضم دیں، دودھ، آش جو یا مونگ کی دال کا پانی اس مرض کے لیے بہترین غذا ہے۔

علاج :- (۱) اگر ٹھنڈک سے پیشاب میں البیومن آنے لگے یا پیشاب خون آمیز وقت سے ہوتا ہو تو ابتدائی حالت میں اکونائٹ عمدہ کام کرتا ہے۔

(۲) اگر پیشاب مقدار میں کم، البیومن ملا، خون آمیز اور دقت کے ساتھ ہو، گردہ میں درم ہو تو کینتھر س دوا بہت عمدہ کام کرتی ہے۔

(۳) کینتھر س نا کام رہے تو بیلا ڈونا دینا چاہیے۔ گردہ میں ڈنک لگنے کا سادرد جو نوبت بہ نوبت شدت کے ساتھ آئے یا مثلاً نہ تک

جائے یا ذرا بھی خطرہ یوریمیا (زہر نول) کا پیدا ہونے لگے تو دوا بیلادونا
اکسیر کا کام کرتی ہے۔

(۴) اگر پیشاب کا رنگ خون آمیز، گندا اور نہایت قلیل مقدار
میں ہو، مریض کی سانس سے تعفن آئے۔ اور گردہ میں شدید درم ہو تو
ٹریٹھنا بہت مفید ہے۔

(۵) اگر پیشاب میں البیومن اور رسوب کی کثرت ہو، اور متعدی
اور وبائی امراض کے بعد یہ شکایت لاحق ہوئی ہو، مریض پر کمزوری غالب
ہو، قلب کی تکلیفات بھی رونما ہو گئی ہوں تو آرسنک دینا چاہیے۔
حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں یہ دوا اچھا کام کرتی ہے۔

(۶) آخری درجہ میں ایٹپس دینا مناسب ہوا کرتا ہے جبکہ مریض
بے ہوش ہو گیا ہو، پیشاب مقدار میں کم یا رکا ہوا ہو، گردہ
میں درم ہو، جلد ار! ڈنک لگنے کا سادرد ہوتا ہو۔ پیوٹوں پر درم ہو۔

(۷) اگر پیشاب چنگ کے ساتھ البیومن ملا ہوا ہو، پیشاب کا رنگ
گہرا سرخ ہو اور پیشاب مقدار میں کم ہوتا ہو تو لائیکو پوڈیم مفید ہے۔
اگر مثانہ میں بھی ورمی کیفیت ہو تو یہ دوا اور بھی بالمشل ہو جاتی ہے۔
اس دوا میں داسنے گردہ میں بھی اکثر درد پایا جاتا ہے۔

(۸) اگر استسقائی کیفیت ہو، معدہ میں پریشانی کا احساس ہو۔
پیاس بہت لگتی ہو، یرقان اور قلب کی تکالیف پائی جائیں تو ایوپوسائٹم
بدرٹنچر دس قطرہ فی خوراک دن میں تین بار دیں۔ بہت مفید ہے۔

(۹) حمل کے ایام میں مستورات کو استسقاء یا ضعف گردہ کے لیے ہومیونائٹس مفید ہے۔

(۱۰) باپو کیمک میں کلکیر یا فاس اور کالی فاس باری باری دینا چاہیے۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ مرک، کنابلس سٹائیوا، سیکیل، سلفر، پلمبم، اور ڈیجی ٹیلیس وغیرہ نہایت عمدہ ادویہ ہیں۔ حسب علامت دیں۔

ذیابیطس

DIABETES

اسباب :- اس مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ذیابیطس سادہ اور ذیابیطس شکاری۔ میٹھی اور نشاستہ دار اشیاء کا کثرت سے استعمال کرنا، دماغی کام کی کثرت، تفکرات، کثرت مجامعت، سر، دماغ یا ریڑھ میں چوٹ کا لگنا، زیادہ شراب پینا، جگر میں فتور واقع ہو جانا، محنت یا ورزش کے بعد یا دھوپ سے آکر یکایک سرد پانی پی لینا۔ سردی لگنا، مرض آتشک، امراض مفاصل اور ضعف گردہ وغیرہ۔

علامات :- یہ مرض عموماً جوانی میں یا ادھیڑ عمر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں پیشاب بہ کثرت آتا ہے، پیشاب میں شکر

آتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ بھوک زیادہ معلوم ہوتی ہے، کبھی ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ مریض روز بروز لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ مریض کی سانس سے ایک قسم کی میٹھی بو آنے لگتی ہے۔ قوتِ باہ کم ہو جاتی ہے۔ جلد خشک ہو جاتی ہے اس پر سے بھوسی بھڑتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ اکوتہ اور کاربکل وغیرہ ہو جاتا ہے سر میں درد رہتا ہے۔ منہ میں ہر وقت خشکی رہتی ہے۔ بعض وقت مسوڑھے بھی ماڈت ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مرض مزمن شکل اختیار کر لیتا ہے تو مشکل ہی سے اچھا ہوتا ہے۔ یا اگر گردوں میں ورمی کیفیت پیدا ہو جائے یا مریض کو نمونیا یا سہل کا مرض ہو جائے تو بھی اس کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات موتیا بند ہو کر یکا یک بینائی زائل ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں پیشاب میں شکر کی مقدار ۲ فی صدی سے لے کر ۵ فی صدی تک ہوتی ہے لیکن بعض حالات میں دس یا بارہ فی صدی تک ہو جاتی ہے اور رات دن میں پانچ چھ سیر یا اس سے کم و بیش پیشاب خارج ہوتا ہے اور شکر کی زیادتی کی وجہ سے پیشاب کا وزن ۱.۳۰ سے لے کر ۱.۶۰ درجہ تک ہو جاتا ہے۔ شدید حالات میں اس سے بھی زیادہ وزن ہو سکتا ہے۔

تشخیص و تفریق :- ذیابیطس سادہ اور ذیابیطس شکری میں تفریق کرنا ضروری ہے۔ ذیابیطس سادہ میں پیشاب بہ کثرت ہوتا ہے جس کی وجہ عموماً ضعف گروہ یا جگر میں سردی سرایت کر جاتی ہے، پیشاب میں

شکر یا البیومن بالکل نہیں ہوتی البتہ کبھی فاسفیٹ پائے جاتے ہیں۔
پیشاب کا وزن ۱۰۰۱ سے لے کر ۱۰۰۵ درجہ تک ہوتا ہے۔ مناسب
پرہیز سے یہ مرض چند روز میں خود دور ہو سکتا ہے۔

ذیابیطس شکری میں پیشاب میں شکر آتی ہے۔ پیشاب کرنے
کے بعد بعض وقت وہاں پر چیونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کا وزن
شکر کی زیادتی کی وجہ سے بڑھ کر ۱۰۳۰ سے لے کر ۱۰۷۰ درجہ تک ہو جاتا
ہے۔ بہر حال پیشاب کو باقاعدہ کمیادی امتحان کر کے آکسے جانے
کے بعد زیادہ صحیح اور یقینی تشخیص اس مرض کی ہو سکتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر کثرت کار اور تردد و افکار کے باعث
یہ شکایت ہو گئی ہو تو دماغ کو مکمل آرام پہنچائیں۔ کپڑے گرم پہنیں
تاکہ برابر پسینہ آتا رہے۔ غذا کا تدارک اس میں بہت ضروری ہے
علاج کے ساتھ ساتھ غذا میں سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ مٹھائی بالکل
نہ کھانا چاہیے۔ یہاں تک کہ شکر کے بجائے بحالت مجبوری سکرین
استعمال کریں۔ نشاستہ دار غذاؤں سے پرہیز کریں۔ گوشت، اندا اور
مچھلی وغیرہ کھانا زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے مکھن اور بالائی وغیرہ بھی
کھا سکتے ہیں۔ ترکاریوں میں صرف بھجیا گھی میں بھون کر دیں۔
یانی کے لیے سوڈا واٹر استعمال کریں۔ شراب سے قطعی تو بہ کریں۔ اگر
برداشت ہو سکے تو چند یوم تک صرف ایک وقت کھانا کھائیں۔

علاج :- (۱) اگر پیشاب میں مچھلی کی بو آتی ہو، پیشاب زیادہ

لگتا ہو، عمدہ میں ابتری ہو تو یورینیم نائٹ $\times 3$ عمدہ کام کرتا ہے۔
 (۲) اس مرض کی نہایت اہم دوا سائی زائی جمیم ہے، بدر شکر
 کے دس قطرے دن میں تین مرتبہ دیں۔ بعض حالات میں $\times 3$ عمدہ کام
 کرتا ہے اگر اس کے ساتھ باری باری آرسنک الیم بھی دیا جائے تو
 نتائج اور بھی عمدہ برآمد ہوتے ہیں اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے مریض
 محفوظ رہتا ہے۔ حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں یہ دونوں دوائیں
 عمدہ کام کرتی ہیں۔

(۳) کثرت جماع یا دماغی محنت زائد کرنے سے اگر پیشاب میں
 شکر آنے لگے یا پیشاب میں فاسفیٹ یا آگزلیٹ کی موجودگی پائی جائے
 یا چونے کا سفید پیشاب ہو، کمزوری اور لاغری زیادہ ہو، کمر اور گردہ
 میں درد ہو، ہاضمہ خراب ہو تو ایسڈ فاس نہایت نیچی طاقت میں یا بدر شکر
 کے دس قطرے دن میں تین بار دیں۔ اگر اس کو ٹینکچر کی شکل میں دیا جائے
 تو کھانے سے نصف گھنٹہ قبل استعمال کرنا زیادہ موزوں ہوا کرتا ہے۔
 ایسڈ فاس دراصل ابتدائی درجہ میں بہترین کام کرتی ہے۔

(۴) اگر پیشاب بہ کثرت گندلا اور شکر ملا آتا ہو یا پھٹے ہوئے
 دودھ کی مانند ہو، مریض میٹھی اشیاء کا بہت شوقین ہو، متلی، قے، پیٹ
 میں ریاح اور ابھار ہو، رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہو تو ارسنک
 دینا چاہیے۔ اس دوا میں شکر کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی۔

(۵) بار بار شدید پیاس جو کسی طرح نہ بجھے، پیشاب بہ کثرت ہو۔

اختلاج قلب کی بھی شکایت ہو۔ پانی کے سے پتلے بدبودار دست شروع ہو جائیں، کمزوری اور لاغرزی بہت نمایاں ہو جائے تو آرسنک البم عمدہ دوا ہے، مزمن کیفیتوں اس دوا کی علامات زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں۔
(۶) شکری ذیابیطس میں گڑ مار مدر شکچر کو دن میں تین بار دے کر اکثر ڈاکٹروں نے عمدہ نتائج دیکھے ہیں۔ اس کے استعمال سے شکر کا آنا بہت جلد موقوف ہو جاتا ہے۔

(۷) باپو کیمیک میں نیٹرم سلف اس مرض کی مجرب دوا ہے۔
(۸) مندرجہ صدر اودیہ کے علاوہ لائیکو، پلمیم، نکس و امیکا، لیکٹک ایسڈ، اوپیم اور کیو پریم آرس بہت عمدہ دوائیں ہیں۔
حسب علامت دینا چاہیے۔

سلسل بول

INCONTINENCE OF URINE

اسباب :- مثانہ کی کمزوری، مثانہ کا ڈھیلا ہو جانا، مثانہ میں خراش یا پتھری کا ہونا۔ ضعف گردہ۔ ورم مثانہ، مثانہ سے پتھری خارج ہو جانے کے اثرات مابعد، سردی سراپت کر جانا، بچوں میں حسد پروری کیفیت کا ہونا یا گھونگھٹ کا لمبا ہونا اور حرام مغز پر چوٹ لگنا وغیرہ۔

علامات :- اس مرض میں پیشاب بہ کثرت اور بار بار آتا ہے۔ بعض حالات میں بلا ارادہ اور بے اختیار خارج ہو جاتا ہے۔ جب مثانہ کی کمزوری سے یہ شکایت ہوتی ہے تو مریض پیشاب کو روک نہیں سکتا اور نہ ہی زور سے خارج کر سکتا ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ مثانہ میں خراش ہو جانے سے بار بار پیشاب ہوتا ہو تو مریض کو بیٹھے بیٹھے بے خبری میں پیشاب ہو جاتا ہے جس سے اچانک تمام کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں کو مثانہ کے عضلاتی ریشوں کے کمزور ہو جانے کے باعث عموماً بار بار اور بلا ارادہ پیشاب ہوا کرتا ہے۔ بعض حالات میں پاؤں پر آکاس آ جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو معلوم کریں اور اس کے مطابق علاج پرہیز کریں۔ قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔ کیونکہ قبض کے باعث مثانہ پر بوجھ اور دباؤ پڑتا ہے، سرد اور ترش چیزوں سے سخت پرہیز کرائیں۔ اگر ذیابیطس یا البیو منور یا اس کا اصل باعث ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔

علاج :- (۱) اگر ضعف مثانہ کی وجہ سے پیشاب بغیر درد کے اور کثرت سے بار بار ہوتا ہو یا بلا ارادہ نکل جاتا ہو تو بیلاڈونا مفید ہے۔ (۲) بیٹھے یا چلنے میں پیشاب کے قطرے خود بخود خارج ہو جائیں یا محض کھانسنے سے اور سونے میں بے خبری میں پیشاب ہو جائے تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔ عورتوں کے لیے یا نازک مزاج اور جلد رنجیدہ

ہو جانے والے انسانوں کے لیے یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۳) بائی یا گٹھیا والے مریض کو اگر بلا ارادہ رات کو پیشاب ہو جاتا ہو تو رٹاکس مفید ہے۔

(۴) جب مثانہ مفلوج ہو گیا ہو، کھانسنے میں پیشاب نکل جائے کاسٹم دوا ہے۔

(۵) جب مثانہ میں پیشاب خارج کرنے کی قوت زائل ہو گئی ہو۔ لاعلمی میں پاخانہ اور پیشاب ہو جاتا ہو تو اوپیم دینا چاہیے۔

(۶) خنازیری مادہ کے مریضوں کے لیے یا جن کو مزمن جلدی امراض ہوں، پیشاب بہ کثرت ہوتا ہو۔ رات کو بستر میں بھی نکل جاتا ہو تو سلفر فید ہے۔

(۷) رات کو بار بار پیشاب ہو۔ پیشاب رک نہ سکے، پیشاب کرنے میں دھار ٹھہر ٹھہر کر نکلے تو کونیم مفید ہے۔ یہ دوا عموماً بوڑھوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ کونیم کے فیل ہو جانے پر جلیسم دینا چاہیے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سیپیا۔ ایسڈ فاس۔ سنا۔ پٹرولیم اور نکس دامیکا بھی عمدہ دوائیں ہیں۔

سوزاک

GONORRHOEA

اسباب :- ایسی عورت سے جماع کرنا جس کو سوزاک کا مرض ہو،

بدخوابی، پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کے باعث خراش یا زخم کا ہو جانا وغیرہ لیکن اکثر و بیشتر حالات میں سوزا کی بازاری عورت سے مباشرت کرنے ہی سے یہ خبیث مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس بیماری میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے۔ اور پیشاب کے راستہ خون اور مواد خارج ہوتا ہے۔ حشفہ کو دبانے سے پیپ نکلنے لگتا ہے۔ پیشاب بار بار اور سخت جلن سے ہوتا ہے بعض وقت پیشاب کے وقت پیشاب کی نالی میں اس شدت کی ٹیس اور جلن ہوتی ہے کہ مریض کی حالت قابل رحم معلوم ہوتی ہے۔ عضو تناسل اس قدر ذکی الحس اور دردناک ہو جاتا ہے کہ کپڑا چھوا جانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی مریض کو بخار بھی ہو جاتا ہے۔ مناسب علاج اور پرہیز سے ہفتہ عشرہ میں صحت ہو جاتی ہے لیکن اگر علاج میں تساہلی کی جائے تو برسوں یہی کیفیت رہتی ہے جس سے پیشاب کی نالی میں قرحہ ہو جاتا ہے جس کا علاج بہت وقت طلب ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- گرم اور ترش اشیاء، کھٹائی، تیل، مرچ، انڈا اور گوشت وغیرہ سے پرہیز کریں۔ غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم دیں۔ دودھ، سا بودانہ، آتش جو، مونگ کی کھڑی وغیرہ دینا زیادہ مناسب ہے۔ جماع سے تو قطعی پرہیز رکھنا ضروری ہے۔

زیادہ تکلیف کی حالت میں مناسب پچکاری کا استعمال کریں یا محض گرم پانی عضو تناسل پر دھاریں۔

نوٹ :- سوزاک کے سبب سے اور بھی امراض پیدا ہو جایا کرتے ہیں اور سوزاک کے دب جانے سے بھی بعض شکایات ہو جایا کرتی ہیں مثلاً زرد سر، پیسہ، گھٹیا اپیزائو، وغیرہ۔ مریض کو سخت تاکید کر دینا چاہیے کہ اس کا مواد کسی دوسری جگہ نہ لگے۔ آنکھ میں اس کا مواد لگ جائے تو آنکھوں میں سوزش اور درم ہو جاتا ہے، اور دوسرے تیسرے دن ان میں پیسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر فوراً توجہ نہ کی جائے تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جیسے ہی پیشاب میں تکلیف محسوس ہو تو اکونائٹ $\times 3$ ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔

(۲) اگر اکونائٹ کسی وجہ سے فیل ہو جائے اور بیماری بہت سوجی ہوئی سرخ اور ذکی احمس ہو اسادگی میں پیشاب کی نالی میں سخت کچا دھوا، پیشاب کرنے میں تکلیف اور جلن ہو نیز مواد خارج ہو تو کنالیں مٹائیوا دینا چاہیے۔ امریکہ کے اکثر ڈاکٹروں نے صرف مندرجہ صدر دوا دویہ سے بیشمار کیس اچھے کیے ہیں۔

(۳) اگر مرض میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ پیدا ہوتی ہو، حشفہ متورم ہو، سبزی مائل مواد نکلے تو ابتدائی حالت میں مرک سال عمدہ کام کرتا ہے اگر مریض کو آتشک کا مادہ بھی ہو تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۴) اگر مواد زرد یا خون آمیز ہو، اسادگی زیادہ ہوتی ہو، پیشاب قطرہ قطرہ سخت تکلیف سے ہوتا ہو، درم مشابہ تک ہو تو کینتھرس بہت عمدہ دوا ہے۔ اگر اس مرض کو بذریعہ انجکشن دیا گیا ہو تو یہ دوا اور بھی مفید ہے۔

(۵) سوزاک کا دوسرا درجہ، پیشاب کی نالی میں ورم، پیشاب کی دھار بچٹی ہوئی، مواد زرد یا سبزی مائل، گھونگھٹ اور حشفہ پر ہمارے یا چیچک نما آبلے ہوں تو تھو جا دینا چاہیے۔ اگر ان علامات پر تھو جانا کام رہے تو نائٹک ایسڈ دیں۔

(۶) اگر بہترین منتخب شدہ ادویہ اپنا فعل انجام دینے سے قاصر رہی ہوں۔ عضو تناسل پر کھجلی ہوتی ہو پیشاب کی نالی کے سرے پر جلن ہو، پیشاب جلتا ہوا نکلے، مواد کا رنگ نیلگوں ہو تو سلفر دینا چاہیے خناتہ پری مزاج والوں کے لیے زیادہ بالمثل دوا ہے۔

(۷) پیشاب میں جلن، پیشاب کر چکنے کے بعد یہ احساس کہ کوئی چیز پیشاب کی نالی میں باقی رہ گئی ہے۔ زیادہ مقدار میں زرد رنگ کے مواد کا اخراج ہو تو میڈورنیم دینا چاہیے۔ بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ دبے ہوئے سوزاک یا پورا نے سوزاک کی یہ خاص دوا ہے۔

(۸) پیشاب کی بار بار حاجت۔ پیشاب کی نالی میں سرسراہٹ، جلن یا خارش ہو۔ پیشاب کے بعد کٹن کا سا درد ہو، دودھ کا سا یا زرد مواد کا اخراج ہو تو پٹرولینیم مرچکچرڈن میں تین بار دیں یا $3 \times$ طاقت کی دوا ہر گھنٹہ بعد دیں۔

(۱۰) باپوکیماک میں نیٹرم فاس سوزاک کی مجرب دوا ہے۔

(۱۱) دیگر ادویہ جو مفید ہیں وکیسکم، پلسا ٹیلا، ارجنٹم نائٹ،

فلورک ایسڈ، حلیمیم، انٹیم کروڈ۔ ایڈمن اور نیٹرم میور وغیرہ ہیں۔

احتلام

NOCTURNAL EMISSION

اسباب :- فاسد اور عاشقانہ خیالات کا ہونا، بد مضمی، پیٹ کے کیڑے، گھونگھٹ کا لمبا ہونا، جلق، کثرت مباشرت، اعضائے تناسل کا ذکی الحس ہو جانا، مجرد رہنا اور کثرت منی وغیرہ۔

علامات :- سوتے میں مریض کو کوئی نہ کوئی خواب دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد احتلام ہو جاتا ہے بعض اوقات بغیر خواب کے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام عموماً تیسرے یا چوتھے روز ہوا کرتا ہے مگر شدت مرض کی حالت میں روزانہ یا دن کو بھی نیند آ جانے پر احتلام ہو جاتا ہے۔ کثرت احتلام سے مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد رہتا ہے طبیعت سُست اور مضحمل رہتی ہے۔ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم کھائیں، قبض ہرگز نہ رہنے دیں۔ انڈا، پوری کچوری، مٹھائی، اچار، کباب اور شراب وغیرہ سے پرہیز کریں۔ سونے سے پہلے پیشاب کر لیں تاکہ پیشاب مثانہ میں جمع ہو کر باعث احتلام نہ ہو جائے۔ جہاں تک ہو سکے کروٹ کے بل لیٹیں۔ اچھی صحبت میں بیٹھیں اور چال چلن کو درست رکھیں۔ عاشقانہ خیالات دل میں نہ آنے دیں۔

علامات :- اگر ریاحی تکلیف ہو، ہاضمہ خراب ہو، احتلام بہ کثرت

ہوتا ہو جس سے مریض بہت کمزور ہوتا جاتا ہو، استادگی نہایت کمزور ہو، فوٹے لٹکے ہوئے ہوں تو لائیکو پوڈیم دینا چاہیے۔ یہ دوا بوڑھے آدمیوں کو زیادہ موافق آتی ہے۔

(۲) اگر مریض کو قبض رہتا ہو، احتلام پچھلی رات کو صبح ہوتے ہوئے یا دن کو سوتے میں ہو جائے، کثرت جماع یا کثرت مے نوشی سے یہ شکایت ہو گئی ہو تو نکس دامیکا مفید ہے۔

(۳) عرصہ تک مشیت زنی یعنی جلت لگانے سے یا کثرت مباشرت سے جس کے باعث حرارت غریزی میں کمی ہو گئی ہو تو سٹانی سیگیر یا مفید ہے۔ اگر کمزوری زائد ہو اور سٹانی سیگیر یا سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا ہو تو چائنا دینا چاہیے۔

(۴) اگر احتلام بہ کثرت ہوتا ہو، جماع یا احتلام کے بعد بہت کمزوری معلوم ہو، پیشاب دودھ کا سا ہوتا ہو اور استادگی بغیر خواہش جماع کے ہو، مریض بہت کمزور ہو تو ایسڈ فاس مدرٹنکچر ۵ قطرہ فی خوراک دن میں ۳ بار دیں۔

(۵) اگر شہوانی خوابوں کے ساتھ احتلام ہوتا ہو۔ بار بار استادگی ہوتی ہو اور جماع کی زبردست خواہش ہوتی ہو، سرعت انزال کی شکایت ہو، ریڑھ میں جلن ہو تو فاسفورس عمدہ دوا ہے اگر مندرجہ صدر علامات میں خواہش نفسانی کی تیزی نہ ہو البتہ استادگی بہت ہوتی ہو تو پیک ایسڈ دینا چاہیے۔

(۶) اگر احتلام بغیر خواب کے یا بغیر شہوانی خیالات کے ہو جاتا ہو اور خواہش جماع بالکل نہ ہو، مریض کو سونے کی خواہش زیادہ رہتی ہو۔ سرد اشیاء کے پینے سے نفرت ہو تو کیلیڈیم مفید ہے۔

(۷) اگر احتلام بہ کثرت ہوتا ہو یا قریب قریب ہر رات کو ہو جاتا ہو تو نیٹرم فاس بہت مجرب دوا ہے۔

(۸) خواہش نفسانی کی زیادتی، مشت زنی یا کثرت جماع سے کمزوری، احتلام بغیر استادگی کے ہو تو سیلکس ناٹا، گرامر ٹینکچر ۲۰ بوندی خوراک دن میں ۴ بار دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ نیٹرم میور۔ سیلینیم۔ سیپیا۔ اورمٹ ڈاٹسکوریہ۔ گلکیریا کارب۔ کالی فاس۔ سلفر اور۔ حلیمیم وغیرہ نہایت مفید دوائیں ہیں۔

جرمان

SPERMATORRHOEA

اسباب :- کثرت مباشرت، مشت زنی یعنی جلق، قبض، گرم اشیاء کا کثرت استعمال، احتلام، شہوانی خیالات کا اجتماع، کثرت شراب خوری و چاؤ نوشی، اور ریگ گردہ یا مثانہ وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں منی پانی کے مانند پتلی ہو جاتی ہے۔

پاخانہ یا پیشاب کے وقت منی کے دو چار قطرے خارج ہو جاتے ہیں۔ جب منی زیادہ پتلی ہو جاتی ہے تو پیشاب کے ساتھ بہتی ہے۔ مریض بہت کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ قبض کی شکایت رہتی ہے۔ کمر اور گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے۔ قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے۔ سر میں درد کی شکایت رہا کرتی ہے۔ پیٹھ پر چیونٹیوں کی سی سینگن کا احساس ہوتا ہے۔ سرعت انزال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ مریض نہایت منہموم رہتا ہے اور تنہائی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے اور مرض مزمن شکل اختیار کر لے تو ضعف کے باعث دیگر امراض اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور مریض کی جان لے کر چھوڑتے ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- مرض کی اصل وجہ دریافت کریں۔ اگر کثرت سے نوشی یا چاء و قہوہ کے استعمال سے جریان ہو گیا ہو تو ان چیزوں سے دور رہیں۔ مریض کو قبض کسی حالت میں بھی نہ رہنے دیں۔ اس مقصد کے لیے غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم دیں۔ شوربا پھلکا، دودھ اور مونگ کی کھچڑی عمدہ غذا ہے۔ جب مریض رو بصحت ہونے لگے تو گوشت میں سبزی ڈال کر یا نیم برشت انڈا دے سکتے ہیں۔ کھٹل، ہینگن، پراٹھا، کباب، پوری، کھٹائی، مرچ اور تیل کا استعمال مضر ہے۔ مریض کو مناسب ورزش اور ہوا خوری کی ہدایت کریں۔ خیالات پاکیزہ رکھیں اور اچھی صحبت میں بیٹھیں تاکہ فاسد خیالات کا گزر نہ ہو سکے۔

علاج :- کثرت جماع سے جریان ہو جس کی وجہ سے مریض کمزور ہوتا جاتا ہو تو ایسڈ فاس مدر ٹنکچر کے ۵ قطرے فی خوراک دن میں تین بار دیں۔ اگر ایسڈ فاس سے خاطر خواہ فائدہ نہ ہو تو ڈیمیانہ مدر ٹنکچر تیس قطرے فی خوراک دن میں ۳ بار دیں بہت مستند نسخہ ہے۔

(۲) اگر خواہش نفسانی زیادہ ہو، مشت زنی یا کثرت جماع سے عضو تناسل کمزور ہو گیا ہو۔ احتلام اور جریان کی شکایت ہو، استادگی کم یا کمزور ہوتی ہو تو ٹنکچر سیلکس نائگرا تیس قطرے فی خوراک دن میں چار بار دیں۔ اگر یہ دوا ناکام رہے تو اسٹوگنڈھ مدر ٹنکچر کے تیس پوند فی خوراک دن میں تین چار بار دینا بہت مفید ہے۔

(۳) سرعت انزال، جریان، کمی خون کے باعث دماغی اور جسمانی تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہو۔ خواہش نفسانی اور استادگی زیادہ ہو مگر مباشرت میں منی دھار مار کر خارج ہو جاتی ہو تو پیکرک ایسڈ مفید ہے۔

(۴) اگر مشت زنی یعنی جلق سے کمزوری اور جریان کی شکایت ہو گئی ہو، جماع کے اختتام پر سانس پھولنے لگے اور سخت کمزوری معلوم ہو مریض کو احتلام بھی ہو جایا کرتا ہو تو ٹانی سیگیا بہت مفید ہے۔ اگر یہ دوا نفل ہو جائے تو چائنا دیں۔ جریان، نامردی، کثرت جماع یا جلق سے پیدا شدہ کمزوری کے لیے چائنا خاص چیز ہے۔

(۵) قوت باہ بہت کمزور ہو، معدہ کی شکایات ہوں، خصبے ڈھیلے پڑ جائیں اور لٹاک جائیں۔ منی پانی کے مانند پتلی ہو جائے اور از خود انزال

ہو جاتا ہو، عضو میں طاقت نہ رہے۔ منی کی اصل خاصیتیں زائل ہو گئی ہوں تو سلفر بہت مفید ہے۔

(۶) جریان، منی پتلی ہو، استادگی میں یا پیشاب پاخانہ کے وقت منی خود بخود خارج ہو جائے تو سیلینیم $4 \times$ ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔
(۷) اگر جریان بغیر استادگی کے ہوتا ہو۔ آلات تناسل ڈھیلے ہو جائیں اور ان میں جان باقی نہ معلوم ہوتی ہو، فوطوں پر مسلسل سپینہ رہتا ہو۔ تو جاسمیم دینا چاہیے۔

(۸) ہر حرکت کی تبدیلی پر بغیر شہوانی خیال کے مذی خارج ہو، خواہش جماع بڑھ جائے مگر طاقت عمل کمزور ہو بغیر خواب کے انزال ہو جاتا ہو تو کونیم بہت مفید ہے۔ اگر کونیم ناکام رہے تو کیلیڈیم دیں۔ کثرت جماع کے باعث جریان ترقی شدہ جس میں استادگی بالکل نہ ہو کیلیڈیم بھی خاص دوا ہے۔

(۹) باپو کیمیک میں نیٹرم فاس بہت عمدہ دوا ہے اگر مریض لاغر اور کمزور ہو تو کلکیر یا فاس کے ساتھ باری باری دینا چاہیے۔

(۱۰) ان ادویہ کے علاوہ سیپیا۔ اگنس۔ فاسفورس۔ لائیکو اور نکس و امیکا نہایت اہم ہیں۔ اگر یہ دوائیں بھی کافی نہ ہوں تو کلکیر یا کارب زنکم، ڈیجیٹلیس، کالی بائی، نیٹرم میور، اورم مسٹ وغیرہ کی طرف توجہ کریں۔

ضعف باہ اور نامردی

SEXUAL WEAKNESS

اسباب :- کثرت مباشرت - جلق - اغلام - کثرت احتلام -
 جریان - ضعف جگر و معدہ و دماغ - جسمانی کمزوری - قلت غذا کھائی -
 اچھا - مرج اور اشیائے منشی مثلاً شراب - تنباکو - افیون - بھنگ وغیرہ
 کا کثرت استعمال - قلت منی - تفکرات یا غم و غصہ وغیرہ بھی بیماریوں کے
 بعد یا تشکی و رم خصیہ کے باعث بھی ضعف باہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔
 علامات :- قوت جماع ناقص یا زائل ہو جاتی ہے - عضو مخصوص
 ڈھیلا ہو جاتا ہے - مریض کی سرعت انزال کی شکایت ہوتی ہے - کبھی
 استادگی ہو کر بات کی بات میں سنی خارج ہو جاتی ہے - طبیعت سست
 اور پریشان رہتی ہے - بعض وقت مریض خودکشی پر اتر آتا ہے شدید
 حالات میں تندی بالکل نہیں ہوتی اور جماع کی طرف مریض قطعی رغبت
 نہیں کرتا - یار دوستوں میں نشست و برخاست کم کر دیتا ہے - تنہائی
 اچھی معلوم ہوتی ہے -

پرہیز و ہدایات :- بادی اور ترشی سے پرہیز کریں - کھٹائی،
 مرج اور تیل نہ کھائیں - دودھ، مقوی پھل، بادام، پستہ، اخروٹ
 وغیرہ کا استعمال کریں - صبح و شام مناسب ورزش یا ہوا خوری کریں -
 اپنے خیالات کو درست رکھیں - فاسد اور عاشقانہ خیالات کو جاگزیں

نہ ہونے دیں۔ مہاشرت سے پرہیز کریں۔ سنگھاڑا خشک پیس کر شکر و

گھی ملا کر ادرمیوہ جات ڈال کر حلوا بنائیں اور روز صبح کو کھایا کریں۔

علاج :- (۱) اگر کثرت جماع کے باعث نامردی ہو گئی ہو،

دھات پتلی ہو، جریان کی شکایت ہو جس سے قوت باہیہ بہت ضعیف

ہو گئی ہو، احتلام ہو جایا کرتا ہو تو ادنیاسٹائیوا مدرٹشکچر کے بیس قطرے

فی خوراک گرم پانی میں دن میں تین بار دیں۔

(۲) اگر مشت زنی یا اغلام کے باعث استادگی میں کمی ہو گئی ہو۔

جماع کے وقت عضو مخصوص دفعہ ڈھیلا ہو جاتا ہو۔ پاخانہ یا پیشاب کے

ساتھ منی نکل جاتی ہو تو ایسڈ فاس $\times$ ۳۳ دن میں تین بار دینا مفید ہے۔

(۳) جلق سے پیدا شدہ کمزوری، احتلام و جریان کی شکایت ہو۔

جماع کے وقت یا جماع کے بعد سانس پھولنے لگے۔ خواہش نفسانی

زیادہ ہو، استادگی کم یا کمزور ہو تو ٹشکچر سیکس ناگرا تیس یا چالیس قطرہ

فی خوراک دن میں چار بار دینا بہت مفید ہے۔

(۴) اگر عورت کو دیکھتے ہی انزال ہو جاتا ہو، جلق یا اغلام کی

وجہ سے نامردی یا کمزوری ہو گئی ہو۔ خواہش جماع زیادہ ہو مگر طاقت عمل

ندارد۔ بغیر شہوانی خیال کے مزی کا اخراج ہو جاتا ہو تو کو نیم بہت مفید

دوا ہے۔ اگر انزال کے وقت عضو میں چا تو لگنے کے سے دہستے ہوں

تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۵) اگر سرعت انزال کی شکایت ہو، استادگی میں کمی ہو، چلنے میں

یا پیشاب پاخانہ میں مزی خارج ہو جاتی ہو تو سلینیم $\times 6$ ہر دو گھنٹہ بعد دیں۔
(۶) اگر مریض میں نئی کافی ہو مگر قوت باہ کو بھڑکانے کی ضرورت ہو
تو یوہم بنیم $\times 1$ کی دو تین خوراکیوں سے باہ بھڑک اٹھتی ہے۔

(۷) بوڑھے لوگوں میں جن کو خواہش جماع زیادہ ہو مگر قوت مباشرت
ندارد۔ فوطے لٹکے ہوئے ہوں۔ عضو مخصوص ڈھیلا ہو تو لائیکوپوڈیم دوا
ہے۔ اگر مریض کو وعدہ میں ریاچی تکلیف زائد معلوم ہوتی ہو تو یہ دوا اور
بھی عمدہ کام کرتی ہے۔

(۸) اگر نوجوان آدمی قبل از وقت بوڑھے معلوم ہوتے ہوں، خواہش
جماع میں کمی ہو گئی ہو، فوطے لٹک گئے ہوں۔ عضو ڈھیلا ہو گیا ہو، احتلام
بھی ہو جاتا ہو تو آگنس بہت مفید ہے۔ بار بار سوزاک ہو جانے کے بعد
باہیہ کمزوری کے لیے یہ خاص دوا ہے۔

(۹) قوت باہ کی کمزوری نیز اعصابی کمزوری کے لیے اکثر
ڈاکٹروں نے آر کافی ٹنیم $\times 3$ سے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اس کے استعمال سے بوڑھے بھی جوان معلوم ہونے لگتے ہیں۔
(۱۰) بایو کیمیک میں کالی فاس اور کلکیر یا فاس یکے بعد دیگرے دینا
بہت مفید ہے۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کرس دامیکا۔ چائنا۔ ڈاٹسکوریہ۔
تھوجا۔ کیلیڈیم۔ ادوری جنم۔ ڈمیانہ۔ سیپیا۔ سلفر۔ پیرک ایسڈ۔ حلسمیم۔
وغیرہ نہایت اہم دوائیں ہیں۔

ورم مثانہ

CYSTITIS

اسباب :- مثانہ پر چوٹ لگنا، مثانہ میں پتھری، مرض سوزاک، پیشاب کا رک جانا، امراض گردہ، امراض مفاصل، ذیابیطس اور تیز گرم اشیاء کا استعمال وغیرہ۔

علامات :- مثانہ میں درد ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے مگر پیشاب مقدار میں کم ہوتا ہے۔ پیشاب بدبودار اور گندلا ہوتا ہے یعنی اس میں بلغم اور خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کو تھوڑی دیر تک رکھا رہنے دیں تو پیشاب میں مواد نمایاں طور پر نظر آتا ہے جو کہ ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالنے سے تانگے کی طرح تار سا بندھ جاتا ہے۔ کبھی پیشاب قطرہ قطرہ ہوتا ہے۔ پیشاب میں تلچھٹ تہ نشین ہو جاتا ہے۔ شدت مرض کی حالت میں درد گردوں اور پیشاب کی نالی تک پھیل جاتا ہے۔ بخار، غفلت، متلی اور قے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ اگر علاج میں تساہلی کی جائے تو ہڈیاں اور تشنج وغیرہ شروع ہو جاتا ہے اور مریض مشکل سے بچتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مقام درد پر سینک کریں یا مثانہ پر گرم پانی دھاریں یا مریض کو بار بار آب گرم میں بٹھائیں۔ آتش جو جس قدر بھی مریض پی سکے پلائیں تاکہ پیشاب صاف اور کھل کر ہونے لگے۔

درد، ساہودانہ یا مونگ کی دال کا پانی بھی دیا جاسکتا ہے۔ شراب، چائے، ترش اور مسالہ دار اشیاء سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر سوزاک کے باعث مثانہ میں درد ہو گیا ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر لیکن اس حالت میں بچکاری کا استعمال بند کر دیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں اگر مثانہ کا مقام چھونے میں حد درجہ ذکی احساس ہو۔ پیشاب سرخ رنگ کا اور گرم ہوتا ہو تو بیلا ڈونا دینا چاہیے۔

(۲) بیلا ڈونا کے فیل ہو جانے پر کینتھرس دینا مفید ہے۔ کینتھرس دوا اس وقت کام کرتی ہے جبکہ سوزاک یا درد گرمہ کے باعث مثانہ میں درد ہو گیا ہو، پیشاب شکل سے قطرہ قطرہ ہو۔ پیشاب کے وقت پر احساس ہو کہ جلتا ہوا سیسہ اندر سے ہو کر نکل رہا ہے۔ سخت جلندار اور کاٹنے والا درد ہوتا ہو، پیشاب گندلا اور خون آمیز ہو۔

(۳) دوسری دوا یعنی کینتھرس کے بعد کن بس انڈکا دینا چاہیے اس میں سخت قسم کا درد ہوتا ہے۔ درد پیشاب کرنے سے قبل، پیشاب کے دوران نیز پیشاب کے بعد تک ہوتا ہے۔ پیشاب کے لیے مریض کو زور لگانا پڑتا ہے۔ اکثر گرمہ کی تکالیف بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔

(۴) اگر بوڑھے لوگوں کو درد مثانہ کی شکایت ہو جائے۔ پیشاب کی ہر وقت ہرجا جت رہتی ہو تو ایکوسٹیم بہت مفید ہے۔

(۵) اگر پیشاب قطرہ قطرہ ہو جس میں مواد اور خون پایا جائے۔

مٹانہ میں چھونے سے دکھن اور دروہو، پیشاب کرنے میں سپینہ نکل آئے۔
پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہو۔ پیشاب سیاہی مائل، گندلا، رسوب ملا
اور سوزش پیدا کرنے والا ہو، پیشاب قطرہ قطرہ ہوتا ہو اور اس میں نقص
ہو تو مرک کار مفید ہے۔

(۶) پیشاب کرنے کی حاجت برابر قائم رہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ ہو
گاڑھا مواد نکلے، رات کو نیند نہ آتی ہو۔ جلد پر دانے نمودار ہوں یا
خارش ہوتی ہو، بواسیری مزاج ہو۔ پیشاب کے بعد بھی درد قائم رہے
تو سلفر دینا چاہیے۔

(۷) مٹانہ اور پیشاب کی نالی میں پیشاب کرتے وقت جلبن ہو، پیشاب
رک جائے یا قطرہ قطرہ ہو، پیشاب دھوئیں کا سا میللا ہو یا خون آمیز ہو، مٹانہ
ذکی الحس ہو تو ٹریٹھنا مفید ہے۔ چنگ اور جلبن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔
(۸) درم مٹانہ کے پہلے درجہ میں باؤکیمیک میں فیرم فاس بہت عمدہ دوا
ہے مگر دیرینہ درم مٹانہ میں کالی میوراکسیر ہے۔ ان دونوں دواؤں کو
باری باری دینے سے بھی عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سیپیا۔ سلفر۔ نکس و امیکا۔
پلساٹیل۔ لائیکو۔ چما فیللا اور ایپس وغیرہ بہت ضروری اور مفید دوائیں
ہیں۔ حسب علامت دیں۔

اگر مندرجہ صدر تمام ادویہ میں تمام علامات نہ ملتی ہوں تو یو ا ا ر سی،
کو پے وا۔ ٹیرنٹولا۔ ایسڈ فاس اور آرسنک کی طرف توجہ کریں۔

باب دہم

امراض اعصاب

گٹھیا بائی

RHEUMATISM

اسباب :- سردی لگ جانا۔ بارش میں بھیگ جانا۔ قبض۔ کسی سمیت یا زہر کا خون میں سرایت کر جانا، کثرت شراب نوشی، ناقص غذا اور مرض سوزاک یا آتشک وغیرہ۔ کبھی یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔

علامات :- یہ مرض عموماً ادھیڑ عمر کے بعد ہوا کرتا ہے اور عورتوں کی بہ نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک یا کئی جوڑوں میں آگرن درد، چمکن ہو، سوجن ہوتی ہے۔ جسم کے ریشہ جات میں ایسا درد ہوتا ہے کہ مریض کو چلنا پھرنا دو بھر ہو جاتا ہے۔ بعض وقت ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک زائل ہو جاتی ہے۔

شدید حالات میں جوڑوں میں بد وضعی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض وقت جوڑوں میں اس درجہ ذکی احساس ہوتی ہے کہ کپڑے کا چھونا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کبھی لرزہ کے ساتھ بخار بھی آ جاتا ہے جو بعض وقت ۱۰۴ ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ بد بودار پسینہ نکلتا ہے اور پیشاب نہایت تیز رنگ کا آتا ہے۔ بعض وقت اس مرض کے ساتھ دیگر امراض بھی مثلاً کھانسی، درد پیلو اور ہڈیاں وغیرہ ہو جایا کرتے ہیں۔ گٹھیا کی بیماری میں اگر دل بھی مبتلائے مرض ہو جائے تو سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ گٹھیا کا درد بعض وقت ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- حتی الوسع مریض کو سردی سے محفوظ رکھیں،

ماؤ ذہ حصص پر بار بار سینک کریں۔ گرم کپڑے مریض کو پہنا دیں۔ باہر یعنی شبنم میں مریض کو نہ لیٹنے دیں۔ اس مرض میں قبض ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ غذا نہایت لطیف اور مقوی کھائیں۔ دودھ، مکھن اور گھی کا استعمال خوب کریں۔ دودھ میں تھوڑا سا سوڈا واٹر ملا کر پیائیں۔ اگر سوڈا واٹر نہ مل سکے تو لائم واٹر یعنی چونے کا پانی ملا کر پیئیں یا نصف آتش جو ملا کر بھی پینا بہت مفید ہے۔ سیٹھی اشیاء اور شراب سے پرہیز رکھیں۔ گوشت، ترشی اور بادی اشیاء کا استعمال مضر ہے۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں اکونائٹ دینے سے عموماً

تکلیف دفع ہو جایا کرتی ہے یا شدت میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ ہر دو گھنٹہ بعد دینا چاہیے۔

(۲) اگر اکونائٹ کسی وجہ سے فیل ہو جائے یا مکمل طور پر شفا دینے سے قاصر رہے۔ اور مریض کو حرکت سے تکلیف ہوتی ہو، منہ اور زبان خشک ہو، پیاس زائد ہو نیز قبض ہو تو برائی ادویا بہت مفید ہے۔

(۳) اگر بھیگ جانے سے گٹھیا کا مرض ہو گیا ہو، پیٹھ میں بھی اکڑن پائی جائے، حرکت کرنے سے سکون رہتا ہو۔ آرام کرنے یا لیٹنے کی حالت میں درد میں شدت ہو جاتی ہو۔ مقام ماؤفہ سرخ ہو گیا ہو تو رٹاکس دینا چاہیے۔

(۴) اگر بالمشل دوا کے انتخاب میں دشواری ہو اور گٹھیا کے دورے سے مریض بے چین ہو رہا ہو تو ارٹیکا یورنس مدر ٹنکچر کے پانچ پھل بوند گرم پانی میں ملا کر ہر دو گھنٹہ بعد دینے سے پیشاب زیادہ مقدار میں آنے لگتا ہے جس میں یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے جس سے درد کو فوراً سکون ہو جاتا ہے۔

(۵) اگر تمام جوڑاؤں ہو گئے ہوں۔ گرم چیز لگانے سے یا گرم کمرہ میں رہنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ مریض ٹھنڈی اور کھلی ہوا کو پسند کرتا ہو تو پلسا ٹیلا جادو کا سا کام کرتا ہے۔ اس کے درد بعض وقت منتقل بھی ہوا کرتے ہیں۔

(۶) اگر متعفن پسینہ آتا ہو، رات کے وقت جوڑوں میں، سر میں اور بازو و ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہو، قبض ہو یا مریض کو بار بار

پاخانہ کا وسواس ہو تو مرک سال بہت مفید ہے۔

(۷) اگر یہ مرض مزمن ہو گیا ہو یا بہترین منتخب شدہ ادویہ اپنا فعل انجام دینے سے قاصر رہی ہوں تو سلفر کی ادبھی خوراکیں بہت عمدہ کام کرتی ہیں۔ اس دوا کو دوسری دواؤں کے ساتھ میں بھی دورانِ علاج دے سکتے ہیں۔

(۸) باپو کیمک میں نیٹرم سلفٹ اس مرض کی عمدہ دوا ہے اس کو فرم فاس کے ساتھ باری باری دینا اور بھی مفید ہے۔ شدت درد کی حالت میں گنیٹیا فاس ۶ x بھی دیں۔

(۹) دیگر ادویہ جو نہایت اہم اور ضروری ہیں وہ سٹی سی فوگا، کاشکم، ایپس، لیڈم، آئیوڈیم، کالمیا، نکس و امیکا، سیلا ڈونا، چائنا، آرنیکا، لائیکو، کاپچیکم، سلیسک ایسڈ اور کالی آئیوڈائیڈ وغیرہ ہیں۔ حسب علامت دیں۔

اشارات :- (۱) ٹھنڈک سے آرام ہو۔ پلسا ٹیلا، تھو جا۔
(۲) گرمی سے آرام ہو۔ آرنیکا، کاشکم، لائیکو، مرک سلفر، رٹاکس۔

(۳) درد پاؤں سے اوپر کو جائیں۔ لیڈم۔

(۴) درد اوپر سے نیچے کو جائیں۔ کالمیا۔

(۵) درد منتقل ہونے والے۔ ایکی نیشیا۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔

کاپچیکم۔ برائی اونیا۔ چائنا۔

(۶) درد جن کو دبانے سے آرام ہو۔ سیلا ڈونا۔ رٹاکس۔ پساٹلا۔

(۷) جوڑوں میں درم اور بدنائی۔ آئیوڈیم۔ رٹاکس۔ سلفر۔

نوٹ :- بعض ڈاکٹروں نے سٹیریا میڈیا 2×2 اندرونی طور پر دے کر

گٹھیا بانی کے مرض میں بہت کامیابی حاصل کی ہے۔ خارجی طور پر مدرنکچر کو

ہموزن روغن زیتون میں ملا کر لگانا مفید ہے۔

نقرس

GOUT

(چھوٹے جوڑوں کا درد)

(انیزدیکو گٹھیا بانی)

اسباب :- یہ مرض عموماً موروثی ہوتا ہے جو اکثر چالیس برس کی

عمر کے بعد ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ موروثی حالت میں کسی عمر میں ہو سکتا

ہے۔ گوشت، کیاب اور مرغن اشیاء کا کثرت استعمال، کثرت شراب نوشی،

مزمن بد ہضمی، سیسہ کا زہر، امراض گردہ و جگر، سردی سرایت کر جانا،

مرطوب ہوا کا لگنا، زرخ و غم، تھکان اور غلبہ خون وغیرہ اس کے خاص

اسباب ہیں۔

علامات :- نقرس چھوٹے جوڑوں کا درد ہے جو اکثر داہنے پیر

کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے لیکن داہنے پیر پر موقوف نہیں

دونوں پیروں کے انگوٹے بھی بعض وقت ماؤف ہو جاتے ہیں۔ کبھی درد ایڑی میں ہوتا ہے یا ٹخنہ کے جوڑ میں۔ دن کو تو درد میں کمی رہتی ہے مگر رات میں درد کا دورہ نہایت شدید ہوتا ہے۔ بخار ہو جاتا ہے۔ ماؤفہ جوڑ سسرخ اور متورم ہو جاتا ہے بعض وقت ذکی کسی حد درجہ ہوتی ہے۔ ماؤفہ حصہ پر کپڑا چھوا جانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں کھینچتی ہیں یا ان میں سرسراہٹ معلوم ہوتی ہے اور سر میں درد اور چکر معلوم ہوتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی۔ جب یہ مرض ایک بار ہو جاتا ہے تو عموماً زندگی میں بار بار ستا کا ہے۔

نوٹ:- اس مرض میں جسم میں یورک ایسڈ بکثرت خون میں دورہ کرتا ہے۔ جو قلوں کی شکل میں جوڑوں میں تہ نشین ہو کر اس مرض کا باعث بنتا ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی سے خون کسی قدر گاڑھا ہو جاتا ہے جس سے دوران خون میں ابتری پڑ جاتی ہے۔ جب نقرس کا مادہ دل و دماغ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو نتیجہ عموماً خراب ہی ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات:- مریض کو قبض نہ ہونے دیں۔ ماؤفہ جوڑ کو قدرے اونچا رکھیں یا ماؤفہ ٹانگ کو ایک تکیہ پر رکھ لیں اور گرم روئی سے سینک کریں۔ شراب کا نام نہ لیں۔ ہلکی اور زود ہضم اشیاء کا استعمال کریں۔ سرکہ، اچار، گوشت، کباب، کوفتہ، پوری، پلاٹھا، چاء اور قہوہ وغیرہ اشیاء سے پرہیز رکھیں۔ دودھ، دہی اور کھن کثرت سے استعمال کریں۔ پالک کا ساگ کھائیں یا سبز ترکاریاں

اور دیگر ساگ پات کھائیں۔ اگر مریض کو گوشت کی بہت خواہش ہو تو پرندوں کا گوشت دیا جاسکتا ہے۔ زیادہ میٹھا اور زیادہ نمک کا استعمال مضر ہے۔ چنانچہ زیادہ شیریں پھل مثلاً میٹھا آم۔ خوبوزہ۔ کھجور اور سیب و انگور کا کھانا بھی مناسب نہیں۔

علاج :- چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں درد۔ جوڑوں پر درم۔ اختلاجی کیفیت۔ پیشاب میں تیزبو مثل گھوڑے کے پیشاب کے ہو تو نائٹرا لیسڈ نہایت مفید دوا ہے۔ مزمن حالت میں بھی اچھا کام کرتی ہے۔

(۲) حاد یا مزمن حالتوں میں، جوڑوں میں درد اور سوجن اور سرخی ہو۔ حرکت سے یا دہانے سے تکلیف ہو، چھونے سے درد بڑھ جائے۔ شام کو اور رات کو زیادتی ہو جائے تو چائنا بہت مفید ہے۔

(۳) اگر جسم کے اکثر جوڑے متورم اور سرخ ہو گئے ہوں جن میں جلندار قسم کا سخت اور کاٹنے والا درد ہوتا ہو، مریض کو بخار بھی ہو۔ چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو تو کاپچیکم جادو کا سا کام کرتا ہے۔

(۴) اگر جوڑوں پر درم، سرخی اور درد ہو چھونے سے تکلیف نہ بڑھتی ہو مآؤف حصہ میں ٹھنڈک کا احساس ہو۔ بستر کی گرمی سے درد بڑھ جاتا ہے، درد نیچے سے اوپر کو جاتا ہو تو لیدم دینا چاہیے۔

(۵) اگر درم سرخ اور چمکدار ہو یا گٹھاری کا ٹھیس پڑ گئی ہوں۔ ذرا سا چھونے سے یا حرکت سے تکلیف بڑھ جاتی ہو مآؤف حصہ میں بھاری پن کا احساس ہو۔ درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں منتقل ہوتا رہے تو

سببنا بہت مفید ہے۔ بعض وقت اس میں داہنی ٹانگ میں ٹھنڈک کا احساس بھی دیکھا جاتا ہے۔

(۶) اگر گٹھیادی گانٹھیں پڑ گئی ہوں، جوڑ متورم ہو۔ مریض کا مزاج گٹھیادی ہو یا نفرس کا مرض پرانا ہو گیا ہو (حاد مرض میں یہ دوا بہت کم استعمال ہوتی ہے) تو اونیافاس سے عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۷) مزین نفرس میں جبکہ درد کے دودوں کی نوعیت بدلتی رہے۔ کمزوری زیادہ ہو جائے ایسا معلوم ہو کہ غش آ جائیگا تو دیکھی ٹیلیس کی ادبھی طاقتیں مفید ہوا کرتی ہیں۔

(۸) با یو کیمیک میں نیٹرم سلف اور نیٹرم فاس باری باری سے دینا چاہیے۔

(۹) مندرجہ بالا دواؤں کے علاوہ سلفر، سٹانی سیکریا، گوانکم اور پلسا ٹیلا نہایت اہم دوائیں ہیں۔ ان ادویہ کے بعد آرنیکا۔ اسٹی لیگو، التحیم کارب، بربرس اور لائیکو کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

عرق النساء

(لنگڑی کا درد)

SCIATICA

اسباب: گٹھیابی یا نفرس کے مادہ کا جسم میں موجود ہونا۔

آتشکی مادہ - سردی سرایت کر جانا - مزمن قبض - مادہ سوزناک - امراض
مقعدہ وغیرہ -

علامات :- اس کا درد سرین (چوڑا) سے شروع ہوتا ہے اور
گھٹنے کے پچھلی طرف ٹانگ میں ہوتا ہوا پاؤں کی انگلیوں تک پہنچتا
ہے - چلنے پھرنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے - گھوما
حرکت سے یا دبانے سے درد میں زیادتی ہو جاتی ہے - اس کا درد
رفتہ رفتہ شروع ہوتا ہے اور پھر نہایت شدید ہو جاتا ہے - لیکن
کبھی درد یکایک بھی ہو جایا کرتا ہے - اگر اس کے علاج میں تساہلی
برتی جائے اور مرض مزمن شکل اختیار کر لے تو ٹانگ لاغر اور کمزور ہو جاتی ہے -
نوٹ :- دراصل نساہ نام ہے ایک رگ کا جو سرین (چوڑا) سے
کے کرٹھے تک جاتی ہے چونکہ درد کا مادہ اسی رگ میں ہوتا ہے اس لیے
اس درد کا نام عرق النساء پڑ گیا - حالانکہ دراصل یہ درد کسی رگ میں نہیں ہوتا
بلکہ عصب میں ہوتا ہے -

پرہیز و ہدایات :- مریض کو سردی سے بچائے رکھیں - مادہ
ٹانگ کو بار بار سینگیں - سرد یا مرطوب جگہ پر مریض کو نہ بیٹھنے دیں قبض
کسی حالت میں رہنا مناسب نہیں - چنانچہ اس کے لیے نہایت ہلکی اور
زود ہضم غذا کھائیں - شراب، گوشت اور کوفتہ و کباب سے پرہیز رکھیں -
مقام درد پر گرم استری یعنی لوہا (قابل برداشت) آہستگی سے پھرائیں -
اگر لوہا کیے والی استری میسر نہ آئے تو امینٹ کو گرم کر کے صاف کپڑے

میں لپیٹ کر ماؤفہ ٹانگ پر پھرائیں۔

علاج ۱۔ (۱) اگر جلد ار اور بچٹن کا سادرد ہو آرام کرنے سے زیادتی ہوتی ہو۔ البتہ حرکت سے وقتی سکون ہو جاتا ہو اور گرم سینک سے بھی کمی ہو جاتی ہو، سرد اور مرطوب موسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہو یا بارش میں بھیگنے کے باعث عرق النساء کی شکایت ہو گئی ہو تو رشاکس عمدہ دوا ہے۔ رشاکس میں درد کمز بھی ساتھ ساتھ زیادہ ترکیبوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔

(۲) اگر درد کوٹھے سے ران تک جاتا ہو۔ درد دورہ کی قسم کا ہو جو یکایک آتا ہو اور یکایک کم ہو جاتا ہو۔ ٹھنڈک سے اور چلنے پھرنے سے درد بڑھ جاتا ہو۔ اعضاء میں جکڑن کا احساس ہو۔ گویا شکنجہ میں کسے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہونے سے آرام ملتا ہو تو کالوسنتھ دوا ہے۔ دبائے سے اور سینکنے سے درد کا کم ہو جانا بھی اس دوا کی ایک خاص علامت ہے۔

(۳) درد جلد ار اور پھاڑنے والا ہوتا ہو۔ شدید بے چینی اور پیاس پانی جائے۔ مریض یکایک کمزور ہو جاتا ہو۔ درد کو سینکنے سے آرام ہو ٹھنڈک سے درد بڑھ جاتا ہو۔ درد نوبت بہ نوبت ہوتا ہو یعنی تکلیف ہر روز، ہر تیسرے یا چوتھے روز، ہر پندرہویں دن، ہر چھ ماہ بعد یا ہر سال ظاہر ہوتی ہو تو آرسنک بہت مفید ہے۔

(۴) عرق النساء جس میں درد اور سُن ہونا یکے بعد دیگرے پایا جائے۔ ساری ٹانگ کا ماؤف ہونا معلوم ہوتا ہو۔ حرکت سے اور لیٹنے سے درد

بڑھتا ہو۔ البتہ کرسی پر بیٹھنے کی حالت میں کم ہو جاتا ہو ٹانگیں اوپر کو کھینچنے سے یا ان کو پیٹ کے ساتھ لگانے سے درد میں کمی ہوتی ہو تو نفائل دینا چاہیے۔ اس کی اکثر علامات کالوسنتہ سے ملتی جلتی ہیں۔

(۵) مزمن کیفیت میں جبکہ بلند اور سوئیاں چھنے کے سے درد ہوتے ہوں، داہنی ٹانگ میں تکلیف زیادہ ہو۔ رات کے وقت آرام کرنے کی حالت میں تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ حرکت سے کسی قدر سکون مل جاتا ہو۔ مریض ماؤفہ حصہ کے بل لیٹ نہ سکتا ہو، تو لائیکو پوڈیم دوا ہے۔ داہنی جانب کے عرق النساء کے لیے یہ خاص دوا ہے۔

(۶) عرق النساء جس کی زیادتی بیٹھی ہوئی حالت میں اور کمی لیٹ جانے سے ہو، جوڑوں میں کچاؤ ہو جس سے بعض وقت مریض کو جھک کر چلنا پڑے، مریض کو یہ احساس کہ جیسے جوڑ بند چھوٹے ہو گئے ہیں، تو امونیا میور خاص دوا ہے۔ شدید اور لمبے کیسوں میں یہ دوا اور بھی عمدہ کام کرتی ہے۔

(۷) اگر عرق النساء کا سبب آشکی مادہ ہو۔ سینکے سے درد میں کمی ہوتی ہو۔ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک درد میں زیادتی رہتی ہو۔ پنڈلیوں میں حد درجہ ذکی احمسی ہو تو سفلیئم کی اونچی طاقتیں مفید ہوا کرتی ہیں۔

(۸) باؤ کیمک میں کالی فاس اور گنیشیا فاس یکے بعد دیگرے دینا بہت مفید ہے۔

(۹) ہندو جہر ادویہ کے علاوہ ذیل کی ادویہ نہایت ضروری اند

اہم ہیں۔ اکونائٹ۔ نکس و امیکا۔ پلسا ٹیلا۔ کالی آئیو ڈائڈ۔ سلفر۔
کلکیریا۔ کاسٹکم۔ آرنیکا۔ بیلا ڈونا۔ سمی سی نوگا اور کیمولہ۔

اعصابی درد

NEURALGIA

اسباب :- اعصابی کمزوری، عصبی خراش، مرض آتشک،
امراض مفاصل، نقرس، مزمن قبض، کثرت شراب نوشی، کثرت جماع،
کثرت محنت، عام کمزوری، کمی خون، پارہ یا سیسہ وغیرہ کا زہر، سردی
لگنا، ملیں یا اور بد مضمی وغیرہ۔

علامات :- یہ درد عموماً چہرہ، ابرو، آنکھ کے ڈھیلے، رخسار،
ٹھوڑی یا جبڑہ میں ہوتا ہے۔ سر میں بھی اعصابی درد ہوتا ہے اور یوں
جسم کا کوئی حصہ بھی ماؤف ہو سکتا ہے۔ یہ درد دراصل عضلات یعنی گوشت
یا ہڈی میں نہیں ہوتا بلکہ اعصاب میں ہوتا ہے۔ یہ درد عموماً دورہ کی شکل
میں اٹھتا ہے اور اس قدر شدید اور نشتر لگنے کا سا ہوتا ہے کہ مریض کی
جان پر بن آتی ہے۔ اگر مرض پُختا ہو جاتا ہے تو درد کا دورہ ہفتوں یا
مہینوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بعض حالات میں درد کے ساتھ ماؤف عضلات
ایٹھ جاتے ہیں۔

نوٹ :- اعصابی درد سے مراد اس قسم کا درد ہے جس کا کوئی ظاہر سبب

معلوم ہو یعنی ماؤذ حصہ پر کسی قسم کی سوزش اور درم نہ ہو۔ درد بچائے گوشت کے عصب ماؤذ میں ہوتا ہو۔ درد دفعۃً اٹھتا ہو اور اسی طرح غائب بھی ہو جاتا ہو۔

پرہیز و پدایات :- اصل سبب مرض کو دریافت کریں۔ اگر بد ہضمی اس کا باعث ہو تو اس کا تدارک کریں۔ آتشک، طیریا، گٹھیا ہائی وغیرہ کے سبب سے ہو تو مناسب پرہیز اور علاج کریں۔ (جسے دیکھو اپنے موقع پر) ترشی۔ بادی اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ سر میں درد کی حالت میں پاؤں کی مالش کروانے سے اکثر فائدہ ہو جاتا ہے۔

علاج :- (۱) دورہ کے ساتھ درد، آنکھوں میں، گال کی ہڈی میں یا برو میں درد ہو یا درد گدی سے شروع ہوتا ہو، درد ہر روز وقت مقررہ پر ہوتا ہو یا آفتاب نکلنے کے وقت سے شروع ہو کر دوپہر تک بڑھے اور اس کے بعد گھٹے۔ درد میں مرطوبیت سے یا دبانے سے زیادتی ہو جاتی ہو، بائیں جانب خاص طور سے ماؤذ ہو تو سپائی جیلیا دینا چاہیے۔ یہ اس مرض کی ایک اہم دواؤں میں سے ہے۔

(۲) اگر سردی سے اعصابی درد (خصوصاً چہرہ کا) ہو گیا ہو۔ چہرہ سرخ اور گرم ہو، خوف اور گھبراہٹ زیادہ ہو۔ درد کی شدت سے مریض بے چین ہو جائے تو اکوماٹھ دینا چاہیے۔ یہ دوا عموماً ابتدائی کیفیتوں میں دی جاتی ہے۔

(۳) شدید کانٹے والا درد۔ درد کنپٹی، کان، گردن تک پھیلے ناک، آنکھ کے ڈھیلے میں یا گال میں درد۔ روشنی اور شور و غل یا ٹھنڈی

ہوا سے تکلیف بڑھ جائے۔ آرام کی حالت میں اور گرمی سے سکون ملتا ہو۔
درد دفعۃً اٹھتا ہو اور دفعۃً کم ہو جاتا ہو تو سیلا ڈونا نہایت مفید ہے اگر کسی
وجہ سے سیلا ڈونا فیل ہو جائے تو اٹھو پین سلٹ نمبر ۳ دیں۔

(۴) درد جس میں گرم سوئیوں کے چھنے کا احساس ہو، ڈنک
لگنے کا سا، جلندار اور نوبتی قسم کا دورہ ہو درد کے مارے مریض ایک
جگہ قائم نہ رہتا ہو۔ درد خصوصاً آنکھ کے گرد ہو، کنپٹی میں جان ہو تو آرٹنک
کی اونچی طاقتیں دینا چاہیے۔ (بعض وقت اونچی طاقتوں میں دور کے
اثر معکوس سے تکلیف بڑھ جاتی ہے)۔

(۵) چہرہ کی ہڈی میں (خصوصاً بائیں جانب) کھنچاؤ کا درد ہو یا
رحمی تکلیفیں بھی ساتھ ساتھ پائی جائیں تو سیپیا مفید ہے۔ حل کے ایام
میں اگر عورتوں کو عصبی درد ہو جاتا ہو تو ان کے لیے اکثر و بیشتر حالات میں
یہ دوا اکیسرا کام کرتی ہے۔

(۶) شدید اعصابی درد، مریض مانند ماہی بے آب کے تڑپے۔
درد سر کی وجہ سے سر میں پسینہ نکل آئے۔ چہرہ سرخ تہمایا ہوا ہو۔ پیاس
معلوم ہوتی ہو۔ مریض چڑچڑا اور غصہ در ہو جائے، رات کو تکلیف زائد ہو
تو کیمو ملا بہت مفید ہے۔ اونچی طاقت میں دینا چاہیے۔

(۷) سر اور چہرہ میں (خصوصاً داہنی جانب) پھاڑنے والا درد ہو۔
درد جبڑے کے کنپٹی تک ہو۔ آنکھوں سے پانی بہے، مریض ٹھنڈی
اور کھلی ہوا کی خواہش کرے۔ گرم چیز کے لگانے سے تکلیف بڑھ جائے

تو پسا ٹیلا دینا چاہیے ۔

(۸) جب بہترین منتخب شدہ ادویہ ناکام رہی ہوں۔ چاند پر جلن کا احساس ہو یا دانوں کے دب جانے سے تکلیف ہو گئی ہو، جھڑ میں خاص طعد پر درد ہوتا ہو اور آنکھوں میں تکلیف ہو تو سلفر دینا چاہیے ۔

(۹) بالیو کیمک میں اگر گرمی سے (سینک سے) آرام ہوتا ہو تو گنیشیا فاس عمدہ دوا ہے۔ (اگر آنکھ یا منہ سے پانی بھی آتا ہو تو نیٹرم میور دوا ہے) ٹھنڈ لگ جانے سے یا تھماہٹ اور بخار کی حالت میں فیرم فاس اور گنیشیا فاس باری باری دینا چاہیے۔ کمزور اعصابی اور کمی خون والے مریضوں کے لیے کالی فاس عمدہ دوا ہے۔

(۱۰) دیگر ادویہ جو نہایت ضروری ہیں وہ کالوسنتھ، نکس دامیکا، سمی سی نوگا، رشاکس، جلیسم، کالمیا، پلانٹیکو، ور بیسم، پلاٹینا، شانی سیکریا، آئرس، کاسٹمک، چائنا اور ہائپرکیم ہیں جسب علامت باقاعدہ تشخیص کر کے دیں۔

فالج

PARALYSIS

اسباب :- مرض سکتہ، دماغ کی رسولی، مرگی، باؤگولہ، آتشک، عصبی کمزوری، ریڑھ پر چوٹ لگنا۔ حرام مغز کا ماؤف ہو جانا، کثرت جملع،

شدت کی سردی، سوزاک کے باعث مثانہ میں ورم اور خراش کا ہونا، کثرت سے نوشی، رنج و غم و تفکرات، دماغی امراض، شدید بد ہضمی، مرض گٹھیا بانی، سمیت سیسہ یا تانبا اور غلبہ بلغم وغیرہ۔

علامات و مختلف مقامات و علامات کے لحاظ سے فالج کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلاً نچلے دھڑ کا فالج یعنی PARAPLEGIA لقوہ (چہرہ کا فالج) FACIAL PARALYSIS بچوں کا فالج یعنی INFANTILE PARALYSIS سر سے پاؤں تک نصف جسم کا فالج یعنی HEMIPLEGIA وغیرہ وغیرہ۔

عضو ماؤذہ معطل اور بیکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر نصف جسم سر سے پاؤں تک ماؤذہ ہو جاتا ہے تو مریض چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔ کبھی مرض سکتہ کے ساتھ یکایک فالج ہو جاتا ہے کبھی ابتدا میں محض در دسر ہوتا ہے یا متلی وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے بعد اچانک فالج کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ماؤذہ جانب کے ہاتھ پاؤں بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہوش و حواس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر مثانہ یا رودہ مستقیم پر بھی فالج کا اثر ہوتا ہے تو پیشاب پاخانہ از خود نکل جاتا ہے یا پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ چہرہ کے فالج یعنی لقوہ میں منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ منہ سے نال ٹپکتی ہے۔ بانی پیتے وقت منہ سے پانی باہر بہہ جاتا ہے۔ ماؤذہ جانب کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ مریض نہ تھوک سکتا ہے اور نہ سیٹی وغیرہ بجا سکتا ہے جس طرف کو چہرہ کھینچا ہوا ہو وہ طرف تندہ رہتی ہے۔

نوٹ :- اس مرض میں جس قدر جلد ہو سکے علاج کیا جائے ورنہ جس قدر دیر ہوگی اُسی قدر مرض لا علاج ہوتا جائے گا۔ علاوہ دواؤں اگر گردن گئے پہلے ہر سے تیسرے ہر سے تک والا حصہ ماؤٹ ہو جائے تو فوراً ہلاکت واقع ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح جسم کے بائیں جانب کا فالج زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ قلب کے ماؤٹ ہو جانے سے مریض آن و احد میں کوچ کر جاتا ہے۔ سن ضعیفی میں بھی فالج کا حملہ عموماً جھلک ثابت ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- ابتدائے مرض میں مریض کو بالکل آرام سے لٹائے رکھیں۔ کئی روز تک غذا میں سخت پرہیز کرائیں چنانچہ تین چار روز تک سوائے شہد کے پانی کے دوسری غذا مریض کو نہ دیں قبض کا ہونا اس مرض میں ٹھیک نہیں۔ رفع قبض کے لیے انیادیں۔ مریض کو سرد ہوا سے بچائے رکھیں۔ شراب سے پرہیز کرائیں۔ مرض کی شدت کم ہو جانے پر نہایت ہلکی غذا دینا شروع کریں۔ گوشت صرف گورتیا یا کبوتر کا دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ کبوتر کا شوربہ اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ صرف نباتاتی غذا اور دودھ کا استعمال بہتر ہے۔ آب خورد (چنے کا پانی) دینا بھی بہت مفید ہے۔

ترکیب ماء العسل (شہد کا پانی) :- شہد ایک حصہ لے کر دو حصہ پانی میں جوش دیں۔ جب تہائی حصہ پانی باقی رہ جائے چھان کے کام میں لائیں۔ اگر خالص شہد میسر نہ آئے تو اسی مقدار میں شکر ملائیں۔

علاج ۱۔ (۱) اس مرض کی سب سے اہم دوا کا حکم ہے۔
اکثر و بیشتر حالات میں یہ دوا عمدہ کام کرتی ہے۔ اس دوا میں واحد
عضو کا فالج خصوصیت سے دیکھنے میں آتا ہے مثلاً ادھرنگ ، لقوہ ،
زبان کا فالج ، ٹانگوں کا فالج ، شانہ کا فالج ، کھلات نطق کا فالج وغیرہ
جس میں تشنج ، رعشہ اور بے چینی وغیرہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ زبان اور
چہرہ کے فالج کے لیے یہ دوا نہایت شہرت حاصل کر چکی ہے۔

(۲) بوڑھے لوگوں پر فالج کا حملہ ہو یا سکتے کے بعد فالج ہو جائے
یا اگر جوانوں میں چہرہ کا فالج (لقوہ) ہو جائے یا زبان مفلوج ہو جائے،
یا دماشی فالج ہو جائے جس سے قوائے عقلیہ کا کارہ ہو جائیں تو بریاکار
عمدہ دوا ہے۔

(۳) اعصاب مفلوج ہوں۔ ہاتھ پیر یا تمام جسم کا نپے یعنی رعشہ
کی کیفیت ہو، کمزوری اور غفلت پائی جائے تو جیسیم دوا ہے۔ بچوں کا
فالج اور آنکھ عضلات کا فالج بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اگر جذبات یا
بری خبر سے مفلوجیت پیدا ہو جائے تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔
لرزہ یا کانپنا اس دوا کا مخصوص نشان ہے۔

(۴) اوپر یا نیچے دھڑکا فالج جس میں حرکت یا احساس ختم ہو جائے
ماؤفہ حصص جلد از جلد سوکھ جائیں اور لاغر ہوتے جائیں مریض کے جسم
میں جستی چالاکی بالکل ناپید ہو جائے یہاں تک کہ آنکھیں یا سبزہ میں بے حسی
کے باعث مریض کو پاخانہ نہ ہوتا ہو، زبان بھاری ہوگئی ہو، پاخانہ مثل

مٹی کے ہوتا ہو تو پلیم بہت مفید ہے۔ عیشہ مع فاج بھی اس دوا کے زہر اثر آتا ہے۔

(۵) سکتہ کے بعد فاج یا شرابیوں یا بڑے لوگوں کا فاج یا پیشاب دپا خانہ رک جانے سے فاج کا حملہ ہو۔ مریض کی آنکھیں نیم کھلی ہوں۔ نیند میں خراٹے لے۔ پیشاب بند ہو جائے تو ادیکم مفید ہے۔

(۶) رات کو برابر جاگنے پر یا رنج و غم یا دماغی جذبات سے فاج ہو، ہشکر کل مزاج ہو تو اگنیشیا دینا چاہیے۔

(۷) اگر مرطوب جگہ پر لیٹنے سے یا بھیگ جانے سے فاج ہو گیا ہو، یا مریض گٹھیاوی مزاج ہو تو ریشاکس عمدہ دوا ہے۔ بخاروں سے پیدا شدہ جسم کے نچلے حصے کا فاج یا بائی کا فاج، پیپوٹوں کا فاج، اور مفلوج حصص کا سن ہو جانا اس دوا میں پایا جاتا ہے۔

(۸) باپیکیمکس میں کالی فاس اور مگنیشیا فاس باری باری سے دینا بہت مفید ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ صلفر۔ فاسفورس۔ کونیم۔ آرسنک۔ چائنا۔ لیکسیس۔ سٹانم۔ نکس و امیکا۔ اکوناٹ۔ کیوپرم۔ سیپیا۔ اور کالی کلور بہت ضروری اور اہم ہیں۔

تشنج

CONVULSION

(بچوں میں تشنجی دورہ کے لیے دیکھو ام الصبیان کے دورے حصہ دوم کے باب سوم میں)

اسباب :- مرگی، مرض کزاز، بعض دماغی امراض مثلاً صدمہ، خوف، تشدد، غصہ، یوریمیا یعنی سمیت بول، قبض، بچوں میں پیٹ کے کیڑے، دانت نکلنا، کمی خون دماغ، ایام حمل، فتور حیض، سردی لگنا، آتشک یا سوزاک کے اثرات مابعد، کثرت جماع اور شست زنی وغیرہ۔

علامات :- اچانک نیم بے ہوشی واقع ہو کر مریض کے ہاتھ پاؤں اور جسم کے دیگر عضلات اینٹھنے لگتے ہیں۔ جسم اکڑ جاتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو کھوم جاتے ہیں، چہرہ تھماتے لگتا ہے۔ سانس لینے میں وقت ہوتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- دورہ کے وقت مریض کو چٹ لٹا دیں، سر پر برف رکھیں یا سرد پانی دھاریں یا سر پر کپڑا رکھ کر اس کو برابر تر کرتے رہیں۔ اگر اس کے باوجود تشنج میں کمی نہ ہو تو پاؤں گرم پانی میں ڈالیں یا گرم پانی کا تڑپڑا کریں یعنی دھاریں۔ غذا میں صرف دودھ، آش جو، سا بودانہ، شوربا، مونگ کی دال کا پانی دیں۔ اگر قبض ہو تو شیان سے پاخانہ کرا دیں۔

علاج :- (۱) بچوں کے تشنج میں اگر دانت نکلنے کا زمانہ ہو تو معمولی حالت میں اگنیشیا دینا کافی ہوا کرتا ہے لیکن اگر شدید قسم کے دورے پڑتے ہوں اور بچہ چیخ اٹھتا ہو تو کیموطلا دوا ہے۔ ان دونوں ادویہ کے فیل ہو جانے پر سیلا ڈونا دینا کافی ہوا کرتا ہے۔

(۲) دانت نکلنے کے زمانہ میں بچوں کا تشنج یا خنازیری مزاج بچوں کا تشنج جبکہ کیموطلا یا سیلا ڈونا پورے طور پر شفا دینے سے قاصر رہے ہوں تو سلفراؤد کلگیر یا کارب بہت مفید ہیں صبح کو ایک خوراک سلفراؤد بعد میں روزانہ تین خوراک کلگیر یا کارب دینا زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے۔

(۳) اگر پیٹ میں کیڑوں کے باعث تشنج ہوتا ہو تو سنا دینا چاہیے۔ اگر سنا فیل ہو جائے تو مرکب دینے سے فائدہ ہوا کرتا ہے۔

(۴) اگر اچانک خوف سے تشنج ہوا چہرہ کے عضلات میں پھڑکن ہو منہ سے پھین آئے تو ہیوسمس دینا چاہیے۔

(۵) اعضاء میں پھڑکن اور کانپنا، مریض زور زور سے چیخے۔ سانس خراٹے کے ساتھ لے۔ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ خوف سے تشنج ہو تو اونیٹیم مفید ہے۔

(۶) اچانک تشنج، بخاروں میں یا ابھاروں کی حالت میں تشنج۔ اعضاء ہلنے لگیں، پیشاب اور پاخانہ از خود ہو جائے تو سٹرامونیم مفید ہے۔

(۷) مستورات میں حمل کے بام میں یا زچہ خانہ میں تشنج ہو تو سیلا ڈونا، پلاٹنا، ہیوسمس، اگنیشیا اور سٹرامونیم میں سے کوئی ایک دوا حسب علامات

دینا چاہیے۔

(۸) مستورات کو دلاوت کے وقت تشنج ہو تو کیموٹا، اگنیشیا، اپیکاک اور سیکیل میں سے کوئی دوا دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ نکس و امیکا - پیسیم - زنکم - وریٹرم - اپیکاک - کافیا - کیفر - سائیکوٹا اور پیسیم نہایت اہم اور ضروری ادویہ میں سے ہیں۔ حسب علامت دیں۔

لوکھڑائی چال

LOCOMOTOR ATAXIA

اسباب :- عام کمزوری - کثرت سے نوشی و کثرت جماع - جلق - ریڑھ میں چوٹ لگنا - مرض آشک کے اثرات مابعد - سردی لگنا - مطلب جگہ پر لیٹنا اور اعصابی کمزوری وغیرہ۔

علامات :- شروع مرض میں جسم میں جابجا درد ہوتا ہے جو عموماً دورہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ درد ٹانگوں میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سماعت اور بصارت میں کم و بیش فرق آجاتا ہے۔ پیشاب کی بھی تکالیف رونما ہو جاتی ہیں۔ پیشاب عموماً قطرہ قطرہ آتا ہے۔ اس کے بعد مریض کی دونوں ٹانگوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ مریض لوکھڑا کر چلتا ہے۔ اگر مریض اپنی آنکھیں بند کر لے تو وہ سیدھا کھڑا تک نہیں رہ سکتا بلکہ

ڈگکا کر جاتا ہے جسم کے مختلف مقامات پر سنسناہٹ سی معلوم ہوتی ہے اور جلد کی حس کم ہو جاتی ہے اور جسم کے حصے جا بجا بالکل سن ہو جاتے ہیں۔ شدید ترین حالات میں مریض فوج کا شکار ہو جاتا ہے یا گھٹنے اور کہنی وغیرہ کے جوڑ میں بدنائی پیدا ہو جاتی ہے یا ان میں مواد پڑ جاتا ہے۔ آخری درجہ میں ہاتھ بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تمام عضلات بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض اپانج کی طرح پڑا رہتا ہے۔ اس مرض کا انجام عموماً خراب ہی ہوتا ہے۔ چونکہ اس مرض کا باعث اکثر آشک ہوتا ہے اس لیے اگر ابتدائے میں نہایت صحیح ادویہ استعمال کرائی جائیں اور مناسب پرہیز سے کام لیا جائے تو شفا کی امید ہو سکتی ہے۔

پرہیز و ہدایات:- مریض کو سردی سے بچائیں، دماغی کام کرنے سے روکیں بلکہ فکر و تردد اور غم سے آزاد رہنے کی ہدایت کریں۔ جماع اور شراب نوشی بالکل ترک کرادیں۔ اگر اس کا سبب آشک ہو جیسا کہ زیادہ کیسوں میں دیکھنے میں آتا ہے تو اس کا مناسب علاج کریں (جسے دیکھو اپنے موقع پر) پیشاب بند ہو جانے پر شانہ پر ٹکور کریں۔ اگر مریض میں لڑکھڑاہٹ زیادہ پائی جائے تو بیساکھی کے سہارے چلنے کی ہدایت کریں۔ غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم دیں۔

علاج:- لڑکھڑائی چال کے لیے آر جینٹم ٹائٹ، آرسنک بنکس و امیکا۔ فاسفورس اور پیم چٹی پرکی دوائیں ہیں۔ عموماً یہ پانچوں دوائیں مرض کو قابو میں کر لیتی ہیں۔ ان ادویہ کے بعد جیسیم، پیکرک ایسڈ۔ الیومنیا۔ زنک۔

کاسٹم، بیلا ڈونا، ٹیرنٹولا اور اردو بین سلفٹ کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔

رعشہ

CHOREA

اسباب۔ امراض مفاصل، عصبی کمزوری، کمی خون، صدمہ، مادہ بلیغم اور امراض رحم و فتور حیض وغیرہ۔ یہ مرض کبھی موروثی ہوتا ہے اور کبھی اس کا کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا۔

علامات۔ اس مرض میں کوئی چیز اٹھانے سے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کے عضلات خود بخود ہلتے رہتے ہیں۔ کھڑے ہونے میں پاؤں لہرتے ہیں۔ لقمہ منہ میں لے جاتے وقت ہاتھ جھٹکا کھاتا ہے جس سے لقمہ بجائے منہ میں جانے کے بعد اُدھر اُدھر ہو جاتا ہے اور مریض بڑی مشکل سے کھانا کھا پاتا ہے۔ بعض حالات میں جب شدید حرکت ہوتی ہے تو مریض پلنگ پر ہلتا ہوا پڑا رہتا ہے ایسی حالت میں مریض کو دوسرا شخص کھانا پانی دیتا ہے۔ بولنا، کھانا، پینا یہاں تک کہ سونا دشوار ہو جاتا ہے۔ مریض کو قبض رہتا ہے اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ایام گل میں یا امراض مفاصل کے باعث یہ مرض ہو جائے تو نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔ ضعیفی میں بھی یہ مرض لا علاج ہی ہوا کرتا ہے۔

پرہیز و احتیاط۔ مریض کو آرام پہنچائیں۔ کسی قسم کی حرکت

نہ کرنے دیں۔ قبض کی حالت میں انیادے کر قبض رفع کریں۔ دماغی کام کرنے سے مریض کو روکیں، اخبار بینی اور تاش و خطر نج وغیرہ کے کھینے سے مریض کو منع کریں۔ انڈے کی زردی نیم برشت کا کھانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ہلکی غذا از قسم دودھ، شوربا، مونگ کی دال کا پانی، سا بودانہ اور کھجڑی وغیرہ دیں۔ اگر گھیا بلانی کے سبب سے یہ شکایت ہو جائے تو مریض کو گوشت قطعی نہ دیں بلکہ صرف دودھ پر رکھیں۔

علاج :- (۱) اگر یکایک خوف کھا جانے سے رعشہ ہو گیا ہو یا نوجوان لڑکیوں کو سن بلوغت کے وقت یہ شکایت ہو جائے عصبی کمزوری ہو۔ مریض مغموم رہتا ہو تو انگیشیا بہت عمدہ دوا ہے ابتدائی حالت میں یہ دوا خوب کام کرتی ہے یا کم از کم مرض کی شدت کو روک دیتی ہے۔ (۲) اگر کسی وجہ سے انگیشیا فعل ہو جائے تو کاسکم دینا مفید ہوا کرتا ہے جبکہ وجع مفاصل کے باعث یا سردی کھا جانے کے بعد یہ شکایت ہو گئی ہو۔ مریض کو بولنے میں دقت ہوتی ہو۔ ٹانگ، چہرہ، زبان اور بازو وغیرہ تمام اعضا کانپتے ہوں جس سے مریض ایک حالت میں نہ رہ سکے۔

(۳) رعشہ جس میں اعضاء ہر وقت ہلا کریں۔ ریڑھ کی ہڈی میں ذکی الحسی ہو۔ ناچ گانے سے مرض میں کمی ہو جاتی ہو تو ٹیرنٹولا مفید ہے۔ (۴) رعشہ جس میں ہاتھ اور پاؤں کے عضلات کانپیں۔ مریض کو

نیند کے دوران آرام ملتا ہو نیز جسم کے مختلف حصوں میں تشنج اور انقباض ہو تو کیو پریم بہت مفید ہے۔ رعشہ کی اہم ترین دواؤں میں اس کا شمار ہے۔
حادثہ مزمن دونوں حالتوں میں دینا چاہیے۔

- (۵) رعشہ جس میں دماغ بھی ماؤف ہو جائے۔ تمام جسم میں رعشہ ہوتا ہو۔ مریض سے مضحکہ خیز حرکات صادر ہوں تو سٹرا مونیم مفید ہے۔
- (۶) اگر بہترین منتخب شدہ ادویہ ناکام رہیں تو کلگیر یا کارب یا سلفر دینا بہت مفید ہے۔ کلگیر یا کارب کے مریض کو بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ بات کرنے میں مریض اپنی زبان کو کاٹ لیتا ہے۔
- (۷) بایو کیمک میں کلگیر یا فاس اور مگنیشیا فاس باری باری سے دینا چاہیے۔

- (۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ زنک، آرسنک، بیلا ڈونا، سائیکوٹا، سمی سی نوگا، نکس وامایکا اور وریٹرم ڈرائڈ نہایت اہم اور ضروری ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

باب یازدہم

امراض ظاہر بدن

(مفصل خارجی علاج کے لیے دیکھو کتاب مخزن خارجی علاج)

آتشک

SYPHILLIS

اسباب :- یہ ایک نہایت متعدی اور موذی مرض ہے جو چھوت سے دوسرے کو لگ جاتا ہے یعنی آتشکی عورت سے مجامعت کرنے اور اس کے ساتھ بستر میں سونے سے اور ایک ہی برتن میں کھانے پینے سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ آتشک کا زہریلا مادہ عموماً ناجائز مجامعت ہی کے وقت جسم انسانی میں سرایت کرتا ہے یا یوں سمجھنا چاہیے کہ قدرت کی طرف سے زنا کاری کی سزا آتشک کا مرض ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہوا کرتا ہے یعنی آتشکی والدین سے مولود کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں عضو تناسل پر زہریلے دانے پیدا

ہوتے ہیں۔ جن کا زہر رفتہ رفتہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض کا موجب ہوتا ہے۔ ابتدا میں اس میں مقام سرایت پر خصوصاً عضو تناسل پر ایک سخت سا آبشار شروع ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا درد وغیرہ نہیں ہوتا البتہ کسی قدر سرخی ہوتی ہے۔ اس قسم کی پھنسی پیدا ہونے کے ہفتہ عشرہ کے بعد رفتہ رفتہ جسم کے تمام غدود جاذبہ متورم ہو جاتے ہیں اور یہ کیفیت دو تین ماہ تک رہتی ہے اس کے بعد آشک کا زہر جسم کی گہرائی میں سرایت کرنے لگتا ہے۔ سر میں درد رہتا ہے حلق اور تالو متورم ہو جاتے ہیں۔ اعضاء تناسل، بازو، ران، اور شکم وغیرہ پر پھنسیاں نکل آتی ہیں جن میں مواد پڑ جاتا ہے لیکن درد، جلن یا خارش وغیرہ بالکل نہیں ہوتی اور یہی آشکی پھنسیوں کی خاص پہچان ہے۔ ایک سال کے بعد یہ مرض انتہا کو پہنچنے لگتا ہے یعنی سر کے بال گر جاتے ہیں۔ ہونٹ، منہ، زبان اور حلق وغیرہ میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ تمام جسم سرٹنے لگتا ہے۔ جابجانا سوز بن جاتے ہیں۔ مریض بہت کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں میں بدضمی پیدا ہو جاتی ہے اور رات میں ان میں سخت درد ہوتا ہے۔ غرض مریض کی حالت ناگفتہ بہ اور قابل رحم ہوتی ہے۔

نوٹ :- تمام لوگ اس کو معمولی بیماری سمجھتے ہیں مگر نفع دہاںشہ یہ نہایت خبیث مرض ہے جو انسان کو زندہ رہا کر دیتا ہے۔ اور جس کے باعث سیکڑوں قسم کے ہلکے امراض مثلاً فالج، مرگی، امراض مفاصل، امراض

قلب و جگر اور دیوانگی وغیرہ ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔

پرمہیز و ہدایات :- مریض کو تبدیل آب و ہوا کریں۔ غذا مقوی دیں۔ بھونے ہوئے چنے یا بیسن کی روٹی کا کھانا بہت مفید ہے۔ بادی، ترشگی اور ثقیل اشیاء سے پرمہیز کریں۔ تیل اور مرچ ترک کر دیں۔ قبض نہ رہنے دیں۔ اور پھنسی کے ظاہر ہوتے ہی اس پر ٹنکچر ہائڈراسٹس دن میں کئی بار لگائیں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا مرکب سل ہے۔ حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں اکیر ہے۔ اگر زخم کے کنارے سرخ اور سخت ہوں، بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہو۔ منہ سے بدبو آتی ہو، زخم میں جلن ہوتی ہو۔ غرض آتشکی دانے قریب قریب ہر قسم کے اس کے زیر اثر آتے ہیں۔ لیکن اگر مواد زیادہ پتلا آتا ہو جس سے ہڈی کے گھوسے کے مانند کپڑے پر داغ آجاتا ہو تو مرگ کار زیادہ مفید ہے۔

(۲) اگر زخم سے خون آسانی سے اور زیادہ مقدار میں بہتا ہو مواد پتلا بدبودار نکلے۔ ذرا سا چھونے سے زخموں میں احساس ہو جیسے کوئی لکڑیاں چھو رہا ہے۔ زخم کے کنارے ابھرے ہوئے ہوں یا ہڈیاں سڑنے لگی ہوں۔ پارہ کا بیجا اور بے تحاشا استعمال کریا گیا ہو تو نائٹریک ایسڈ دینا چاہیے۔ سفلس کے دوسرے درجہ میں بھی یہ دوا خوب کام کرتی ہے۔ یا جب مرکب سال فیل ہو جائے۔

(۳) جب زخموں میں جلن ہوتی ہو، بدبودار مواد کا اخراج ہوتا ہو۔

زخم میں باجرے کی طرح کے دانے ہوں۔ یا زخم کے کنارے سخت ہوں اور ذرا سا چھونے سے خون بہنے لگے، رطوبت سوزخی، پتلی اور متعفن ہو تو آرسنک بہت مفید ہے۔

(۴) اگر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوں جو آہستہ آہستہ پھیلیں اور لہلہا رطوبت خارج ہو تو ارجنٹم ٹائٹ دینا چاہیے۔

(۵) ابھرے ہوئے زخم جن میں باجرے کے سے ذرے بہ کثرت پائے جائیں زخم کے کنارے سرخ ہوں تو تھو جا مفید ہے۔ آتشک کے ساتھ اگر سوزاک بھی ہو تو یہ دوا اور بھی عمدہ کام کرتی ہے۔

(۶) اگر بہترین منتخب شدہ ادویہ فیل ہو جائیں یا سخت قسم کے ابھار جو نہ پھوٹیں اور نہ مندمل ہوں یا جن سے متعفن قسم کا مواد نکلے، ہڈیاں ماؤٹ ہو جائیں اور ان میں گانٹھیں پڑ جائیں تو کالی آئیوڈائنڈ ایک یقینی دوا بن جاتی ہے۔ یہ دوا مرک سال کے بعد بہتر کام کرتی ہے۔

(۷) آتشک کا تیسرا درجہ۔ جب بال گرنے لگیں، حلق اور تالو میں بھی زخم پائے جائیں۔ ہڈیاں سڑنے لگیں۔ زخموں میں ناسوری کیفیت پیدا ہو جائے۔ پارے کے بیجا استعمال سے دانت سڑ گئے ہوں، ہڈیوں کے سرے بڑھ گئے ہوں تو فلورک ایسڈ کا دینا باران رحمت ہے۔

(۸) اگر گوشت مُردار ہو گیا ہو، زخم کے کنارے نیلگوں ہوں، جن سے سیاہ رنگ کا مواد نکلتا ہو۔ آتشک سے ناک کی بلغمی جھلیاں ماؤٹ ہو جائیں حلق کا رنگ سیگنی ہو یا حلق میں زخم ہو تو لیکسیس دینا چاہیے۔

(۹) ڈاکٹر ہیل آتشک کا علاج بربرس اکوئی فولیم مدرٹنکھر سے کیا کرتے تھے۔ اور مریض کو مدرٹنکھر کے پانچ سے دس قطرہ فی خوراک دن میں تین بار دیتے تھے۔

(۱۰) بالو کیمک میں کالی میو اس مرض کی مجرب دوا ہے۔ مگر سفلس کے تیسرے درجہ میں سلیشیا مفید ہے۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سفلیئم، مرک آئیوڈائنڈریوم، ہیپر، سلیشیا، اورم مٹ، ہڈیاگا، سنا بیرس اور شانی سگیا بہت ضروری اور خاص دوائیں ہیں۔ حسب علامت دیں۔

اکوتہ

ECZEMA

اسباب :- سردی اور گرمی کا سرایت کر جانا۔ خرابی ہاضمہ۔ امراض مفاصل۔ مقامی خراش۔ خرابی خون اور ضعف اعصاب وغیرہ۔ علامات :- اس مرض میں چھوٹی چھوٹی نہایت باریک پھنسیاں بہت گنجان پیدا ہوتی ہیں۔ مآؤفہ جلد سرخ ہو جاتی ہے جس میں درد، جلن اور خارش نہایت شدید ہوتی ہے۔ جب وہ ننھی ننھی پھنسیاں پک جاتی ہیں تو ان میں سے رطوبت رستی ہے جس سے کھرنڈ جم جاتی ہے۔ جن کے نتیجے سے پتلی پانی کی سی رطوبت بہا کرتی ہے۔ یہ مرض

جسم کے کسی حصہ میں ہو سکتا ہے۔

پیر، ہیز و ہدایات :- مقام ماؤنڈ پر حتی الوسع پانی نہ پڑنے دیں۔
کھرنڈ اتارنے کے لیے کپڑے کو تیل میں تر کر کے اس کے اوپر بھرائیں۔
پھر مناسب مرہم لگائیں، بیگن، لہسن، شراب، انڈا، گرم مسالہ،
ترشی و بادری اور سیٹھی اشیاء سے پرہیز کریں۔ دودھ، ساپودان،
مہنگ کی دال اور سبز ترکاریوں کا استعمال مفید ہے۔

علاج :- اس مرض کے لیے سوزنیم، گریفائٹس، ہائیڈروکوٹائل،
رٹاکس، سلفر، مرک، مزیریم، بورکس، کلکیریا کارب، لیکسیس،
کالی کارب، ڈکٹار، پٹرولیم، آرسنک، سائیکوٹا اور کاربودج وغیرہ
نہایت اہم دوائیں ہیں۔

کان کے اکوتہ کے لیے عموماً گریفائٹس، لیکسیس یا مرک سال دینے
سے فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔

ہاتھوں اور انگلیوں کے اکوتہ کے لیے کاربودج، مرک، سیپیا،
اور سلفر مفید ہے۔

ناک اور ہونٹ کے اکوتہ کے لیے گریفائٹس، کالی کارب، سیپیا
اور فاسفورس دینا چاہیے۔

کھرنڈ دار اکوتہ کے لیے آرسنک، کلکیریا، گریفائٹس، نیٹرم میور،
مرک، رٹاکس، مزیریم اور سلفر دیں۔

نوٹ :- اکثر و بیشتر حالات میں صرف ذیل کی سات دواؤں سے

کام چل جاتا ہے وہ پشورولیم، آرسنک، رٹاکس، مزیدیم، گریفائٹس، سگنیریا، اور سلفر ہیں۔

پسوریا - اپس

PSORIASIS

اسباب :- جسم کی گندگی، مرض گٹھیا بانی، آتشک، خرابی ہاضمہ، کثرت سے نوشی اور فساد خون وغیرہ۔

علامات :- یہ ایک جلدی بیماری ہے جس میں جسم میں جابجا گلابی رنگ کے ابھار پیدا ہو جاتے ہیں جو بتدریج بڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں خارش ہوتی ہے۔ ابھاروں پر وہ بہتہ چھلکے پائے جاتے ہیں جو کھرج کر اتارے جاسکتے ہیں۔ چھلکوں کا رنگ بعض وقت بالکل سفید یا چمکدار قسم کا ہوتا ہے۔ اس مرض کو غیر متعدی مانا گیا ہے۔

بیمیز و ہدایات :- جسم کی صفائی سب سے مقدم چیز ہے۔ علاوہ انہیں مریض کو صاف ہوا میں رکھیں۔ غذا ہلکی اور زود ہضم دیں۔ معدہ کی اصلاح کریں تاکہ روزانہ معمول سے پاخانہ ہو۔ لباس صاف ستھرا پنیں اور چٹوں کے چھلکے اتارنے کے لیے تیل اور اسپرٹ لگائیں۔ بعد ازاں مناسب مرہم لگائیں۔

علاج :- (۱) اگر ہتھیلی اور پھلی سطح پر چمپیں ہو گیا ہو تو گریفائٹس

یا لائیکو دیں۔ آتشکی مادہ ہونے کی حالت میں گریفائٹس اور معدہ کی علامات (ریاحی تکلیف وغیرہ) موجود ہونے میں لائیکو مفید ہے۔

(۲) چمبل جس میں سوزش ہو۔ کپڑے اتارتے وقت غضب کی خارش ہو۔ جلد کا چمڑا خشک ہو جس پر سے کھرنڈ اتریں تو کالی آرس بہت مفید ہے۔
(۳) چمبل جس میں سیاہی مائل باجرہ کے سے دانے پائے جائیں۔
ماؤفہ جگر پر غضب کا درد اور جلن ہو تو آرسنک دینا چاہیے۔ مرن صورت میں بھی یہ دوا خوب کام کرتی ہے۔

(۴) چمبل جس میں چھونے سے بھی درد ہو یا گٹھیا بائی کے ساتھ چمبل کی علامات رونما ہوں، ماؤفہ حصہ کے علاوہ تمام جسم میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہو۔ مرطوب موسم میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو مسینگنم دوا ہے اکثر حالات میں مسینگنم کی چند خوراکیوں سے چمبل نابود ہو جاتا ہے۔
(۵) ڈاکٹر سہیل نے بربرس اکوئی قولیم سے بے شمار کمبل چمبل کے درست کیے ہیں ایسی حالت میں وہ پانچ سے دس قطرے فی خوراک دن میں ۲ بار دیا کرتے تھے لیکن بعض حالات میں $3 \times$ طاقت سے بھی عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۶) جب بہترین منتخب شدہ ادویہ ناکام رہیں تو کریازوٹنیر کی چند خوراکیں روزانہ کھانا چاہیے۔

(۷) بایوکیماک میں کالی سلف اس مرض کی عمدہ دوا ہے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ رشاکس، کلکیر یا کارب، پٹرو لیم،

سیپیا، سورنیم، فاسفورس، لائیو اور فائٹرک ایڈ اس مرض کی مخصوص
دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

داد

RING WORM

اسباب :- عموماً مرطوب جگہ پر لیٹنے سے، گیلے کپڑے پہنے رہنے
سے اور کثافت و فساد خون سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض
ہے جس میں خاص قسم کا کرم پایا جاتا ہے۔ یہ ہر اشیاء جسم کے کسی حصہ میں
پیدا ہو سکتے ہیں جن کو نم اور مرطوب جگہ میں تقویت ملتی ہے عموماً گردن،
پشت، کمر، سرین اور جٹکاسہ میں یہ مرض ہوا کرتا ہے۔

علامات :- جہاں پر یہ مرض ہونے والا ہوتا ہے وہاں پر چھوٹے
چھوٹے سرخ پتے پڑ جاتے ہیں جن میں ایک قسم کی سرسراہٹ ہوتی ہے
جس سے خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض بار بار کھلاتا ہے جس میں بعض وقت
پانی سا چھوٹتا ہے۔ کھلانے کے بعد سخت قسم کی جلن ہوتی ہے بعض وقت
اس غضب کی خارش ہوتی ہے کہ کھلاتے کھلاتے زخم سا ہو جاتا ہے کبھی
مقام ماذفہ پر موٹی تہ سی جم جاتی ہے۔ بارش کے ایام میں یہ مرض زیادہ
ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مقام ماذفہ کو پاک و صاف رکھیں۔

نہانے کے بعد جسم کو اچھی طرح صاف تو لیا سے خشک کر لیا کریں۔ گیلے
کپڑے نہ پہنیں۔ ترشی اور بادی چیزوں سے پرہیز رکھیں۔

علاج :- اس مرض میں رسٹاکس، سلفر، آرٹک، ایڈکرائی سو
سیپیا، گریفائٹس، ٹیلوریم، بسی لینم، سفلیئم اور سکوکم چک نہایت
اہم ادویہ ہیں۔

بایوپیک میں کالی سلف عمدہ دوا ہے۔

پتی اچھلنا

URTICARIA

اسباب :- بد ہضمی، گرم اور تیز آشیا کا استعمال، صفراوی خون میں
تحریک کا ہونا، ناخن سے جلد کو کھلانا جس سے ناخن کا زہر خون میں سرایت
کر جائے، امراض رحم، حمل کے دوران رحمی تکلیف، بچوں میں دانتوں کا
نکلنا وغیرہ۔ پتوں کے ڈنک سے بھی پتی اچھل جاتی ہے۔ اور کبھی
ناموافق غذا کے کھا لینے سے پتی نمودار ہو جاتی ہے۔ مثلاً بعض اشخاص کو
مولی کھانے سے اور بعض کو سیگن کھا لینے سے یہ شکایت ہو جاتی ہے۔

علامات :- اس مرض میں گول گول سرخی مائل چٹے تمام جسم میں
پڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان چٹوں کا رنگ آس پاس کی جلد کے
مقابلہ میں زیادہ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ چٹوں میں غصب کی خارش اور

جلن ہوتی ہے۔ بستر میں گرم ہونے پر خارش کو اور بھی تحریک ہوتی ہے۔
بعض حالات میں اس میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اگر کسی خاص غذا کے کھانے سے پتی
نمودار ہو گئی ہو تو بذریعہ قے اُسے خارج کر دیں اگر مریض کو قبض ہو تو اُسے
پہلے رفع کریں۔ اور ٹیگرم پانی میں سوڈا بائی کارب ملا کر مریض کو غسل کرائیں۔
ترشی، ہادی اور ثقیل اشیاء سے پرہیز۔

علاج :- (۱) اگر سردی یا مریض ہو یا بھیگ جانے سے پتی
نمودار ہوئی ہو۔ خارش کے ساتھ جلن ہو۔ جلد متورم اور سرخ ہو۔ بخار
اور پیاس موجود ہو تو رٹاکس دینا چاہیے۔

(۲) اگر ناموافق غذا سے پتی ہو، مریض کو کھلی ہوا اچھی معلوم ہوتی ہو،
پیاس ندارد تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔

(۳) اگر چٹے نیلگوں یا پیلے اور شفاف ہوں۔ خارش، جلن اور
ڈنک لگنے کی سی تکلیف ہو آہستہ سے سہلانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو
البتہ زور سے ملنے سے کچھ آرام ملتا ہو تو لیس دوا ہے۔

(۴) دواسی موسم کی تبدیلی سے غضب کی خارش جو برداشت سے
باہر ہو۔ جلن اور ڈنک مارنے کا سا درد ہو تو اریکا یورنس مفید ہے۔

(۵) اگر سرکہ اچار یا ترش پھل کھانے سے پتی اچھلی ہو یا جب
ایس دوا نا کام رہی ہو، ٹھنڈک اور منض میں کمزوری نمایاں ہو تو کیفیر
مدہ ٹنگر کے دو بوند ملک شوگر پڑال کر دیں۔

(۶) کچے پھل کے بعد یا زیادہ شدید حالات میں جب خارش کے باعث مریض بہت بے چین ہو۔ رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو، نیز کھانسی کا حملہ ہو جاتا ہو تو آرٹک مفید ہے۔ مزمن کیفیتوں میں بھی اس دوا سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

(۷) اگر پتی گرم جگہ میں غائب ہو جاتی ہو یا کبیل وغیرہ اوڑھنے سے کم ہو جاتی ہو اور باہر آنے پر پھر زیادتی ہو جاتی ہو تو سپیا دوا ہے۔ مستورات میں رحمی تکالیف کے باعث اگر پتی اچھلے تب بھی یہ دوا مفید ہے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ چائنم سلف، ڈلکارا، سلفر، لائیکو ہیسر، کاربودج اور کلکیر یا کارب بہت مفید دوائیں ہیں جسب علامت دینا چاہیے۔

خارش

ITCH

اسباب :- فساد خون، میلا کچیلارہنا۔ عمدہ غذا کا نہ ملنا، جگر کے فعل کا خراب ہو جانا۔ کثرت مے نوشی، متباکو، گانجہ، چرس اور افیون کا کثرت استعمال، خشکی، مادہ سودا، خرابی معدہ، مستورات میں فساد حیض وغیرہ۔

علامات :- اس مرض میں جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے

نودار ہوتے ہیں جن میں غضب کی کھجلی ہوتی ہے۔ بعض وقت چھنیوں کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے جو کھجلا نے سے پھل جاتی ہیں۔ جن کے بعد جلن ہونے لگتی ہے۔ مریض کا ہاتھ کھجلا نے میں ہر وقت چلا ہی کرتا ہے۔ اکثر حالات میں رات میں کھجلی زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی بستر میں گرم ہوتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ کھجلا تے کھجلا تے بعض اوقات جلد پر جا بجا زخم سے بن جاتے ہیں جن پر کھرٹہ سی جم جایا کرتی ہے جو دوبارہ کھجلا نے سے پھر پھل جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- ترشی اور بادی چیزوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ جسم کو صاف رکھنا چاہیے۔ بجائے صابن کے آٹا وغیرہ مل کر نہانا مفید ہے۔ یا پانی میں سوڈا بائی کارب ملا کر غسل کریں۔ مریض کو اچھی آب و ہوا میں رکھیں تین سالہ دار چیزوں کا استعمال مضرت ہے، میٹھا بھی کم کھا لیں۔ دودھ، کھجڑی، سبز ترکاریاں اور ترمیوہ جات کھانا مفید ہے۔

نوٹ :- کھجلی کو عوام معمولی مرض سمجھتے ہیں جو کہ صحت غلطی ہے جس کے دب جانے سے مختلف قسم کے خطرناک امراض از قسم مرگی، تپ دق، سیل اور امراض گوش و چشم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خارجی ادویہ سے کھجلی کو دبانے ٹھیک نہیں (جیسا کہ عموماً ایلو پیتھک ڈاکٹر کیا کرتے ہیں) اندرونی ادویہ کو اس مرض میں زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔

علاج :- (۱) اگر خارش بشر کی گرمی سے خاص طور پر ہوتی ہو،

اتھیلی، تلووں اور چاند پر جلن ہو، خشک بھوسی جلد پر سے اترے۔ جا بجا پھنسیاں نمودار ہوں تو سلفر سفید ہے اگر سلفر فیل ہو جائے تو سونہریم دیں۔

(۲) تمام جسم پر خارش ہو یا بھیک جانے سے کھلی، جسم پر سرخ دانے مثل خسرہ کے نمودار ہوں جن میں جلن ہو اور خارش کے بعد رطوبت برے تو رسٹاکس دینا چاہیے۔ اگر صبح کو ایک خوراک سلفر اور دن میں تین خوراک رسٹاکس دی جائیں تو دوا اور بھی زود اثر ثابت ہوتی ہے۔

(۳) جسم کے مختلف حصوں میں خارش۔ جلد کھڑکھری، سخت اور خشک ہو۔ خارش کے چھوٹے چھوٹے دانے یا پھنسیاں جن میں شہد کی سی رطوبت نکلے اور ان پر کھرنڈ حجم جائے تو گریفائٹس دوا ہے۔

(۴) اگر جلد خشک ہو، پھنسیوں میں جلن زیادہ ہوتی ہو جسے گرم پیز سے یا سینکے سے آرام ملتا ہو تو آرسنک سفید ہے۔ اگر تکلیف دن میں یا رات میں ایک بجے کے بعد زیادہ ہوتی ہو تو یہ دوا اور بھی بالمشل ہو جاتی ہے۔

(۵) خارش جس میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے آرام ہوتا ہو۔ گھٹنوں، کہنیوں اور بال والی جگہوں مثلاً مشرنگا، پیڑ اور مونچھوں اور درمیان وغیرہ میں خارش ہو یا انگلیوں میں کھلی ہوتی ہو جس کی زیادتی دوپہر کے بعد ہوتی ہو اور کھلاتے سے تکلیفات بڑھ جاتی ہوں تو نیگ باریم دینا چاہیے۔

(۶) باپو کھک میں کالی سلف کھنک کی عمدہ دوا ہے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کاربوئک ایسڈ، ایپیا، کاربودج، کلکیریا کارب، مرک، کاسٹکم، پٹرولیم، پلساٹیل، ہیمپروڈریم میور بہت مفید دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

اشارات

- ۱۔ حیض کے بعد خارش۔ ٹیڑھ ٹٹولا، کالی کارب، گریفائٹس۔
- ب۔ پسینہ سے خارش میں زیادتی ہو۔ منیگنم۔
- ج۔ شرمگاہ دور آلات تناسل کی خارش۔ کیلیڈیم۔
- د۔ خارش مقعد کے مقام پر۔ لائیکو۔ چائنم سلف۔ بوائیر سے لائیکو۔
- س۔ جماع کے بعد شرمگاہ میں خارش۔ گریازوٹ۔ تھامس میں۔ اگیگریا۔
- س۔ صرف کانوں کے پیچھے خارش ہو۔ کاربوئیم سلف۔ بگائس ریجیا۔

پھوڑا۔ چھنی

ABSCESS & BOILS

اسباب :- مادہ سوزا۔ فسادخون۔ پارہ وسیسہ وغیرہ کی سمیت۔
موسم برسات۔ خرابی غذا۔ مرض ذیابیطس، کثرت سے نوشی۔ عام کمزوری
اور کثافت و گندگی وغیرہ۔
علامات :- چھنیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں بعض سرخ رنگ کی

ہوتی ہیں بعض مواد بھری اور بعض سیاہ یا نیلگوں جسم کے مختلف حصے پر پھنسیاں نکلتی ہیں۔ پہلے جائے ماؤفہ پر سرخی اور سختی نمودار ہوتی ہے جس میں جلن اور خارش ہوتی ہے پھر نایاں ابھار ہو جاتا ہے جس میں مواد پڑ جاتا ہے۔ چوٹی کے مقام سے وہ پھنسی پھوٹی ہے اور کیل نکل جانے سے آرام ہو جاتا ہے بعض وقت یکے بعد دیگرے ہتھار پھنسیاں نکلتی ہیں اور مریض کو بکا بھی آ جاتا ہے۔ کبھی پھنسیوں کا مواد بہت زہریلے قسم کا ہوتا ہے۔ مواد کے لگ جانے سے دوسری جگہ بھی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات چھوٹی سی پھنسی پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس میں سخت درد، جلن اور تپکن ہوتی ہے۔ سینہ پر قلب کے قریب یا پیٹھ میں پھوڑے کا ہونا تشویشناک ہو جاتا ہے۔ پرہیز و ہدایات: پھنسی کے ظاہر ہوتے ہی اس پر پھر آئینہ صحت لگا دیں۔ اگر پھوڑے کی شکل پیدا ہو گئی ہو تو اسے سینگیں اور پلٹس وغیرہ باندھ دیں اور زرد زنی مادہ یہ حسب علامت کھانے کو دیں تاکہ جلد از جلد تکلیف رفع ہو جائے اور پھوڑے سے مواد خارج ہو کر وہ منحل ہو جائے۔ غذا ہلکی اور زود ہضم دیں۔ میٹھی اشیاء اور تیز گرم و ثقیل چیزوں، کھٹائی، مرچ اور تیل وغیرہ سے پرہیز کرائیں۔

علاج عام علامات :-

(۱) اگر پھوڑے پھنسیوں کا سبب آتشکی مادہ ہو جن میں مواد پڑ چکا ہو۔
 یلان میں سے خون ملا ہوا مواد نکلتا ہو یا دانوں پر زرد کھرنڈ جھم جاتے ہوں

تو مرکب دینا چاہیے۔ مواد یا مریض کے پسینہ سے تعفن کا پایا جانا بھی اس کی ایک علامت ہے۔

(۲) اگر پھوڑا حد درجہ ذکی اکس ہو اور اس میں مواد پڑ چکا ہو تو ہیسپر سلفر $3 \times$ یا $6 \times$ دینے سے پھوڑا پھوٹ جاتا ہے اور اسی سے مندمل بھی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے دانے جو چھوٹے سے بہت ذکی اکس ہوں اور ان میں سے جلد خون یا خون ملا مواد ہا سی پینر کی بو والا نکلے اس دوا کے حلقہ اثر میں آتے ہیں۔ پھوڑا جس میں مواد نہ پڑا ہو یعنی شروع میں جیسے ہی ابھار نمودار ہو ہیسپر سلفر کی ادنیٰ طاقت سے وہ دم یا پھوڑا تحلیل ہو جاتا ہے۔

(۳) پھوڑے یا پھنسیاں جو سرخ ہوں۔ جن میں درد اور تپکن ہو یا جن میں سے آگ نکلتی معلوم ہو خفیف حرارت ہو گئی ہو تو بیلادونا مفید ہے۔ (۴) جبکہ سخت جلن اور سوزش ہو۔ پھوڑے کے چاروں طرف دم ہو ابے چینی اور پیاس زیادہ ہو، رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو تو آرسنک دینا چاہیے۔ زخم ہو کر اگر سٹرن پیدا ہو جائے تب بھی یہ دوا مفید ہے۔

(۵) پھوڑے جو یکے بعد دیگرے نکلتے رہیں اور ایک مقام پر آ کر اک جائیں اور جو نہ پھوٹیں اور نہ بٹھیں تو ایکی نیشیا مفید ہے۔

(۶) اگر تمام جسم میں خارش ہو کر چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہوں بستر میں گرم ہو جانے پر ان میں کھجلی اور جلن بہت ہوتی ہو جلد کھردری ہو گئی ہو تو سلفر مفید ہے اگر سلفر ناکام رہے تو سورنیم دیں۔

(۷) بایو کیمک میں سلیشیا اور کالی میو پھوڑے پھنسیوں کے لیے اکسیر ہیں۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سفلیئم، آرنیکا، گلگیریا، کینٹڈولا، رٹکس، گریفائٹس، عقیقہ جانا، سارسا پریلا، لکیسیس، فلورک ایسڈ، اور کاربونیم سلف بہت اہم دواؤں میں سے ہیں۔

(۱) ابتداءئی حالت میں جبکہ درد، جلن اور

ذیل - پھوڑا :- تپکن ہو، مقام ماؤفہ متورم اور سرخ ہو تو بیلہ ڈونا دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں اس دوا کے دینے سے عموماً ورم تحلیل ہو جایا کرتا ہے یا کم از کم پیچیدگیاں نہیں پیدا ہونے پاتیں۔ بیلہ ڈونا کے بند پھوڑے کا نسخہ کرنے کے لیے مرکب عمدہ دوا ہے۔

(۲) ابتداءئی حالت میں یعنی جبکہ مواد پڑا ہو اور مقام ماؤفہ صدر ذکی الحس ہو کپڑا چھڑا جانا بھی برداشت نہ ہوتا ہو تو ہیسپر سلفر کی اونچی طاقتیں اسے تحلیل کر دیتی ہیں۔

اگر مواد پڑ چکا ہو اور اسے خارج کرنا مقصود ہو تو ہیسپر سلفر کی نیچی پوٹنسیاں کارآمد ہوتی ہیں۔ ذکی الحس کا ہونا اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۳) مرکب سال کی نیچی طاقتیں بھی مواد بننے کے فعل میں مدد دیتی ہیں اور مواد پڑ جانے کی حالت میں مواد کو جلد از جلد خارج کر کے زخم کو جلد مشد مل کرتی ہیں۔ اگر مرکب ناکام رہے تو سلیشیا دیں لیکن ایسا کرنے سے قبل ایک خوراک سلفر کی دیدینا ضروری ہے کیونکہ منیشیا پور

مرک متضاد ہیں اور سلفر کے بعد سلیشیا عمدہ کام کرتی ہے۔

(۴) ٹیرنٹولا، کلکیریا، لیکسیس، آرنیکا، فلورک (ایڈ)، سلفر،

اور برائی دنیا وغیرہ ادویہ بھی عجیب و غریب اور نہایت ضروری ہیں۔

بھوٹ۔۔۔ دنیلوں کے پکانے کے لیے مائرسکا 3×3 بعض اوقات بہترین

کام کرتا ہے اور اسی سے مسئلہ جو جاتا ہے۔

چھوٹی چھوٹی پھنسیاں :- (۱) یکے بعد دیگرے پھنسیوں کی مسلسل پیدائش کو بڑکنے کے لیے

پسیدائش کو چودکنے کے لیے

ایک نیشیا دیں۔

(۲) صبح نہار منہ ایک خوراک سلفر نمبر ۳۰ اور دن میں ۳ خوراک

آزاد کائنات مسلسل دینے سے کھنسیاں نکلنا موقوف ہو جاتی ہیں نیز ریاتی
قسم کے دانے اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ نسخہ بہت مجرب ہے۔

(۳۰ آرتیکا) بیپر کاکیریا، سلفرا در فائیلولا کا شمار اہم ترین ادویہ

میں سے ہے۔ حسبِ عادت دینا چاہیے۔

۱۰

ULCER

اسباب :- زخم مختلف وجہ سے ہو جایا کرتے ہیں مثلاً جلد پر

سوئی وغیرہ کا چمبہ جانا، چوٹ، پھوڑا پھنسی، جل جانا، عرصہ تک

بحالت بیماری بستر پر پڑا رہنا، مرض آتشک، تیز اوزار سے کٹ جانا،
کچل جانا، کانٹا لگنا، گولی وغیرہ کا لگنا اور کسی جانور کا کاٹ لینا
وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- زخم کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض زخم جلد دار ہوتے ہیں۔
جن میں شدت کی سوزش، درد اور جلن ہوتی ہے۔ بعض زخموں سے
سخت قسم کی عفون آتی ہے۔ کبھی زخم فاسدانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں جو
مندمل ہونے کا نام نہیں لیتے یا برا بر پھیلتے رہتے ہیں۔ کبھی زخموں
سے خون رسا کرتا ہے بعض اوقات زخم میں بدگشت پیدا ہو جاتا ہے۔
سینہ میں قلب کے قریب یا پشت میں زخموں کا ہونا تشویش ناک ہو جایا
کرتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- زخم کو ہر حال میں صاف رکھنا ضروری
ہے۔ غذا نہایت مقوی دینا چاہیے۔ کھٹائی، مرچ اور تیل سے پرہیز
کریں۔ تازہ پھل اور میوہ جات کا استعمال خاص طور سے مفید ہے۔
علاج :- اگر زخم میں مسرن پیدا ہو گئی ہو۔ سوزش اور جھن
حد درجہ ہو جس سے مریض بے چین ہو جاتا ہو، رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو۔
تو آرسنک مفید ہے۔

(۲) خنازیری زخموں کے لیے کلکیر یا کارب دینا چاہیے اس کے
ہمراہ درمیان میں کبھی کبھی سفر کی بھی ایک آدھ خوراک دینے سے اور بھی
عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

- (۳) اگر زخم مل ہونے کے بعد زخم میں سختی رہ جائے یا جب زخم
 مسوری شکل اختیار کر لیں تو سلیشیا نمبر ۲۰۰ ہر آٹھویں روز دینا چاہیے۔
- (۴) زخم جو متعفن قسم کے ہوں یا جن میں زرد مواد یا خون ملا مواد نکلے
 یا ایسے زخم جو آتشکی مادہ کی وجہ سے ہوں تو مرکب سال دینا مفید ہے۔
- (۵) زخم جن کے گرد بیگنی یا سیاہی مائل رنگ پایا جائے جن میں
 ذکی المحسی زیادہ ہو اور جلن پائی جائے تو لیکسیس دوا ہے۔ تب دق کے
 آخری درجوں میں حلق کے زخم کے لیے بھی یہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے۔
- (۶) تیز اوزار سے کٹے ہوئے زخم یا عمل جراحی کے بعد زخموں
 کے لیے آرنیکا دوا ہے۔

(۷) کیڑے کوڑوں کے کاٹنے سے اگر زخم پیدا ہو جائے تو میڈم
 مفید ہے۔

- (۸) بایو کیمک میں کالی میو اور سلیشیا مفید ہے۔ ہڈی کے
 زخموں میں کلکیر یا فاس اور کلکیر یا فلور بارڈی باری دینا چاہیے۔
- (۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سفلیئم۔ پلساٹیل۔ رسٹاکس۔
 شانی سیکریا۔ لائیگو۔ نائٹرک ایسڈ۔ ہیپر۔ کالی بانٹی۔ ایکویشیا۔
 گریفائٹس۔ بورکس۔ کیلنڈولا اور میمنگنم وغیرہ کا شمار خاص دواؤں
 میں سے ہے۔

زہر باد

ERYSEPELAS

اسباب :- کسی زہریلے جانور کا کاٹنا ، غلاظت جسمانی ، عام کمزوری ، ضعیفی ، مرض ذیابیطس ، نفرس ، وجع مفاصل ، مہم برسات ، کثرت سے نوشی ، فاسد مادہ ، مادہ سودا ، ضرب اور امراض گہرہ وغیرہ۔
جدہ تحقیق کے مطابق ایک خاص قسم کا جرثومہ اس مرض کا خاص سبب ہے۔
علامات :- ابتدا میں بخار ، متلی اور درد سر وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے بعد ازاں جس جگہ مرض ظاہر ہونے والا ہوتا ہے وہاں درم جلن اور سرخی نمودار ہوتی ہے۔ سرخی بعض اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو جایا کرتی ہے اور چند روز بعد بھوسی جھڑک سرخی دفع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات سرخی کے مقام پر آب پید ہو جاتے ہیں جن میں زردی مائل شفاف بطورت بھری رہتی ہے۔ پھر یہ آب ٹوٹتے ہیں جس سے زخم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ جگہ مُردار ہو جاتی ہے۔ آبلوں میں کھجلی ، جلن ، پھٹن اور کھنچاؤ ہوتی ہے۔ مناسب علاج سے ایک ہفتہ میں بخار دور ہو کر صحت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب سر یا چہرہ پر زہر باد ہوتا ہے تو بخار اور بے چینی کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی ہوا کرتا ہے۔ اگر مرض شدید ہو اور دوران مرض میں دست آنا شروع ہو جائیں تو انجام عموماً خراب ہوتا ہے۔ بعض حالات میں علامات اس قدر شدید ہوتی ہیں کہ مرض تین چار روز

کے اندر جان بحق ہو جاتا ہے۔ ضعیفی کے دنوں میں جب کمزوری زیادہ ہو تو عموماً یہ مرض ایک تشویش ناک صورت پیدا کر دیتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اس مرض میں چونکہ کمزوری بہت لاحق ہو جاتی ہے اس لیے تازہ پھل، میوہ جات اور مقوی اشیاء کا استعمال بہت مفید ہو ا کرتا ہے دودھ، گھی، شوربا، نیم برشت انڈا کھانے کو دیں اور قبض نہ رہنے دیں۔ مقام ماؤفہ کو ہوا اور سردی سے محفوظ رکھیں اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر کار بند رہیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جبکہ بخار زیادہ ہو، سر میں تپکن والی درد ہو، آبلوں میں ٹھہر ٹھہر کر ہوتی ہو، آبلوں میں سرخی، تپکن اور جلن نمایاں طور پر ہو یا خسرہ کے سے سُرُخ دانے تمام جسم پر نمودار ہوں جن میں تپکن غضب کی ہوتی ہو تو بیلادونا بہت مفید ہے۔

(۲) اگر آبلے بکثرت پیدا ہو جائیں اور مرض خطرناک صورت اختیار کرتا معلوم ہو، جس سے ٹائیفائیڈ کی علامات پیدا ہونے کا خدشہ ہو، غنودگی اور بے چینی زیادہ ہو گئی ہو تو رشاکس دوا ہے۔ بال والے حصص میں بھی زہر باد کے لیے رشاکس چوٹی پر کی دوا ہے۔ بہر حال آبلے دار زہر باد کے لیے رشاکس نہایت عمدہ دوا ہے۔

(۳) اگر رشاکس اور بیلادونا دونوں دوائیں فیل ہو جائیں تو آپس میں دوا ہوتی ہے بشرطیکہ زہر باد میں ڈنک لگنے کا سادہ اور جلن موجود ہو۔ علاوہ ازیں جب بخار تیز ہو اور بیلادونا بخار اتارنے سے قاصر رہا ہو

تو ایس دینا چاہیے۔

(۴) اگر مقام ماؤذہ نیلگوں ہو یا جب گنگرین ہو جانے کا خطرہ ہو تو
لیکیس دینا چاہیے۔ مندرجہ صدر تینوں ادویہ کے فیل ہو جانے کے بعد
لیکیس کی علامات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔

(۵) پھرہ پر زہر باد، جلن، خارش، ٹھنڈک سے آرام کینتھرس دیں۔

(۶) بایو کیماک میں ابتدائی حالت میں جبکہ بخار وغیرہ ہو تو فرم فاس

دیں۔ اگر مفردی علامات معلوم ہوں تو نیٹرم سلف کے ساتھ باری باری دینا
نیٹرم سلف زہر باد کی خاص دوا ہے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ گریفائٹس، اکی نیشیا، کاربون ج،

سورنیم، سلفر، آرسنک، ارٹیکا، پورکس، یوفربیم اور مرک نہایت اہم
دوائیں ہیں۔ علامات کے بموجب دینا چاہیے۔

بسہری

WHITLOW

اسباب :- فساد خون، دج مفاصل، نقرس، پھانس کا لگنا،

سوئی چُجھ جانا، خنازیری مزاج، اندرونی ضرب اور عروق جاذبہیں ورم
وغیرہ۔ بعض وقت اس کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ جدید تحقیق کے
مطابق اس کا موجب ایک باریک بین جراثیم ہے۔

علامات :- یہ بیماری انگلی میں ہوتی ہے جس کا زہر ہڈی میں ہوتا ہے۔ اس میں درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے۔ درد کبھی ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے اور کبھی مسلسل ہوا کرتا ہے۔ ٹیکن، جلن اور ڈنک لگنے کا سادرد ہوتا ہے۔

علاج :- (۱) میں عموماً بسہری پر معمولی صابن بندھوا دیا کرتا ہوں اور کھانے کے لیے مائوسٹیکا $\times ۳$ دن میں چار بار دیتا ہوں۔ مجھے برابر کامیابی ہوئی بعض وقت انتھرکسینم بھی دینا پڑا ہے۔ بالکل ابتدا میں جب انگلی میں کانٹوں کی سی جھن ہوتی ہے یعنی بسہری کی علامات شروع ہونے لگتی ہیں تو میں ڈالسکور یا کی چند خوراکیں دیدیا کرتا ہوں جس سے عموماً تکلیف دہی کی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔

(۲) جلن اور ڈنک لگنے کا سادرد ہوسروپانی میں انگلی ڈبوئے رہنے سے آرام ملتا ہو تو ایس دینا چاہیے۔

(۳) بسہری نہایت بُرے قسم کی جس میں سمیت زیادہ ہو اور جلن و شدت حد درجہ پائی جائے تو انتھرکسینم اکیر ہے۔

(۴) بسہری کا درد جس میں ٹیکن ہو اور ناقابل برداشت درد ہو۔ ٹھنڈے پانی سے درو میں کمی ہو جاتی ہو تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔ اگر پلسا ٹیلا ناکام رہے تو سلیشیا دینا چاہیے۔ اگر خدا کو استہ سلیشیا بھی خاطر خواہ نفع نہ پہنچائے تو فلورک ایسڈ کا تجربہ ہے۔

(۵) بسہری ذکی احسن ہو اور پکتی ہوئی معلوم ہو تو ہیپیر دیں۔

(۶) نہایت شدید جلن، انگلی مثل آگ کے جلے، بے چینی زیادہ پائی جائے یا زخم سیاہ ہو کر مردار شکل کا ہو جائے تو آرسنک مفید ہے۔
 (۷) ان کے علاوہ سلفر، مرک، ایومنا، نائٹرک ایسڈ، گریفٹس، کیمولا، کلکیریا کارب، بیلادونا اور فائیٹولا کا بہت مفید ادویہ ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

سرطان۔ کاربنکل

CARBUNCLE

اسباب :- مادہ سل، فساد خون، عام کمزوری، ضعیفی، امراض گردہ و مثانہ، اور ذیابیطس وغیرہ اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔
 علامات :- یہ دراصل ایک زہریلا پھوڑا ہوتا ہے جو عموماً پیٹھ پر نکلتا ہے لیکن پیٹھ کے علاوہ یہ اور جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں مقام ماؤفہ پر سرخی اور درم نمودار ہوتا ہے جس میں غضب کی جلن ہوتی ہے اور اندر ہی اندر وہ جگہ پکتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر نمایاں ابھار ہو جاتا ہے جو بمشکل پھٹتا ہے اور اس میں بے شمار سوراخ دکھائی دیتے ہیں جن میں سے مواد پسا کرتا ہے اور زخم برابر بڑھتا جاتا ہے اس میں سے بعض وقت چھچھڑے بھی خارج ہوتے رہتے ہیں۔ سمیت کی وجہ سے یہ پھوڑا بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے اور دیر میں اچھا ہوتا ہے۔ شدید مرض کی

حالت میں ماؤفہ جگہ چھلنی کی مانند سوراخ دار ہو جاتی ہے۔ مریض روز بروز لاغر اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ مرض ذیابیطس کی حالت میں یہ مرض اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔

پیرسینرو ہدایات :- اگر ذیابیطس کے باعث یہ مرض ہو گیا ہو تو اس کے مطابق باقاعدہ علاج اور پیرسین کریں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر۔ غذا ہر حال میں نہایت مقوی، زود ہضم اور ہلکی دیں۔ خارجی طور پر مقام ماؤفہ پر شکر ایکی نیشیا لگائیں۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جبکہ درد شدید ہو اور مقام ماؤفہ نہایت سرخ ہو تو رسٹاکس دینے سے نہایت عمدہ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ (۲) اگر رسٹاکس ناکام رہے اور سرطان میں جلن بے حد ہوتی ہے۔ جس کے باعث مریض سخت بے چین ہو، کمزوری زائد معلوم ہوتی ہو تو آرسنک ایک مفید ترین دوا بن جاتی ہے۔

(۳) اگر خدا نخواستہ آرسنک اس جلن اور شدت میں تخفیف نہ پیدا کر سکے اور سمیت کا مادہ گہرائی میں اثر کرتا ہوا معلوم ہو، مواد بکثرت بدبودار نکلتا ہو تو انتھرکسینیم لاجواب دوا ہے۔ اس دوا کی اس مرض میں بہت اہمیت ہے۔ لیکن تیس نمبر سے کم طاقت میں اس دوا کو نہ استعمال کرنا چاہیے۔

(۴) اگر سرطان میں تمام ادویہ فیل ہو چکی ہوں اور انتھرکسینیم سے بھی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا ہو، مریض کی حالت دیگر گوں ہوتے معلوم ہو تو ٹریٹولا دینا بہت مفید ہے۔

(۵) اگر علامات صحیح صحیح نہ ملتی ہوں اور دوا کے انتخاب میں دشواری ہو تو

ایکی نیشیا مدر شکھر کے پانچ پانچ قطرے فی خوراک ہر دو گھنٹہ بعد دیں تو تمام پیچیدگیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس دوا سے یا تو سرطان تحلیل ہو جاتا ہے یا جلد از جلد پاک کر پھوٹ جاتا ہے علاوہ ازیں جب گنگرین ہو جانے کا اندیشہ ہو تو یہ دوا مفید ترین ہوا کرتی ہے۔

(۶) اگر ناسوری کیفیت پیدا ہو جائے اور زخم فاسدانہ شکل اختیار کر لے تو سلیشیا مفید ہے۔ یہ دوا پکنے کے زمانے میں زخم سے مردار مادہ کو نکال پھینکتی ہے۔

(۷) اگر مقام ماؤنہ سیاہی مائل یا نیلگوں ہو۔ خون میں سمیت سرایت کر جانے کا خوف ہو تو لیکسیس کو فرا موش نہ کرنا چاہیے۔

(۸) باپو کیمک میں فیرم فاس اور کالی میوہ باری باری دیں لیکن اگر پیپ بنی شروع ہو گئی ہو تو سلیشیا مفید ہے۔

(۹) ذیل کی ادویہ بھی اس مرض میں نہایت اہم ہیں۔ برائی ادویا۔ آرنیکا ہیپیر، مرک، نکس و امیکا، نائٹرک ایسڈ، بیلا ڈونا اور ایپس۔

بوائی پھٹنا

CHILLBLAIN

اسباب :- جاڑوں میں ہاتھ پاؤں دھو کر خشک نہ کرنا، سردی لگنا، گرد و غبار کا پڑنا، ہاتھ اور پاؤں کی کثافت وغیرہ اس کے اہم اسباب ہیں۔

علامات :- اس مرض میں ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں پاؤں عموماً اس مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ ایڑی، تلو یا انگلیوں میں شگاف سا ہو جاتا ہے جس میں سخت درد ہوتا ہے۔ بعض وقت کانوں میں بھی بوائی ہو جاتی ہے۔ پیرہینرو ہدایات :- ماؤفہ حصص کو صابن سے دھو کر تولیہ سے خوب خشک کر لیں، ماؤفہ جگہ کو گرد و غبار سے محفوظ رکھیں اور گلیسرین خارجی طور پر لگالیں۔

علاج :- پسا ٹیلا اس مرض کی بہت بڑی دوا ہے۔ اس میں درد خارش اور جلن حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جلد کا رنگ گہرا سرخ، نیلگوں، یا سیاہی مائل ہوتا ہے۔

(۲) بوائی جس میں جلن غضب کی ہو اور فاسد قسم کا زخم پیدا ہو رہا ہو تو آرسنک دیں۔

(۳) ایگریکیس، پٹرو لیم، نائٹرک ایسڈ اور فاسفورس بھی بوائی میں دینا بہت مفید ہے۔

(۴) بوائی جب فاسدانہ شکل اختیار کرے تو کاربودج، لیکسیس اور سلیشیا میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔

(۵) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سیکیل، کلیریا کالاب، آرنیکا اور ایگریکیس وغیرہ نہایت عمدہ دوائیں ہیں بعض وقت ابتدائی حالت میں آرنیکا حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ اسی کا ٹینچر خارجی طور پر لگایا جاتا ہے۔

جذام - کوڑھ

LEPROSY

اسباب :- مادہ سورا، مرض آشک، خراب غذا، کثافت و غلاظت اور خرابی خون وغیرہ۔ کبھی یہ مرض موروثی ہوتا ہے اور کبھی اس کا کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا۔ جدید تحقیق کے مطابق اس بیماری کا باعث ایک خاص قسم کا جراثیم ہے۔ علامات :- یہ ایک متعدی مرض ہے جو ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتا ہے، یہ بیماری مادہ سورا کی انتہائی خرابی کی تصویر ہے۔ اس میں ہاتھ پاؤں اور انگلیوں کے جوڑوں میں درم ہو کر مواد پڑ جاتا ہے۔ انگلیاں رفتہ رفتہ سڑ کر چھڑ جاتی ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بالکل غائب ہو جاتی ہیں۔ شکل نہایت گھناؤنی ہو جاتی ہے۔ ناک بیٹھ جاتی ہے اور تمام جسم سے بدبو آیا کرتی ہے۔ خدا اس مرض سے محفوظ رکھے۔

کوڑھ کی دو بڑی قسمیں ہیں ایک بے حسی والا اور دوسرا ابھار دار۔ بے حسی والے کوڑھ میں ابتداء میں مقام ماؤفہ پر چند دھبے پیدا ہوتے ہیں جو بالکل بے حس یعنی سُن ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس مقام پر سوئی بھی چھو دیں تو معلوم نہیں ہوتا۔ پھر ان دھبوں کے مقام پر زخم بننے لگتے ہیں مگر ان میں درد نہیں ہوتا۔ جب یہ مرض ترقی پکڑ جاتا ہے تو اعضاء گلنے سڑنے لگتے ہیں۔ جس کا انجام عموماً خراب ہی ہوتا ہے۔

ابھار والے کوڑھ میں جسم کے مختلف حصوں پر خصوصاً چہرہ پر ابھار

پیدا ہو جاتے ہیں۔ جلد سخت، بھوری اور کھردری ہو جاتی ہے۔ بخار آنے لگتا ہے اور مونچھوں اور داڑھی کے بال گر جاتے ہیں۔ آلات نطق بھی ماؤف ہو جاتے ہیں اور مختلف قسم کی تکالیف سے مریض کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو اچھی آب و ہوا میں رکھیں۔ صاف کپڑے پہنائیں اور روزانہ غسل کرائیں اور ہوا خوری یا مناسب ورزش کی ہدایت کریں۔ کھٹائی، مرج، ہیل اور ثقیل و بادی اشیاء سے پرہیز کرائیں۔ زود ہضم اور ہلکی غذا کھانے کو دیں۔

علاج :- جذام کے لیے اناکارڈیم $\times 6$ مفید ہے۔ اس کے علاوہ سفلیئم - سورنیم - بیسیلینم - وکسینم - ہائڈرو کوٹائل - گریفائٹس - آرم سٹ - آرٹک - آئیوڈائنڈ اور سلفر وغیرہ بہت اہم ادویہ ہیں۔

جھائیں

FRECKLES

اسباب :- خرابی ہاضمہ، دھوپ میں کام کرنا، خرابی سودا۔ فساد خون۔ حدت۔ مستورات میں سن یاس کا زمانہ (حیض بند ہو جانا) اور ایام حمل وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں چہرہ پر بھورے رنگ کی یا سیاہی مائل داغ پڑ جاتے ہیں جس سے چہرہ بہت بد نما ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے

داغ بعض وقت ہاتھ کی پشت پر بھی ہو جاتے ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو پہلے رفع کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق پرہیز ضروری ہے۔ مریض کو دھوپ سے بچنا چاہیے۔ ہاضمہ کو درست رکھنا چاہیے۔ غذا میں سبز ترکاریاں، تری، لوکی، پرول، شلجم اور بھنڈی وغیرہ کھائیں۔ اور تازہ پھل، انگور، سیب اور انار وغیرہ کا استعمال کریں۔

علاج :- اس مرض کے لیے لائیکو، پلسا ٹیلا، کلکیریا، سلفر، گریفائٹس، میورٹیک ایسڈ، لیکسیس اور ٹائٹک ایسڈ خاص دوائیں ہیں۔

کیل، مہاسے

ACNE

اسباب :- غلبہ خون، گرم غذا، خرابی خون، قبض اور کثرت مے نوشی وغیرہ۔ مستورات میں حیض کی خرابی سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض وقت بواسیری خون کے رک جانے سے چہرہ پر کیلیں اور مہاسے نمودار ہو جاتے ہیں۔

علامات :- یہ مرض عموماً جوانی میں ہوتا ہے۔ چہرہ پر (بعض وقت گردن اور سینہ پر) چھوٹی چھوٹی نوکیلی پھنسیاں نکلتی ہیں جو ابتدا میں دیکھنے میں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور ان میں سختی پائی جاتی ہے۔ پھر

ان میں مواد پڑ کر ان میں سے کیل خارج ہو جاتی ہے۔ جب یکے بعد دیگرے مسلسل ہمارے نکلتے ہیں تو سخت تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ چہرہ بد نما ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں ہمارے آبلے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- اگر عورتوں میں حصی کی خرابی اس کا باعث ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ جسے دیکھو اپنے موقع پر۔ غذا ہر حال میں ہلکی اور زود ہضم دیں۔ زیادہ گرم غذا نہیں چٹھٹی اور مسالہ دار اشیاء اور مشراب کباب سے پرہیز کریں۔ سرخ مرچ، مٹھائی اور گوشت کا کھانا بھی ترک کر دیں۔

علاج :- بربرس۔ ایکوئی فولیم۔ اورم۔ سیپیا۔ سلیشیا۔ کاربودج۔ کاشکم۔ کالی بروم۔ کونیم۔ لیکسیس۔ تھوجا۔ کالی کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ ڈنکارا۔ کلکیریا۔ سلفر۔ سورنیم۔ اور رٹاکس وغیرہ مشہور ادویہ ہیں سے ہیں۔

مسمے

WARTS

اسباب :- مادہ سودا، مرض آتشک اور فساد خون وغیرہ۔

علامات :- مسمے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض مسمے گوبھی کے پھول کی مانند ہوتے ہیں جو جسم کے کسی حصے پر ہو سکتے ہیں لیکن عموماً چہرہ یا ہاتھ پر پائے جاتے ہیں۔ بعض مسمے پیلے ہوتے ہیں اور بعض سخت، بعض مسموں کی شکل خاردار دونوں کی مانند ہوتی ہے۔ جب یہ چہرے پر

ہوتے ہیں تو اُسے بہت بد نما بنا دیتے ہیں۔
 علاج :- (۱) اس مرض کے لیے تھو جا۔ گلگیر یا۔ اور کاسٹم
 بہت عمدہ دوائیں ہیں۔

- (۲) گوشت والے مسوں میں کاسٹم یا رٹاکس دیں۔
- (۳) نوکیلے مسوں میں گلگیر یا۔ تھو جا۔ یا سپیا دینا چاہیے۔
- (۴) اگر سے صرف چہرہ پر ہوں تو گلگیر یا کرب یا کاسٹم مفید ہے۔
- (۵) انگلیوں میں سے گلگیر یا۔ کاسٹم یا سپیا سے درست ہوتے ہیں۔
- (۶) جا بجا مسوں کے لیے گلگیر یا۔ کاسٹم، یا نیٹرم میو دینا چاہیے۔
- (۷) ابتدا میں عموماً رٹاکس دینے سے فائدہ ہو جا یا کرتا ہے۔ اگر
 رٹاکس کام رہے تو تھو جا دینا چاہیے۔ اگر تھو جا اپنا کام انجام دینے
 میں تباہی کرتا ہو تو درمیان میں ایک آدھ خوراک سلفر کی دیدینا چاہیے۔
 یہ تینوں دوائیں اکثر حالات میں بہت عمدہ کام کرتی ہیں۔

حصہ اول ختم شد

حصہ دوم

باب اول

بخار-تپ

ٹائیفائیڈ فیور-تپ محرقہ

TYPHOID FEVER

اسباب :- آنتوں میں سمیت ، آنتوں میں ورم ، خراب غذا ، گندی آب و ہوا ، عام کمزوری ، گندہ پانی یا دودھ کا استعمال وغیرہ ۔

علامات :- یہ ایک قسم کا میعادہ بخار ہے جو برابر تین ہفتہ تک قائم رہتا ہے ۔ پانچ سال سے لے کر بیس سال کی عمر تک اس بیماری کے ہونے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے ۔ یوں تو یہ مرض کسی عمر میں بھی ہو سکتا ہے ۔

اس بیماری میں بخار پہلے ہی ہفتہ میں بڑھنا شروع ہوتا ہے ۔ صبح کو

عموماً ۱۰۲ اور شام کو ۱۰۵ درجے تک پہنچتا ہے نبض فی منٹ ۱۲۰ بار یا اس سے بھی زیادہ تیز چلنے لگتی ہے۔ بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ زبان پر موٹا میل پایا جاتا ہے۔ بعض حالات میں زبان سیاہی مائل ہو جاتی ہے یا پھٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور اس کی نوک پر کچھ سرخی ہوتی ہے پیٹ میں گرانی یا درد ہوتا ہے۔ کبھی سخت قبض ہوتا ہے اور کبھی اسہال آنے لگتے ہیں جن میں سخت بدبو ہوتی ہے۔

دوسرے ہفتہ میں سینہ اور پیٹ میں سرخ دھبے یا دانے سے نمودار ہوتے ہیں مگر بعض مریضوں میں ایسا نہیں بھی ہوتا ہے۔ مریض حد درجہ کمزور ہو جاتا ہے اور ہذیائی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ گھبراہٹ، الجھن، پریشانی اور بکواس شروع ہو جاتی ہے۔ غفلت بڑھ جاتی ہے۔ مریض پکارنے سے بولتا ہے مگر جواب دے کر پھر غافل ہو جاتا ہے۔ گویا دوسرا ہفتہ مریض کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ اگر کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو اور مناسب پرہیز و علاج جاری رہے تو تیسرے ہفتہ میں علامات میں تخفیف ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مریض بتدریج صحت یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ضعف و نقاہت بڑھ جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، نبض نہایت باریک اور کمزور چلنے لگتی ہے۔ اگر بخار ۱۰۵ درجہ سے تجاوز کر جائے اور دست کثرت سے آنا شروع ہو جائیں یا منویہ ہو جائے تو مریض مشکل سے بچتا ہے۔

نوٹ: (۱) فیفاؤڈ میں قبض کا مریض دست دالے مریض سے بہتر سمجھا

جاتا ہے۔

پہرہ ہنیر و ہدایات :- مریض کو پاک و صاف جگہ پر رکھیں اور نقل و حرکت سے باز رکھیں۔ مریض کا تھوک، بلغم و پاخانہ وغیرہ کسی دوا سے جلا دیں یا بستی سے دُور زمین میں دفن کروادیں تاکہ اُس کی چھوت دوسرے تندرست انسانوں کو لگ کر مبتلائے مرض نہ کر دے۔ چونکہ اس مرض میں آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں یا شہید قسم کی سمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے غذا کا رکھ رکھاؤ اس مرض میں بہت ضروری ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ ثقیل غذا اس مرض میں زہر کا حکم رکھتی ہے۔ جوش دیا ہوا دودھ، صابو دانہ، مونگ کی دال کا پانی یا آتش جو دینا مناسب ہوا کرتا ہے۔ پینے کا پانی کھولا کر سرد کر لینا چاہیے یا لوہے کا، گچھا ہوا پانی دینا چاہیے۔ ہذیانی کیفیت ہو جانے پر پانی میں کپڑا تر کر کے پخوڑ کر سر پر رکھیں یا پاشویہ کر دیں اگر مریض پھل کی خواہش کرے تو میٹھا لیمو، انار، انگور اور سنترہ دیا جاسکتا ہے لیکن کھانسی کی حالت میں یا نمونیہ کی سی کیفیت میں انار نہ دیں البتہ سنترہ یا میٹھا لیمو کا رس گرم کر کے دے سکتے ہیں۔

انتباہ :- صحت ہو جانے کے دو چار روز کے بعد تک پہرہ ہنیر قائم رکھنا چاہیے ورنہ بعض وقت مرض دوبارہ عود کرتا ہے اور بخار پھر دو تین ہفتہ لے لیتا ہے۔

علاج :- (۱) یہ عادی بخار جس میں قبض ہو، پاخانہ خشک ہوتا ہو، بھوک ندارد، سر میں درد ہو، ہونٹ و زبان خشک ہو تو برائی اورتیا

دینا چاہیے۔ ابتدائی حالت میں یہ دوا خوب کام کرتی ہے بشرطیکہ کسی قسم کی اور پیچیدگی نہ ہو۔ اس دوا کے بعد اگر ایک خوراک سلفر کی دے دی جائے تو دوا کے اثر میں اور بھی تیزی ہو جاتی ہے۔

(۲) تپ محرقہ جس میں دست آتے ہوں، مریض کی زبان کی نوک پر مثلثی یعنی تکو نا نشان ہو باقی زبان مٹیالی ہو، پیاس اور بے چینی زائد ہو تو رسٹاکس دیں۔

(۳) اگر رسٹاکس سے دست نہ رکھیں تو آرنک دیں بشرطیکہ تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس ہو، کمزوری حد درجہ ہو اور دانتوں پر میل ہو۔

(۴) سر میں درد، ٹپکن اور سرسامی کیفیت ہو، بخار بہت زیادہ ہو، مریض روشنی و شور و غل برداشت نہ کر سکتا ہو، چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں تو بیلادونا دینا چاہیے لیکن اگر سرسامی کیفیت میں مریض اپنا سر تکیہ سے رگڑتا ہو یا شدید سرسام ہو اور مریض وحشیانہ حرکات پر اُتر آیا ہو جس کو بیلادونا شفا دینے سے قاصر رہا ہو تو سٹرامونیم دینا چاہیے۔

سرسامی کیفیت میں ہیوسٹس اور اوپیم بھی حسب ضرورت دیتے ہیں۔ یہ بھی ہذیان کے لیے عمدہ دوائیں ہیں۔

(۵) شروع درجہ میعاد دی بخار میں جبکہ آنتوں کی خرابی نہ ظاہر ہوئی ہو یا یوں کہنا چاہیے کہ میعاد دی بخار کا خدشہ ہو رہا ہو اور ابتدائی علامات (بخار، درد سر، گھبراہٹ وغیرہ) ظاہر ہو رہی ہوں تو پشیا بڑی نفیس دوا ہے اس دوا کے دینے سے عموماً مرض کا زور بہت گھٹ جاتا ہے اور تمام

قسم کی پیچیدگیوں سے نجات مل جاتی ہے۔

(۶) جب بخار ۱۰.۵ سے بھی تجاوز کر جائے اور رسمی کیفیت پیدا ہونے لگے تو پائروجنم دینے سے مریض کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے بعض حالات میں جب ٹائیفائڈ میں بخار ۱۰.۶ درجہ سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت کے لیے پائروجنم دوا ہے۔

(۷) ٹائیفائڈ بخار مریض غنودگی میں پڑا رہے صرف جگانے پر ہوش میں آئے۔ بخار تیز ہو، کمزوری زائد ہو تو فاسفورک ایسڈ دوا ہے۔
(۸) میعاد بخار جب روحانی قوت زائد ہو گئی ہو، نبض تیز اور غیر منتظم ہو جائے، مریض ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرے تو کاربودج دیں۔

(۹) باپوکیک میں فیرم فاس اور کالی میور باری باری سے دیں۔
ان دواؤں کو ہومیو پیتھک ادویہ کے ساتھ ساتھ بھی چلا سکتے ہیں۔
(۱۰) ان کے علاوہ آرنیکا، چائنا، کلکیریا کارب، میورٹیکا ایسڈ، ورپٹرم الیم، لیکسیس، پلسا ٹیلا، زنکم، فاسفورس اور لائیکو بہت عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

ملیریا - جاڑا بخار

MALARIA

اسباب:- موسم برسات میں زمین سے تبخیر کا اٹھنا، دلدلوں، گٹھوں

یا جھیلوں کے پانی کا تعفن، خراب ہوا، نباتی یا حیواناتی مادوں کی سڑاند کا ہوا میں مل کر بذریعہ مسامات یا سانس جسم میں جذب ہونا۔ نامناسب غذا، شدید قبض وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں۔

جدید تحقیق کے مطابق ایک خوردبینی کیڑا اس کا موجب ہوتا ہے جو مرطوب زمین اور دلدل وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک خاص قسم کا مچھر اس کا باعث ہوتا ہے جو ملیریا کے زہر کو انسان کے جسم میں داخل کرتا ہے۔ (ایلو پیٹھک تھیوری یہی ہے) اس طرح سے تندرست انسان کے جسم میں ملیریائی زہر سرایت کر جاتا ہے اور بذریعہ مچھروہ زہر دوسرے تندرست انسانوں میں پہنچ جاتا ہے۔

علامات :- اس بخار کو تپ لرزہ، نوبتی بخار یا جوڑی بخار بھی کہتے ہیں۔ یہ بخار عموماً لرزہ سے آتا ہے۔ بخار آنے سے قبل اعضا شکنی ہوتی ہے۔ جمائیاں آتی ہیں اور سردی لگ کر بخار آ جاتا ہے بعض حالات میں صرف ہاتھ اور پاؤں کے ناخن ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر بخار آ دباتا ہے۔ کبھی سردی نہیں بھی لگتی ہے۔ بخار عموماً وقت مقررہ پر آتا ہے۔ کبھی ہر روز، کبھی ایک دن ناغہ کر کے اور کبھی ہر چوتھے روز بخار آتا ہے بعض وقت ملیریا کا زہر انسان کے جسم میں بیکار ٹھہرا رہتا ہے اور ہر ماہ دو چار روز کے لیے مقررہ تاریخوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔

اس بخار میں عموماً طحال بڑھ جاتا ہے اور بعض وقت جگر بھی ماؤف ہو جاتا ہے۔ درد سر، شدید پیاس، الجھن اور متلی وقت کی شکایت ہوتی ہے۔

بخار نہایت تیز ہوتا ہے بعض وقت ۱۰۵ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کبھی مریض پر ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر سپینہ نکل کر بخار اتر جاتا ہے۔
نوٹ:- ملیریا بخار کے علاج میں تساہلی ہرگز نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اثرات مابعد اکثر بہت خراب ہوا کرتے ہیں۔ جگر میں ورم آ جانے کے باعث یرقان یا اسہال و پھیش کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بعض وقت گردے بھی مائل ہو جاتے ہیں اور خونی پیشاب اور البیومن وغیرہ خارج ہونے لگتی ہے۔ کبھی کھانسی، دمہ اور منونہ کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات:- مریض کو نہایت ہلکی غذا دیں بہتر یہ ہے کہ سوائے دودھ یا مونگ کی کھچڑی کے دوسری غذا نہ دیں۔ پانی نہایت صاف یا کھولا کر سرد کیا ہوا پینے کو دیں۔ مکان کے آس پاس خوب صفائی رکھیں، قریب کے دلدلوں میں مٹی کا تیل چھڑک دیں اور رات کو پتھر دانی لگا کر سوئیں یا کڑوا تیل جسم پر مل لیا کریں تاکہ مچھروں کے حملے سے حفاظت رہے۔ اس مرض میں قبض کا دفع کرنا اشد ضروری ہوتا ہے۔ شدت پیاس کی حالت میں آلو، بخارا یا سوڈا واٹر یا لیمو چوسنے کو دیں۔ رفع تشنگی کے لیے برف بھی چوسنے کو دے سکتے ہیں۔

علاج:- (۱) اگر صرف ناخن ٹھنڈے یا نیلے ہو کر بخار آجائے، درد سر اور قبض ہو نیز متلی معلوم ہوتی ہو تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔
 اس کا مریض لرزہ نیز تیز بخار کی حالت میں جسم پر سے کھان نہیں آتا سکتا اور بخار عموماً رات کو یا علی الصبح آیا کرتا ہے۔

(۲) اگر مریض کو کونین کا بے تحاشہ استعمال کرایا گیا ہو یا معدہ خراب ہو اور شدید درد سر اور متلی ہو، جاڑا جس کی زیادتی گرم مکان میں اور بیرونی گرمی سے ہو یعنی اوڑھنے سے بھی لرزہ میں کمی نہ ہو یا اگر ملیریا کی علامات آپس میں ملی جلی ہوں اور نطاہر کوئی دوا علامات سے مطابقت نہ کرتی ہو تو اپیکاک دینا چاہیے۔ ڈاکٹر جہار اپنی چالیس سالہ پریکٹس میں تمام قسم کے نوبتی بخاروں میں پہلے اپیکاک ہی دیا کرتے تھے۔ اس کے دینے سے یا تو بالکل شفا ہو جاتی ہے یا کم از کم دوسری دوا کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے مصنف کا تجربہ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔

(۳) اگر بخار باری سے ٹھیک وقت پر ہر تیسرے، ساتویں یا پندرھویں دن آئے۔ سر میں شدید درد ہو اور مریض کا چہرہ زرد ہو گیا ہو، کمزوری و نقاہت زیادہ ہو تو چائنا مفید ہے۔ جگر اور طحال کی علامات میں چائنا اور بھی مفید دوا بن جاتی ہے۔ تلی بڑھ جانے کی حالت میں اس دوا کا خاص درجہ ہے۔ بخار صرف دن کے وقت آنا اس دوا کی مخصوص علامتوں میں سے ہے۔ اگر اس دوا کی طاقت منبر ۲ کو دورہ آنے کے ایاب گھنٹے کے بعد مریض کو دیں تو عموماً ایک ہی خوراک کافی ہوا کرتی ہے اور دوبارہ دورہ کی نوبت نہیں آتی۔

(۴) اگر پیاس قطعاً نہ ہو اور مرغن غذا کھانے کے بعد ملیریا بخار حملہ آور ہوا ہو، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو، معدہ کی خرابی موجود ہو، ملغم یا صفرہ کی قے ہو تو پیاٹیل دینا چاہیے۔ اگر علامات بدلتی رہیں یا کونین کا بجا استعمال

کرایا گیا ہو تب بھی پسائیل مفید ہوتا ہے۔ اس کے فیل ہو جانے کے بعد انٹم کروڈ دینا چاہیے۔

(۵) بخار جبکہ کمزوری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی معلوم ہوتی ہو، پیٹ میں درد یا متلی کی شکایت ہو، بے چینی زیادہ پائی جائے اور تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس ہو تو آرسنک مفید ہے۔

(۶) اگر ٹھنڈے پانی کی شدید پیاس ہو، مریض ایک وقت میں زیادہ مقدار میں پانی پیتا ہو، سر میں شدید درد ہو، زبان بالکل خشک ہو، جاڑے کے دوران اعضاء میں سخت درد ہوتا ہو تو برائی ادویہ دوا ہے۔

(۷) اگر جلدی امراض کے دب جانے سے بخار آنے لگے یا جب کسی دوسری دوا کی سلامت صاف نہ ظاہر ہوتی ہو، جاڑے کے بعد بخار اور پسینہ کی زیادتی ہو، جاڑا پیٹھ پر خاص طور سے محسوس ہوتا ہو، جلد خشک ہو، ہتھیلی اور تلووں میں جلن معلوم ہوتی ہو تو سلفر دینا چاہیے۔ مرن جالتوں میں یہ دوا اور بھی عمدہ کام کرتی ہے اور بعض اوقات دوسری دواؤں کے لیے راستہ صاف کر دیتی ہے۔

(۸) اگر بخار آنے سے قبل انگڑائیاں اور جمائیاں کثرت سے آتی ہوں، مریض کو نیند زیادہ معلوم ہوتی ہو، قبض، متلی، پسینہ اور تمام جوڑوں میں درد پایا جائے تو سائی مکس نمبر ۶ اکسیر ہے۔

(۹) بعض ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ میریامین کیمفرد ٹنکچر حیرت انگیز کام کرتا ہے۔ باری آنے سے چھ گھنٹے قبل دس قطرے دوا کو ہلکے شوگر میں

ڈال کر دینا چاہیے اور دوسری خوراک اس کے تین گھنٹے کے بعد۔ بخار کی حالت میں کوئی دوا نہ دینا چاہیے۔

(۱۰) جاڑا بخار جس کے ساتھ دست یا پھیش کی بھی شکایت ہو تو اسٹونیا ۲ ٹینکچر ۲ سے ۵ قطرے فی خوراک دن میں چار بار دیں۔

(۱۱) باپوکیک میں نیٹرم سلفٹ اور فیرم فاس باری باری دیں۔

(۱۲) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آرنیکا۔ اگنیشیا۔ چائنم سلفٹ۔

ڈنکارا۔ رشاکس۔ نیٹرم میور۔ ورٹیم ابم۔ جلیسم۔ بیلاڈونا اور لائیکو بہت عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

وقت کے اعتبار سے ادویہ کا انتخاب

رات کو ۱ بجے یا ۲ بجے جاڑا بخار آتا ہو تو آرسنک

۲ بجے سے ۴ بجے تک۔ آرنیکا۔ سڈرن۔

پچھلی رات کو ۴ بجے سے ۵ بجے تک۔ سلفر۔ نکس و امیکا۔ چائنا۔

صبح کو ۶ بجے۔ ورٹیم ابم۔ نکس و امیکا۔ فیرم۔

۷ بجے سے ۹ بجے تک۔ یوٹپوریم پروف (بعض حالات

میں پاڈوفائلیم)

صبح کو ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک۔ نیٹرم میور (بعض حالات میں

سٹافم، کیکیٹس اور نکس و امیکا)

دن کو ۱۲ بجے۔ سلفر (بعض حالات میں آرسنک)

دن کو ۱ بجے - آرسنک (بعض حالات میں پلسا ٹیلا)
 " ۲ سے ۳ بجے تک آرسنک - انٹیم ٹارٹ - ایپس - سڈرن -
 چائنم سلف - شافی سیکریا - تھوجا -

۴ بجے شام - ایپس - پلسا ٹیلا - سڈرن - لائیکو -
 شام کو ۴ بجے سے رات کے ۸ بجے تک - لائیکو (بعض
 حالات میں کالی کارب - تھوجا - نیٹرم میور)

۵ بجے شام - پاڑوجنم - رٹاکس - ہسپر نیٹرم سلف (بعض
 حالات میں پلسا ٹیلا - چائنم سلف - سلفر - سڈرن اور لائیکو)
 ۹ بجے رات - آرسنک - برائی اونیا (بعض حالات میں بووسٹا
 اور نکس و امیکا)

رات کو ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک - آرسنک - چائنم سلف -
 کاسٹیکم - سلفر - کیکٹس -

نزلاوی بخار

INFLUENZA

(دیکھو انفلوئنزہ حصہ دوم باب پنجم میں)

لال بخار۔ تپ سرخ

SCARLET FEVER

اسباب :- یہ ایک متعدی مرض ہے جو مریض کے پاخانہ پیشاب لعاب دہن یا سانس کے ذریعہ دوسروں کو لگ جاتا ہے۔ مریض کے بستر، برتن اور کتاب وغیرہ سے بھی اس مرض کی چھوت لگ جایا کرتی ہے۔ خراب غذا، گندگی و کثافت اور خرابی معدہ وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں۔ بچوں کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں سر میں سخت درد ہوتا ہے، بخار یکا یک بہت تیز آ جاتا ہے۔ بعض حالات میں ۱۰۶ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ دوسرے ہی دن گردن اور سینہ پر اور پھر تمام جسم پر سرخ رنگ کے چٹے نمودار ہوتے ہیں۔ صلق سرخ اور متورم ہو جاتی ہے۔ سانس لینے میں اور کوئی چیز نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہفتہ کے بعض دانے مرجھا جاتے ہیں اور بھوسہ جھڑ جاتی ہے۔ اگر دانے یا چٹے دب جائیں یعنی باقاعدہ سطح جسم پر نہ آئیں تو سخت ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے اور مریض مشکل سے بچتا ہے۔ اس مرض کو خسرہ اور ڈفٹیریا سے تفریق کرنا چاہیے۔ سرخ بخار میں چٹے بڑے بڑے اور چکنے ہوتے ہیں۔ انگلی سے دبانے سے چٹوں کی سرخی غائب ہو جاتی ہے اور انگلی ہٹانے سے پھر آ جاتی ہے۔

نوٹ :- یہ نہایت خطرناک مرض ہے اس کے اثرات مابعد بھی بعض اوقات

بہت خراب ہوتے ہیں مثلاً آنکھ کا جاتے رہنا، کان کی تکالیف، کٹھیا، استسقاء، درم گردہ، ٹائیفائیڈ اور ڈنبل وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض ہندوستان میں بہت کم ہوتا ہے۔ انگلستان اور امریکہ میں عام طور سے پایا جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کا کمرہ نہایت صاف ستھرا رکھیں۔ اس کا تھوک و پاخانہ پیشاب کو کسی دوا سے جلا دیں یا بستی سے باہر گڈھے میں دفن کر دیں، گردن متورم ہو جانے کی حالت میں اس کی سینک کریں۔ حلق کو کسی مناسب غرارہ سے پاک و صاف رکھیں۔ غذا میں صرف دودھ، آتش جو، مونگ کی کھڑی اور اسی قسم کی نہایت ہلکی چیزیں دیں۔

علاج :- اس مرض کے لیے ایپس، سلفر، گلکیریا، بیلادونا، لائیکو۔ رٹاکس، اپیکاک، مرک، ہیسپر، زنکم، برائی اونیاء، کاربودج، سورنیم، آرسنک، کینتھرس، کیوپرم اور فاسفورس وغیرہ عمدہ دوائیں ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔ حفظاً تقدم کے طور پر تین روز تک ہر صبح کو بیلادونا کی ایک خوراک دیں یا کالی میوہ $x 4$ استعمال کریں۔

تپ لازمی۔ تپ دائمی

REMITTENT FEVER

اسباب :- گندی آب و ہوا، خراب غذا، ثقیل اور باسی چیزوں کا کثرت استعمال، عام کمزوری، آنتوں میں سمی کیفیت یا درم کا ہونا، خرابی معدہ

اور امراض جگر و امعاء اور ملیریا کا زہر وغیرہ ۔

علامات :- یہ وہ بخار ہے جو کم و بیش ہوتا رہتا ہے مگر اترتا نہیں گویا ہر وقت بخار کا رہنا اس میں پایا جاتا ہے ۔ صرف صبح کے وقت بخار میں ذرا سی تخفیف ہو جایا کرتی ہے ۔ بخار صبح کو عموماً ۱۰۰ یا ۱۰۱ اور شام کو ۱۰۲ یا ۱۰۳ درجہ تک رہتا ہے ۔ بخار باوجود کم ہونے کے مریض میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے ۔ متلی ، پیاس اور اعضا خشکی ہوتی ہے ۔ طبیعت کسلند رہتی ہے ۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے ۔ ہر وقت ہلکا سا درد سر میں یا بعض وقت تمام جسم میں پایا جاتا ہے ۔ پیشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے ۔ عموماً یہ کیفیت ایک ہفتہ سے لے کر گیارہ یا چودہ روز رہتی ہے جس کے بعد مریض صحت یاب ہو جاتا ہے ۔

اگر اس کے علاج میں تساہلی کی جائے یا غلط علاج کیا جائے تو ٹائیفائیڈ کی تمام علامات رونما ہو جاتی ہیں ۔ سرسامی کیفیت شروع ہو جاتی ہے جس کے علاج میں تمام دشواریاں حائل ہوتی رہتی ہیں اگر کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو تو کوئی اندیشہ کی بات نہیں ہوتی اور زیادہ سے زیادہ دو ہفتہ میں مریض شفا کے کلی حاصل کر لیتا ہے ۔

پرہیز و ہدایات :- اس مرض میں تمام رکھ رکھاؤ مثل ملیریا بخار اور ٹائیفائیڈ بخار کے کریں (جسے دیکھو اپنے موقع پر) اناج کی غذا بند کریں اور آتش جو ، دودھ ، سایو دانہ ، آلو بخارا ، منقہ ، میٹھا لیموں اور مونگ کی وال کا پانی دیں ۔

علاج :- (۱) ابتدا میں جب فوراً بخار کا دورہ ہو، صفراوی قے ہو، بے چینی اور پیاس موجود ہو تو اکونائٹ دینا چاہیے۔

(۲) بچوں میں کیمو ملا بہتر کام کرتا ہے بشرطیکہ ایک گال سرخ اور ایک گال زرد ہو، بے چینی زیادہ ہو۔ بچہ چڑچڑا ہوا اور ہر وقت رویا کرے۔

(۳) اگر بار بار متلی و قے ہوتی ہو، ذائقہ کڑوا ہو، شدید درد سر ہو، قے میں بلغم یا پت گریں، زبان کا رنگ سفید اور زردی مائل ہو تو اپیکاک دوا ہے۔

(۴) اگر مریض جلبن اور پیاس کی شکایت کرے تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس ہو، بے چینی زیادہ ہو، سرد ہوا سے تکلیف بڑھ جاتی ہو، مریض کو ہر وقت اوڑھنے کی خواہش رہتی ہو، تکلیف بارہ بجے یا ایک بجے رونما ہوتی ہو یا زیادہ ہو جاتی ہو تو آرسنک دینا چاہیے۔

(۵) اگر یہ نہ سمجھ میں آتا ہو کہ کس قسم کا بخار ہے۔ بخار میں غفلت اور غشی ہو یا ٹائیفائیڈ کا خطرہ نظر آ رہا ہو تو بٹیشیا دینا چاہیے۔ یہ دوا ہر بخار میں مفید ہے اکثر بخار کو قبل از ميعاد توڑنے میں یہ دوا تنہا کامیاب ہو جاتی ہے۔

(۶) اگر قبض ہو اور پاخانہ خشک ہوتا ہو، منہ خشک ہو، پیاس زائد ہو، کھانسی بھی خشک آتی ہو، نقل و حرکت سے چکر یا متلی معلوم ہونے لگتی ہو۔

سر میں شدت کا درد ہوتا ہو۔ زبان پر زرد میل پایا جائے تو برائی ادویہ مفید ہے۔

(۷) اگر ہونٹوں و مسوڑھوں پر زخم یا دانے نمودار ہو جائیں، پاخانہ آؤں

ملا ہوا ہونے لگے، سانس بدبودار ہو، پیٹ میں یا جگر کے مقام میں

خفیف سادرد ہوتا ہو تو مرک دینا چاہیے۔

(۸) اگر بخار بہت تیز ہو جس سے مریض کا چہرہ تپتا ہوا معلوم ہوتا ہو،

آنکھیں سرخ ہوں، پیر ٹھنڈے ہوں، بخار میں پیاس نہ ہو تو بیلادونا دیں۔
سرسامی کیفیت میں یہ دوا اور بھی عمدہ کام کرتی ہے۔

(۹) اعصابی مزاج والے مریض، آنکھوں میں بھاری پن جس کی وجہ

سے پپوٹے نہ کھل سکیں، پیاس نہ دار۔ ٹانگوں میں درد اور دھکن، چاند پر
گرمی، کھٹی ڈکاریں۔ ذائقہ کڑوا ہو تو جلیسم دیں۔

(۱۰) باپو کیمک میں فیرم فاس دیں۔ بعض حالات میں کالی میور کے

ساتھ باری باری دینا مفید ہوا کرتا ہے۔ ہذیانی کیفیت میں کالی فاس کے
ساتھ یکے بعد دیگرے دیں۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ رسٹاکس۔ چائنا۔ لائیکو۔ ایپس

نکس و امیکا۔ نیٹرم میور۔ سلفر۔ نیٹرم سلفٹ اور پاڈہ فائلم کا شمار اہم ترین
ادویہ میں سے ہے۔

(۱۲) بعض حالات میں بخار ٹھیک وقت پر آتا ہے اس کے لیے

دیکھو بلیریا کے تحت میں "وقت کے لحاظ سے ادویہ"

گردن توڑ بخار - ڈنگوفیور

BREAK BONE FEVER

یہ بھی ایک قسم کا متعدی و بانی بخار ہے۔ جو غذا کی خرابی، آنتوں میں سمیت، اور ہوا کی کثافت و غلاظت سے پھیل ا کرتا ہے۔ بخار کے ساتھ بے چینی اور گھبراہٹ پائی جاتی ہے۔ بخار ۱۰۳ سے ۱۰۵ درجہ تک ہوا کرتا ہے۔ عضلات جوڑ اور ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ جسم پر سرخ سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے پانی بہا کرتا ہے۔ اس بیماری میں دو تین روز کے بعد علامات میں تخفیف ہو کر پھر مرض زور پکڑتا ہے اور اسی طرح دو تین دورے ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بتدریج مریض بالکل اچھا ہو جاتا ہے۔

علاج :- اس کا علاج مثل دوسرے بخاروں کے کرنا چاہیے۔ آرنیکا، یوپیوریم پرف - رشاکس - پیٹیشیا اور نیٹرم میور وغیرہ ادویہ اس بخار کے لیے قابل الذکر ہیں۔

پرسوت کا بخار

PUERPERAL FEVER

(دیکھو زچہ خانہ کا بخار حصہ دوم باب چارم میں)

تپ دق

HECTIC FEVER

اسباب :- عام کمزوری، مزمن بخار، جسم میں فاسد مادہ کا جمع ہونا، کثرت کار و تفکرات، مرض ذیابیطس، کثرت مباشرت، کسی اندرونی عضو میں ورم کا ہونا یا اس میں مواد کا پڑ جانا مثلاً پھیپھڑوں میں پیپ پڑ جانا۔ یا جگر میں ورم ہو کر مواد پڑ جانا، گردہ کا ماؤف ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- بعض وقت ابتدائی حالت میں مریض اور معالج دونوں کو اس مرض کا مشکل سے پتہ لگتا ہے۔ مریض سُست اور کسمند رہتا ہے بلا کسی ظاہری سبب کے لاغری شروع ہو جاتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد تیسرے پہر کو طبیعت گرنے لگتی ہے یا کھانا کھانے کے بعد حرارت آ جاتی ہے صبح کے وقت طبیعت بحال رہتی ہے۔

جب پھیپھڑے، جگر، آنت، معدہ یا گردہ وغیرہ میں ورمی کیفیت ہوتی ہے یا ان میں سے کسی میں مواد پڑ جاتا ہے تو سردی لگ کر بخار آتا ہے اور کچھ دیر کے بعد پسینہ نکل کر طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے۔ بخار عموماً تیسرے پہر کو آتا ہے بعض حالات میں رات کو بھی لرزہ سے بخار آتا ہے۔ اور حسب معمول پسینہ نکل کر بخار اُتر جاتا ہے۔ ہاتھ اور تلوؤں میں جلن سی ہوتی رہتی ہے۔ کھانسی آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے جس میں بھوک جاتی رہتی ہے۔ رخساروں پر میلے رنگ کا حلقہ سا بن جاتا ہے۔

لاغری کے باعث ہڈیوں کے سرے نکل آتے ہیں کنپٹیاں بیٹھ جاتی ہیں،
 پلکیں بھاری ہو جاتی ہیں، اور گردن باریک ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں چکناہٹ
 نمودار ہوتی ہے۔ کبھی پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ کبھی اسہال شروع
 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ شروع ہوتا ہے، بال گر جاتے ہیں،
 ناخن ٹیڑھے ہو جاتے ہیں صرف ہڈی چمڑا رہ جاتا ہے۔ پاؤں پر ورم
 آ جاتا ہے اور مریض نہایت نحیف و ناتواں ہو کر راہی ملکِ عدم ہو جاتا ہے۔
 نوٹ:- تیسرے پر کو بخار کا ہو جانا، یا کھانے کے بعد تپ کا ظاہر ہونا
 اس مرض کے ابتدائی درجہ کی رہنما کن علامت ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو رنج و غم و تفکرات سے دور رکھیں
 اور صفائی کا خاص اہتمام کریں۔ تبدیل آب و ہوا کے لیے کسی کھلی اور
 بارونق جگہ پر مریض کو رکھیں۔ کھٹائی، مرج اور تیل سے پرہیز کرنا بہت ثقیل،
 نفاخ اور باسی چیزیں مضر ہیں۔ مدقوق کے لیے گدھی کا دودھ بہت مفید
 ہے۔ گدھی کے بعد بکری کا دودھ غنیمت ہے۔ گدھی کے دودھ کا جسم پر
 مالش کرنا بھی بہت مفید ہوا کرتا ہے۔ علاوہ ازیں نیم برشت انڈا، یغنی اور کھیر
 وغیرہ مقوی اور ہلکی غذائیں کھانے کو دیں۔ پھلوں میں سیب، انار، انگور اور
 سنترہ وغیرہ دیں۔

علاج :- اگر تیسرے پر سے بخار ہو جاتا ہو، تمام جسم میں پسینہ بکثرت
 نکلتا ہو۔ کمزوری زیادہ ہو گئی ہو پھیپھڑوں کی دق ہو تو آرسنک ایوڈائیڈ ۳
 اکیر کا کام کرتا ہے یہ دوا اس وقت بھی مفید ہے جب پھیپھڑوں میں زخم

پڑچکا ہو یا پیدا ہو رہا ہو۔ نمونیا کے بعد بھی دق ہو جانے میں یہ دوا چوٹی پر کی ہے۔ پھیپھڑے کی حاد اور مزمن دونوں تکلیفوں کے لیے اس کا استعمال مفید ہے۔

(۲) جب سہل دق کا مرض شروع ہو تو ٹوبرکولینم نمبر ۳۰۰ یا نمبر ۱۰۰۰ دینا چاہیے۔ اس دوا کو حفظ ماتقدم کے طور پر بھی دے سکتے ہیں تیسرے پر بخار کا رہنا، پسینہ کی زیادتی اور کھانسی کا ہونا اس دوا کی مخصوص علامتیں ہیں۔ اگر ٹوبرکولینم فیل ہو جائے تو سفلینم دیں یا نیوموکسین نمبر ۱۰۰۰ کی ایک خوراک دے کر انتظار کریں۔

(۳) تپ دق کی ابتدا میں جب خشک کھانسی آتی ہو یا بلغم کے ہمراہ خون بھی نکلتا ہو تو اکلینفا انڈکا $3 \times$ یا ڈرٹیکر چار قطرہ فی خوراک ہر ۴ گھنٹہ کے بعد دیں۔

(۴) جب سہل دق بلغم خارج ہوتا ہو یا بلغم میں پیپ کی گولیاں پائی جائیں پسینہ بکثرت نکلتا ہو، کمزوری بہت بڑھ گئی ہو، پھیپھڑے ماؤت ہو گئے ہوں، پسینہ میں سوئیوں کی سی چھن ہوتی ہو تو کالی کارب نہایت مفید اور اہم دوا بن جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کالی کارب فیل ہو جائے تو نائٹرک ایسڈ دینا از حد مفید ہوا کرتا ہے۔

(۵) لمبے پتلے اور نازک مزاج والے انسان جو قدرتی طور پر ذہین ہوں، جن کا رنگ گورا یا زرد ہو، دق کا مرض ترقی کر چکا ہو، کھانسی، بخار اور گلہ بیٹھا ہوا ہو، دست بغیر درد کے آتے ہوں تو فاسفورس دوا ہے۔

(۶) دق کا بخار جو ہر وقت رہے۔ جس میں کمزور کرنے والے پسینے زیادہ مقدار میں پائے جائیں، دق والی کھانسی ہو جس میں انڈے کی سفیدی کی مانند

بلغم خارج ہوتا ہو۔ بدھمی پانی جائے جس میں کھانا پکنے کی خوشبو بھی ناگوار خاطر ہو اور متلی معلوم ہو۔ کمزوری ہو اور سینہ میں خالی پن کا احساس ہو۔ نینر سوئیوں کی سی چھن معلوم ہوتی ہو تو شام دوا ہے۔ اگر مریض اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہو تو شام ایک یقینی دوا بن جاتی ہے۔


(۷) دق کا بخار جو ۴ سے ۸ بجے شام تک خصوصیت سے پایا جائے۔ مریض جب کھانے پر بیٹھے تو ایک ہی لقمہ سے ایسا احساس ہو کہ حلق تک بھرا ہوا ہے نیز تھوڑی غذا جو معدہ میں پہنچے وہ ریا ح کی صورت اختیار کرے۔ نتھنے پنکھے کی مانند چلتے ہوں تو لائیکو پوڈیم مفید ہے اگر نمونیا میں بے احتیاطی سے علاج کے باعث دق کا مرض شروع ہو گیا، تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۸) اگر جسم زرد ہو گیا ہو اور اس پر چھڑیاں پڑ گئی ہوں، مریض میں خنازیری مادہ موجود ہو۔ باوجود غذا کھانے کے مریض سوکھتا چلا جاتا ہو، کمزوری زیادہ ہو گئی ہو، گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہو تو آئیوڈیم مفید ہے۔

(۹) اگر جسم زرد ہو گیا ہو، مریض دُبلتا ہوتا جاتا ہو، بخار رہتا ہو لیکن پھیپھڑا پورے طور پر ماؤٹ نہ ہوا ہو۔ حرکت کرنے سے سانس بھولنے لگتی ہو دق کا آغاز ہوا ہو۔ بلغم زرد یا سبز گاڑھا و متعفن خارج ہوتا ہو۔ سر پر پسینہ کی زیادتی ہو، پھیپھڑوں میں درد معلوم ہوتا ہو تو سلیشیا دیں۔

(۱۰) بایو کیمک میں ابتدائی دق میں کلکیر یا فاس مفید ہے۔ اس کو دوسری دوا کے ساتھ بھی یکے بعد دیگرے دے سکتے ہیں۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ مرک سال - مرک آئیوڈائیڈ -
 فاسفورک ایسڈ - ہمپیر - کاربودج - کالی بانی اور بٹیشیا وغیرہ کی طرف
 بھی توجہ کرنا چاہیے -



باب دوم

امراض ناگہانی

(مفصل خارجی علاج کے لیے دیکھو کتاب مخزن خارجی علاج)

آگ و غیرہ سے جلنا

BURNS & SCALDS

نوٹ :- آگ و غیرہ سے جلنے میں مناسب خارجی علاج کا ہونا بھی بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اکثر اوقات اندرونی و بیرونی ہر دو ادویہ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے شفا جلد تر ہو جاتی ہے۔

علامات :- جل جانے کی نوعیت مختلف ہوا کرتی ہے۔ کبھی جسم کا تھوڑا حصہ جل جاتا ہے کبھی تمام جسم بری طرح سے مازت ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں بڑے بڑے چھالے پڑ جاتے ہیں کبھی اندر سے سرخ

گوشت نکل آتا ہے۔ معمولی کیفیتوں میں سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ صرف ٹھلس جاتا ہے۔ کبھی جلے ہوئے مقام میں فاسدانہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے جس سے بخار تیز ہو کر ہذیانی کیفیت ہو جاتا کرتی ہے۔ اور مریض کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اگر کھپچرا یا حوام مغز پوری طرح سے ماؤف ہو جائے تب بھی نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔ معمولی جل جانے میں بخار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ مقام ماؤفہ پر جلن غضب کی ہوا کرتی ہے۔ شدید حالات میں بخار ہو جاتا ہے، کبھی لرزہ آ جاتا ہے، بے چینی حد سے زائد ہوتی ہے۔ مریض مانند ماہی بے آب کے بستر پر تڑپتا ہے۔ جلن ناقابل برداشت ہوتی ہے۔

ہدایات :- جلے ہوئے مقام کو فوراً سرد پانی میں ڈال دینا یا اس پر پانی لگا لینا سخت غلطی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سطحی جل جانے کی حالت میں بہترین علاج اس کو سینک دینا ہے۔ اگر ہاتھ یا انگلی وغیرہ جل گئی ہو تو اسے فوراً اسپرٹ میں (اگر اسپرٹ نہ مل سکے تو کسی ہومیوپیتھک ڈائلوشن میں) ڈبو لیں۔ اور اس وقت تک ڈبوئے رکھیں جب تک کہ درد کم نہ ہو جائے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہو تو اس پر اسپرٹ لگائیں اگر چھالے یا آبلے پڑ گئے ہوں تو کینتھرس مدرٹکچر ایک حصہ اور پانی ۸ حصہ ملا کر لگائیں یا اس میں کپرا ترکر کے مقام ماؤفہ پر رکھیں۔ چونے کا پانی بھی ہموزن نارمل یا سیٹھ تیل میں ملا کر جلے ہوئے مقام پر لگانا از حد مفید ہے۔ بارہا تجربہ میں آچکا ہے

علاج :- (۱) اگر جلن شدید ہوتی ہو تو کینتھرس یا کیپسکم دینے سے

جلن میں بہت تخفیف ہوتی ہے۔ چھالے پڑ جانے کی حالت میں کینتھرس کا استعمال بہت مفید ہے۔

(۲) اگر جل جانے میں بخار بھی ساتھ ساتھ ہو، پیاس، بے چینی اور الجھن زیادہ ہو تو اکونائٹ دوا ہے۔

(۳) اگر بڑی طرح سے جسم کا کوئی حصہ جل گیا ہو جس سے تشنجی کیفیت شروع ہو گئی ہو۔ شدت، درد اور جلن سے مریض مانند ماہی بے آب تر پتا ہو تو کیموٹا دیں۔

(۴) اگر جلے ہوئے زخم میں فاسدانہ کیفیت شروع ہو گئی ہو۔ بے چینی اور پیاس بدرجہ اتم موجود ہو لیکن مریض بیک وقت تھوڑا پانی پیتا ہو جلن ناقابل برداشت ہو تو آرسنک مفید ہے۔

(۵) اگر پرانے جلے ہوئے زخم دوبارہ خود کرائیں تو کاسٹم دوا ہے۔

(۶) اگر ہاتھ پاؤں اور سارا جسم کافی متورم ہو گیا ہو تو کلکیر یا کارب مفید ہے۔

(۷) باپوکیماک میں کالی میور $\times 3$ اندرونی اور بیرونی ہر دو طریقوں سے مجرب ہے۔

زہریلے جانوروں اور کیڑوں کا کاٹنا

BITES & STINGING OF INSECTS

- (۱) بھڑکائے میں دسپا بہت مفید ہے۔
- (۲) زہریلے کیڑے کا کاٹنا جس میں ڈنک لگنے کا سادہ درد ہو، ماؤفہ جگہ متورم ہو گئی ہو تو ایپس دیں۔ ٹنڈی چیزوں کے لگانے سے کمی ہونا اس کی مخصوص علامت ہے۔
- (۳) مختلف کیڑوں کے کاٹے میں جب بے چینی اور پیاس حد سے زیادہ ہو۔ مریض ایک وقت میں تھوڑا پانی پیتا ہو اور گرم چیزوں کے لگانے سے کمی ہوتی ہو تو آرسنک دوا ہے۔
- (۴) مچھر، پشتو اور دیگر مچو ننھے ننھے کیڑوں کے کاٹے میں لیڈم ہال بہت مفید ہے۔ اسی کو خارجی طور پر لگائیں۔
- (۵) بچھو کاٹے میں آرسنک دینا چاہیے۔ اور خارجی طور پر اڑیکا۔ شکر لگانا چاہیے۔
- (۶) گھڑی اور چوہے وغیرہ کے کاٹے میں ہائپرکیم اندرونی نیز بیرونی مفید ہے۔ انگلی، ناخن اور پاؤں کی انگلیوں میں اگر کوئی چیز کاٹ لے جس سے شدید قسم کا درد ہو تو بھی ہائپرکیم دوا ہے۔
- (۷) اگر کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے بعد زہر بادل ہو گیا تو ہتھکڑی

(۸) سانپ کلے میں گولنڈریانہ مدرٹکنچر سپدرہ قطرہ فی خوراک دیں۔
 (۹) باولے کتے کے کاٹے میں ہانڈ روٹو ملینم نمبر ۶ کسیر ہے اگر مریض
 پانی سے ڈرتا ہو تو بیلادونا یا سٹرامونیم دیں۔

(۱۰) باپوکیک میں نیٹرم میور مفید ہے۔ اس دوا کے محلول کو
 خارجی طور پر بھی لگا سکتے ہیں یا کاٹے ہوئے مقام پر سفوف نیٹرم میور
 چھڑک دیں یا مل دیں۔

(۱۱) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ رسٹاکس۔ پلاٹنا۔ کیسپکم اور
 کیمولٹا وغیرہ ادویہ کی طرف توجہ کریں۔

چوٹ اور زخم

BRUISE & WOUNDS

چوٹ لگنا، کچل جانا، موج آنا | علاج:- (۱) اگر کوئی چوٹ
 لگ گئی ہو یا اونچے سے گرنے

سے بدن دھوئیں لگیا ہو تو آرنیکا مفید ہے۔ ہر قسم کی چوٹ میں آرنیکا دوا
 ایک امتیازی درجہ رکھتی ہے اسی کو خارجی طور پر بھی لگانا چاہیے۔

(۲) اگر ہڈی میں چوٹ آئی ہو لیکن ہڈی ٹوٹی نہ ہو تو روٹا دینا چاہیے۔
 اس کے دینے سے ہڈی کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ اگر روٹا دینے
 کے بعد بھی ماؤفہ ہڈی میں درد باقی رہے تو سمفا ٹم دینا چاہیے۔

(۳) اگر ماؤفہ حصص کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے اور گنگرین ہونے کا خدشہ ہو تو آرٹک دیں۔ بشرطیکہ ماؤفہ حصہ کا رنگ سیاہی مائل ہو جائے اور غوانی یا بیگنی رنگ کے لیے سکیس دیں۔

(۴) اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو پہلے اس کی بندش باقاعدہ کر کے آرنیکا کی چند خوراکیں دیدینا چاہیے۔ اگر اس سے درد کم نہ ہو اور مریض درد سے تڑپ رہا ہو تو کمیو ملا دیں۔ اگر خدائے خواستہ کمیو ملا بھی فیل ہو جائے تو ہائپرکیم دیں۔ اعصاب کچل جانے یا پھٹ کر زخم ہو جانے کی حالت کے لیے ہائپرکیم خاص دوا ہے۔

(۵) اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو سمفاسٹم کے خارجی اور داخلی استعمال سے ہڈی جڑ جاتی ہے۔ اگر سمفاسٹم دینے کے باوجود ہڈی کے جڑنے میں وقت ہو تو کلکیر یا فاس دینا چاہیے۔ اس سے ہڈی بہت جلد جڑ جائے گی ہے بعض حالات میں کلکیر یا فلور سے بھی ہڈی جوڑنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ لیکن ہر حال میں پہلے باقاعدہ ہڈی کی بندش کر لینا ضروری ہے۔

(۶) ہڈی جڑ جانے کے بعد اگر درد قائم رہتا ہو تو مرک سال، روٹا یا کالچیکیم میں سے کوئی بھی دوا حسب علامت دیدیں۔

(۷) اگر موج آگئی ہو تو آرنیکا یا رٹاکس دیں یا دونوں باری باری سے دیں اور آرنیکا کو خارجی طور پر لگائیں۔ شاید کسی وجہ سے یہ دونوں دوائیں کام نہ کریں تو برائی ادویا دیں۔

(۸) اگر ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو تو روٹا دینا چاہیے لیکن پہلے

ہڈی کو اپنی جگہ پر کر کے باقاعدہ بندش کر دینا چاہیے۔

(۹) اگر ہڈی میں زخم آگیا ہو اور ہڈی بے ڈول ہو گئی ہو تو ایسٹھاس

کلکیر یا کارب، آرسنک اور سلیشیا میں سے کوئی دوا دیں۔

(۱۰) اگر چوٹ کے باعث کمزوری زیادہ ہو گئی ہو یا چوٹ میں زیادہ خون

نکل جانے سے مریض پر غشی طاری ہو رہی ہو تو چائنا کی چند خوراکیں دینا چاہیے۔

(۱۱) چوٹ جبکہ گانٹھ نہ پڑے بلکہ جلد پر سیاہ نیلگوں چھا پڑ جائے تو لیڈم دیں۔

(۱۲) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سلفر، بیلاڈونا، کلکیر یا کارب،

فاسفورس، سائیکوٹا اور کیو پریم اس ضمن میں قابل الذکر اور نہایت اہم

ہیں حسب علامت دیں۔

زخم | **علاج :-** (۱) کھلے ہوئے یا کٹے ہوئے زخموں کے لیے کیلنڈولا کا

خارجی استعمال بہت مفید ہے۔ اسی دوا کو طاقت یعنی پوٹنسی میں بھی

دینا چاہیے۔ اس دوا کے لگانے اور کھانے سے نہ تو زخم پکتا ہے اور نہ

فاسدانہ کیفیت ہوتی ہے۔ زخم کے اندمال کے لیے کیلنڈولا بڑی نفیس

چیز ہے۔

(۲) اگر اعصاب میں چوٹ اور زخم ہو یا انگلیاں ناخن اور اعضاء

کچل جائیں اور پھٹ جائیں جن میں ناقابل برداشت درد ہو تو ہائپرکیم دیں۔

اگر کچل جانے سے گوشٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل پڑے ہوں تب

بھی ہائپرکیم دوا ہے۔ سوئی وغیرہ سے چھدے ہوئے زخم جو تلوا دوا وغیرہ سے

ہو گئے ہوں اور جن میں اعصاب خاص طور پر زخمی ہوئے ہوں اس دوا کے

حلقہ اثر میں آتے ہیں۔

(۳) اگر نہایت تیز اوزار مثلاً تیز چاقو، ریزر، نشتر یا شیشہ وغیرہ سے زخم ہو تو سٹانی سیگر یا مفید ہے۔ خارجی طور پر ٹینکچر آرگیر یا لگائیں۔

(۴) اگر چھدے ہوئے زخموں میں ڈنک لگنے کا سادرو ہو، مقام ماؤفہ سرخ ہو جائے اور حد درجہ ذکی احس ہو اور سرخی مثل زہر باد کے پھیلنے لگے تو ایپس دینا چاہیے۔

(۵) سوئی وغیرہ سے چھدے ہوئے زخم کے لیے لیڈم دوا ہے۔ لیکن اگر سوئی ٹوٹ کر اندر رہ گئی ہو تو سلیشیا دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے سوئی خواہ جسم میں کسی جگہ پہنچ گئی ہو سلیشیا پھر اسی جگہ نکال پھینکتی ہے۔

(۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آرسنک، کاربودج، چائنا، فاسفورس، لیکسیس اور رٹاکس وغیرہ ادویہ نہایت ضروری ہیں۔

علامات کے مطابق دیں۔

آنکھ میں کچھ بڑ جانا

FOREIGN BODY INTO THE EYES

اسباب :- بعض وقت آنکھ میں کوئی تینکا پڑ جاتا ہے یا کوئی کیڑا داخل ہو جاتا ہے، کبھی ریت، کنکر، کوئلہ بارود یا شیشہ کے ریزے آنکھ میں پڑ جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔

علامات :- آنکھ میں سخت خراش اور کڑکن ہوتی ہے۔ آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، مریض کی آنکھ نہیں کھلتی کیونکہ کھولنے پر ناقابل برداشت کڑکن ہونے لگتی ہے۔ کسی زہریلے جانور کے پڑ جانے سے بعض وقت آنکھ میں زخم سا ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- آنکھ میں کچھ پڑ جانے کی حالت میں آنکھ کو ہرگز نہ ملنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے آنکھ میں خراش اور زخم پیدا ہونے کا احتمال رہتا ہے۔ ایسی حالت میں پہلے منہ بند کر کے ناک سے زور سے پھونکیں اکثر اوقات ایسا کرنے سے تینکا یا کیڑا وغیرہ خود بخود آنکھ کے کنارے آگتا ہے جسے باہر نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس عمل سے فائدہ نہ ہو تو پانی سے آنکھ کو دھوئیں یا پانی میں آنکھ ڈبو کر چند بار کھولیں اور بند کریں۔ آنکھ دھونے کے بعد خالص گلیسرین یا کیسٹر آئل کے دو چار بوند آنکھ میں ڈالنے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے بعض وقت پلک اٹھا کر غیر جنسی چیز کو صاف کپڑے کی پٹی سے بھی نکالا جاسکتا ہے۔

علاج :- (۱) غیر جنسی چیز کو نکالنے کے لیے اکو نائٹ کی چند خوراکیں جلد جلد دینا چاہیے۔

(۲) اگر آنکھ میں سرخی زیادہ ہوگئی ہو مریض کا چہرہ تھما اٹھا ہو۔

تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شدید کڑکن ہونے لگتی ہو تو بیل ڈونا دیں۔

(۳) اگر اکو نائٹ دینے کے بعد آنکھ میں ذکی اسی قائم رہے، ہلکے

سرخ ہو جائے تو سلفر دوا ہے۔

- (۴) میں آنکھ میں غیر جنسی شے پڑ جانے کی حالت میں سلیشیا دیا کرتا ہوں۔
 بعض ڈاکٹروں نے کلکیر یا کارب کی بڑی تعریف لکھی ہے۔
 (۵) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کمیو ملا۔ لائیکو۔ پلسا ٹیلا اور ار جٹھم نائٹ
 وغیرہ کی بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے۔

لُؤ گنا

SUN STRIKE

اسباب :- آفتاب کی گرمی۔ تیز دھوپ یا لُؤ میں باہر نکلنا، شدت
 کی گرمی اور حبس کے وقت پانی کا نہ ملنا، موسم گرما میں جب لو چل رہی ہو،
 باریک کپڑے پہننا اور کثرت محنت جسمانی وغیرہ۔
 علامات :- اس مرض میں شدت کی گرمی کے باعث خون میں
 جوش آجاتا ہے۔ سر عکیراتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔
 آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ شدت پیاس، بے چینی اور گھبراہٹ پانی جاتی
 ہے۔ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ نبض تیز
 چلنے لگتی ہے اور بخار بہت تیز ہو جاتا ہے۔ پیشاب بار بار ہونے لگتا ہے۔
 بعض وقت پیشاب میں البیومن یا خون خارج ہوتا ہے۔ شدت مرض میں
 ہڈیاں اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جو ایک خطرناک علامت ہے۔
 پرہیز و ہدایات :- جب مریض پر لو کا اثر ہو جائے تو اُسے فوراً

سرد اور ہوا دار کمرہ میں لے جائیں۔ گلے کے بند یا بٹن کھول دیں اور بار بار منہ پر سرد پانی کے پھینٹے ماریں اور مریض کے سر، گردن اور ریڑھ پر سرد پانی دھاریں۔ اس عمل سے مریض بہت جلد ہوش میں آجاتا ہے۔ ہوش آجانے پر تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پلا دیں۔ اگر نبض بند ہوتی معلوم ہو یا مریض میں چونکن اور خوف و ہراس طاری ہونے لگے تو ایک ڈرام ریکیٹیفائڈ اسپرٹ اور دو ڈرام پانی ملا کر مریض کو پلا دیں جب مریض صحتیاب ہو جائے تو کئی دن تک غذا میں پرہیز کرائیں۔ غذا ہلکی دیں۔ دودھ، مونگ کی کھچڑی، آتش جو اور سا بودانہ وغیرہ کھانے کے لیے دیتے رہیں۔ ٹھنڈی ترکاریاں دینا بھی مفید ہے۔ گرم غذا اور گرمی و دھوپ سے بچنا چاہیے۔

حفظ ما تقدم:- لو کے زمانے میں گرمی سے محفوظ رہنا چاہیے۔ سیاہ کپڑے پہننا مناسب نہیں۔ علاوہ انہیں گھر سے باہر جاتے وقت سر کو ڈھکا ہوا رکھیں نیز سینہ کو محفوظ رکھیں تاکہ گرم ہوا کا اثر نہ ہو۔ پیاس کی حالت میں ہرگز سفر نہ کرنا چاہیے۔ چلتے وقت پہلے اچھی طرح سے پانی پی لینا چاہیے۔ گرم غذا، گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شراب اور کباب بھی ممنوع ہے۔ ہر روز صبح و شام غسل کرنا اپنے آپ کو ٹوٹے محفوظ رکھنا ہے۔ مفرح اور ٹھنڈے شربت کا پینا بھی نافع ہوتا ہے۔

علاج:- اگر لو لگ گئی ہو، سر میں بے حد تپکن اور شدید درد ہو، چہرہ تسمایا ہوا ہو، آنکھیں سرخ ہوں۔ سر کو پیچھے کی طرف کسی قدر جھکانے سے

درد میں کمی ہوتی ہو۔ ہڈیانی کیفیت ہو تو سیلا ڈونا مفید ہے۔ اگر مریض اپنے آپ کو گرم کپڑے میں لپیٹے رہتا ہو اور گرمی سے مریض کو آرام ہوتا ہو۔ ہوا کے جھونکے سے یا ٹھنڈی اشیاء لگانے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو تو یہ دوا اور بھی بالمثل بن جاتی ہے۔

(۲) اگر لو لگ جانے سے سر میں غضب کا درد ہوتا ہو جس کو پیچھے کی طرف جھکانے سے زیادتی ہو جاتی ہو اور آگے کی طرف جھکانے سے درد سر کو آرام رہتا ہو اور سر اور جسم کو تنگ رکھنے سے سکون ملتا ہو، سر تنگ کرنے سے اور کھلی ہوا میں علامات میں کمی معلوم ہوتی ہو تو گلوٹائٹ دوا ہے۔

(۳) لو لگنا، شدید ہڈیان، نبض تیز اور سخت، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں پر ٹھنڈا پسینہ ہو تو وریٹرم ورائڈ دوا ہے۔

(۴) اگر لو کا اثر اعصاب پر ہو اور عضلاتی کمزوری بھی ہو، درد سر گدی سے اٹھ کر سارے سر میں پھیلتا ہے اور آنکھوں کے اوپر رک جاتا ہو جس کی وجہ سے مریض آنکھیں نہ کھول سکتا ہو، کمزوری اور کپکپی پائی جاتی ہو تو جلیسیم دینا چاہیے۔

(۵) باپو کیماک میں نیٹرم میور لو لگ جانے میں اکسیر کا کام کرتا ہے۔ اگر ہڈیانی کیفیت شروع ہو جائے تو کالی فاس کے ساتھ باری باری دیں۔

(۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ نیٹرم کارب، لیکسیس، کیمفر، اکونائٹ، برائی، ادنیا اور ادیم اس مرض کے لیے قابل الذکر اور نہایت اہم ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

باب سوم

امراض اطفال

دانت نکلنا

DENTITION

دانت نکلنے کا زمانہ بچے کے لیے بڑا اہم ہوا کرتا ہے۔ اس زمانہ میں بچے کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ بچے کے ہاتھ، پاؤں نیز سر جلا کرتا ہے۔ بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ کبھی رنگ رنگ کے دست آتے ہیں۔ کبھی پیش ہونے لگتی ہے۔ بخار کبھی معمولی اور کبھی بہت تیز ہو جاتا ہے۔ بچہ ہر وقت رویا کرتا ہے۔ بعض وقت بچے کو دورے آنے لگتے ہیں یا بچہ بار بار دودھ ڈالتا ہے اور سوتے میں چونکنے لگتا ہے کبھی آشوب چشم کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے پے درپے حملوں کی وجہ سے بچہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور بعض حالات میں بچہ کا جگر بھی خراب ہو جاتا ہے یا سوکھے کی بیماری آدبانی ہے اور اسی طرح کی مختلف پیچیدگیاں شروع ہو جاتی ہیں۔

اس لیے دانت نکلنے کے زمانے میں مناسب علاج اور ہدایات پر عمل کرنا
شد ضروری ہوا کرتا ہے۔

پہلے میسر و ہدایات :- سب سے پہلے مقدم بچہ کی صفائی اور اس کی
مناسب نگہداشت ہے۔ چنانچہ پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر بچہ کو غسل
کرایا کریں۔ اگر نسلانے سے قبل بچہ کے بدن میں کڑوا تیل مل دیا جائے
تو اور بھی مفید ہوا کرتا ہے۔ بچہ کے مسوڑھوں میں دن میں دو تین بار
خالص شہد لگا دینا بہت مفید ہے۔

علاج :- خنازیری مزاج والا بچہ جس کا سر بڑا اور تالو کھلا ہوا ہو
یا جس کا پیٹ دیگر اعضا کے مقابلہ میں بڑھتا جاتا ہو، پتلے دست دودھ
کے مانند سفید یا سنہری مائل ہوتے ہوں جن میں عموماً کھٹی بو آتی ہے، بچہ کو
تشنجی دورے ہوتے ہوں یا آشوب چشم کی شکایت ہوگئی ہو (جسے آشوب چشم
خنازیری بھی کہہ سکتے ہیں) اور دانت مشکل سے نکل رہے ہوں تو
کھکیر یا کارب دوا ہے۔ اگر بچہ کے پاؤں پر پسینہ اس کثرت سے نکلتا ہو
گو یا ترموزے پن رکھے ہیں، تو کھکیر یا کارب اور بھی یقینی دوا بن جاتی
ہے۔ علاوہ ازیں اگر دانت نکلنے کے زمانے میں سوکھا کا مرض بھی
شروع ہو جائے تو بھی یہی دوا بچہ کی دھکیری کرتی ہے۔

(۲) اگر بچہ حد سے زائد چڑچڑا ہوا اور بات بات میں ضد کرتا ہو اور
روتا چلاتا ہو، ہر وقت گود میں رہنا چاہتا ہو۔ بخار یا تشنجی دورے پائے
جاتے ہوں، ہاضمہ خراب ہو، رات کو نیند نہ آتی ہو یا سوتے میں بچہ چونکتا ہو

تو کیمو ملا دینا چاہیے۔ اگر پاخانہ میں سڑے ہوئے انڈے کی سی بو آتی ہو تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔ کیمو ملا کے نیل ہو جانے پر بیلا ڈونا دیں۔
(۳) اگر بچہ معمولی شور سے چونک پڑتا ہو، منہ میں چھالے پائے جائیں، بچہ نیند میں چیخ کر ماں کو پکڑ لیتا ہو، پاخانہ لیبی کا سا اور متعفن ہو تو بورکس دوا ہے۔

(۴) بچہ نہایت غصہ ور اور ضدی ہو، پاخانہ قبض کے ساتھ ہوتا ہو یا پاخانہ میں آؤں آتی ہو معدہ خراب ہو، بدبودار ریاخ خارج ہوتے ہوں، رات کو نتھنے بند ہو جاتے ہوں تو نکس و امیکا دینا چاہیے۔

(۵) اگر بچہ ہر وقت کراہا کرتا ہو اور جانے پر بھوچکا سا ہو جاتا ہو گویا کسی چیز سے ڈر گیا ہے، پھرہ تمٹمایا ہوا اور آنکھیں سرخ ہوں، مسوڑھے متورم ہوں، بچہ کو تشنگی دورے آتے ہوں تو بیلا ڈونا بہت مفید ہے، اس کے فیل ہو جانے پر کلکیر یا دیں۔

(۶) اگر دانت مشکل سے نکلتے ہوں۔ بچہ کو دست آتے ہوں جن میں کھٹی بو پائی جائے، یہاں تک کہ بچہ کو نہلانے کے بعد بھی تمام جسم سے کھٹی بو آتی رہے۔ سر میں، بالوں میں متواتر سپینہ آتا ہو تو ریویم دوا ہے۔
(۷) بائیو کیمک میں کلکیر یا فاس $\times 6$ دانت نکلتے کی تمام کلیفات میں اکیر ہے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ اکوناٹ۔ ٹرینٹھنا۔ آرمنک۔ برائی ادنیا۔ پاڈو فائلم۔ سنا۔ زنگم۔ سلیشیا۔ گریا زوڈ اور سلفر کا شمار

خاص دواؤں میں ہے۔

اشارات

- ۱۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں بخار، اکونائٹ، سیلا ڈونا، کیمو ملا، حملسمیم۔
- ب۔ دست اور دیگر معدہ کی خرابیاں۔ کیمو ملا۔ نیز ایک آدھ خوراک سلفر۔ پھر بھی فائدہ نہ ہو تو کلکیر یا کارب۔ دست، کمزوری، غشی، دودھ پینے کے تھوڑی سی دیر بعد زرد دہی بن کر قے ہو جائے۔ ایتھوزا۔ (بچہ دودھ نہ پیے۔ سبز پتلے دست۔ کلکیر یا فاس)۔ (سبز جھاگ دار دست جو لسدار ہوں۔ اپیکاک)۔ زیادہ مقدار میں دھار باندھ کر دست ہوں جو بغیر درد کے ہوتے ہوں۔ پاڈو فائلم۔
- ج۔ تشنچ اور اعصابی خرابی۔ کیمو ملا۔ (کیمو ملا فیل ہونے پر سیلا ڈونا) ان دونوں ادویہ کے فیل ہوجانے پر آئینیشیا۔ کافیا۔ ایتھوزا۔ کیو پرم۔ اور کریازوٹ میں سے کوئی دوا۔ (تمام ادویہ ناکام رہیں تو کلکیر یا کارب)۔

منہ آنا

SORE MOUTH (APHTHAE)

اسباب :- دانت کا نکلنا، بد ہضمی، بخار، ماں کے دودھ کے بجائے

بازاری دودھ کا استعمال، گندگی و کثافت اور معدہ کی حدت وغیرہ بعض
 وقت ماں کے سرپتان کی گندگی کے باعث بچہ کا منہ آجایا کرتا ہے۔
 علامات :- بچہ کی زبان اور منہ میں خاکستری یا سفید رنگ کے
 دانے یا چھالے نمودار ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ چھالے حلق کے اندر ہو کر
 سینہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ دانوں میں سخت جلن اور دکھن ہوتی ہے۔
 رال زیادہ ہستی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ خفیف بخار آ جاتا ہے۔
 بچہ کو دودھ پینے میں تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ بے چین نظر آتا ہے۔
 بعض حالات میں بچہ کو دست آنے لگتے ہیں یا بچہ بار بار دودھ ڈالنے لگتا ہے۔
 برہنہ رو ہدایات :- اس مرض میں صفائی کی بڑی ضرورت ہے
 اگر ناقص دودھ کے باعث یہ شکایت ہو تو اس کا تدارک کریں۔ منہ کو
 صاف رکھیں اور خالص شہد یا گلیسرین اور بورکس ملا کر منہ کے اندر
 لگا دیں اور یہ عمل دن میں تین بار کریں۔ نیز بھیڑ کا دودھ منہ کے اندر لگانا
 خصوصیت سے نافع ہے۔ اگر بدہمی کے باعث منہ آیا ہو تو بچہ کو بار بار
 دودھ نہ پلائیں بلکہ مقررہ وقت پر دودھ دیں۔ اکثر ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ
 بچہ کے ذرا سے رو دینے پر وہ فوراً اس کے منہ میں دودھ دے دیا کرتی
 ہیں اور بچہ کے رونے کا اصل سبب نہیں معلوم کرتی ہیں یہ سخت غلطی ہے۔
 بچہ کے رونے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوا کرتا کہ وہ بھوکا ہی ہے۔ ماں کو
 یہ بھی لازم ہے کہ سرپتان کو ہمیشہ صاف رکھے۔

علاج :- سب سے عمدہ دوا منہ آنے کی مرک سال ہے جو

اکثر و بیشتر حالات میں مناسب ہوتی ہے۔ خاکستری رنگ کے دانے زبان اور منہ میں۔ رال کا کثرت سے بہنا اور بخار وغیرہ کی علامات اس دوا کے حلقہ اثر میں آتی ہیں۔ اگر مرک سال ناکام رہے تو سلفر کی ایک خوراک سے عمدہ یا بقیہ شکایات دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ سلفر سے بھی کچھ مقصد حاصل نہ ہوا تو کلگیریا کا رب نمبر ۲۰۰ دیں۔

(۲) جب تمام ادویہ ناکام رہیں اور مرض بری شکل اختیار کر لے، رال کثرت بہتی ہو، بچہ کا دودھ پینا محال ہو جائے اور کیس بہت خراب ہو گیا ہو تو نائٹرک ایسڈ دینا چاہیے۔ جن بچوں کے والدین میں آتشک کا اثر پایا جائے یا جنہوں نے پارہ کا بے تحاشا استعمال کیا ہو ایسے بچوں کے منہ آجانے کے لیے نائٹرک ایسڈ بہت عمدہ دوا ہے۔

(۳) اگر منہ میں زخم پڑ گئے ہوں جن میں غضب کی حلن ہوتی ہو، بچہ میں کمزوری زائد ہو، بچہ بے چین رہتا ہو اور بار بار پانی پینے کی خواہش کرتا ہو تو آرٹک دیں۔ یہ دوا عموماً اس وقت کام آتی ہے جب مرض بہت بڑھ چکا ہو اور اوپر لکھی ہوئی تمام دوائیں فیل ہو چکی ہوں۔

(۴) زبان اور منہ میں دانے جن میں سے آسانی سے خون بہے مان کو بچہ کا منہ پستان پر گرم معلوم ہو اور دودھ پیتے وقت تکلیف کے باعث بچہ پیچھے تو بورکس دوا ہے۔

(۵) بایوبیکم میں کالی میو منہ آنے کی مجرب دوا ہے۔

(۶) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ فانی ٹولا کا، نیٹرم میور،

پیشیا، یا ڈراسٹس اور کالی کلور وغیرہ میں سے کوئی بھی دوا حسب علامت دیں۔

دودھ ڈالنا

VOMITING INFANTUM

اسباب :- معدہ میں خراش، بد ہضمی، دانت نکلنا، کثافت و گندگی، منہ آنا، خراب و ناقص دودھ یا نامناسب غذا، کثرت صفرا، حلق کے غدروں کا ستورم ہو جانا، کوئلک جانا یا سینہ پر بلغم کا اجتماع وغیرہ۔

علامات :- بچہ کو ابکائیاں آتی ہیں، بچہ بار بار دودھ ڈال دیتا ہے، دودھ میں کبھی بلغم ہوتا ہے، کبھی صفرا اور کبھی منجمد دودھ کے ٹکڑے بعض حالات میں اس کثرت سے ابکائی اور قے آتی ہیں کہ بچہ کو ایک منٹ بھی چین نہیں ملتا۔ اسی حالت میں زیادہ کمزوری لاحق ہو جایا کرتی ہے اور بچہ نقاہت کے باعث اپنی گردن ڈال دیتا ہے۔ کبھی اس شکایت کے ساتھ ساتھ پلخا نہ کی بھی علامات رونما ہو جاتی ہیں۔ جب سینہ پر بلغم کے اجتماع کے باعث ثلی اور قے ہوتی ہے تو عموماً دو چار قے ہونے کے بعد خود بخود آرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صفراوی قے میں بھی بعض حالات میں چند بار قے ہونے کے بعد خود بخود سکون ہو جاتا ہے لیکن جب خرابی معدہ یا کسی دوسرے سبب سے یہ شکایت ہوتی ہے تو برابر قے آیا کرتی ہیں۔

پر ہمیں روہدایات :- بچہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں ۔ اصل سبب مرض کو معلوم کریں ۔ اگر بچہ کا منہ آیا ہو تو اس کا تدارک ہے خراب یا ناقص غذا اس کا باعث ہو تو اس کی اصلاح کریں ۔ بدہمی اور خرابی معدہ اس کا باعث ہو تو سب سے پہلے غذا بالکل بند کر دیں اور پھر علاج کی طرف متوجہ ہوں اگر معدہ میں خراش کے باعث بار بار قے آ رہی ہوں اور ایک منٹ بھی بچہ کو چین نہ ملتا ہو تو بچے کو برف کے ٹکڑے جو سنے کو دیں اور گڈی پر برف کے ٹکڑے ملیں ۔ چند بار ایسا کرنے سے حیرت انگیز فائدہ معلوم ہونے لگتا ہے ۔

علاج :- (۱) بچہ کو مسلسل آبگائیاں آئیں اور قے میں ہرے ہرے پت گریں اور سبز دست آویں تو اپیکاک ہر دو گھنٹہ کے بعد دینا بہت مفید ہے ۔ متلی اور قے کے لیے یہ بہت عمدہ دوا ہے ۔

(۲) اگر بچہ کا معدہ خراب ہو، پیٹ میں اچھا رہو، قے کے بعد پھر متلی معلوم تو پلسا ٹیلا x ۳ دو دو گھنٹہ بعد دیں ۔ یہ دوا اُس وقت بھی کام آتی ہے جب اپیکاک فیل ہو چکا ہو ۔

(۳) دودھ پینے سے قے ہو جاتی ہو، پیٹ میں درد اور اچھا رہو ۔ قبض ہو یا تھوڑا تھوڑا پاخانہ ہوتا ہو ۔ بچہ چڑچڑا ہو تو نکس و امیکا دیں ۔

(۴) بچے جوں ہی دودھ پیں کھٹا دہی بنا کرتے کر دیں تو کلیر یا کارب دوا ہے ۔ اگر سفید رنگ کے دست بھی آتے ہوں تو یہ دوا اور بھی بالمشل ہو جاتی ہے ۔

(۵) بچے دودھ پینے کے تھوڑی ہی دیر بعد زرد یا نیلا دہی بنا کر قے کر دیں۔ دودھ کسی حال میں مضم نہ ہوتا ہو۔ قے ہونے کے بعد کمزوری، غنودگی چھا جائے، جاگنے پر بچہ پھر دودھ مانگے جس کے بعد پھر اس کی ویسی ہی حالت ہو جائے تو ایتھونا دوا ہے۔

(۶) اگر مندرجہ صدر ایتھوزا کی علامات معلوم ہوں مگر بچہ دودھ نہ مانگتا ہو بلکہ اگر دودھ دکھایا بھی جائے یا چھاتی منہ سے لگائی جائے تو بچہ منہ پھیر لیتا ہو تو انٹم کروڈم دینا چاہیے۔

(۷) اگر دوا کے انتخاب میں دیر لگتی ہو یا صحیح علامات نہ ملتی ہوں اور بچہ کو جلد از جلد سکون کی ضرورت ہو تو ایسڈ ہائڈروکسائیڈ کا ایک قطرہ ہر بیس منٹ کے بعد دیں اور تین یا چار خوراک کے بعد روک دیں۔ عموماً دو خوراکیں کافی ہوا کرتی ہیں۔

(۸) باپو کیمک میں اگر بچہ کھٹی رطوبت کی قے کرتا ہو یا غیر مضم غذا خارج ہوتی ہو تو فیرم فاس ۶x دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ بسمتہ، فاسفورس، انٹم ٹارٹ، آرسنک، کیو پرم، ٹوبیکیم اور ادپیم بھی مفید ہیں۔ علامات کے مطابق دیں۔

آنکھیں دکھنا

OPHTHALMIA

(دیکھو آشوب چشم حصہ اول باب سوم میں)

اُمُّ الصُّبَّيَّانِ کے دورے

INFANTILE CONVULSIONS

اسباب :- بد سہمی، نفع شکم، پیٹ میں کیرے، دانت نکلنا،
 پٹیوں کی کمزوری، گنگنی و نجاست، عام کمزوری، موزوثی آتشک
 دماخی فالج، پیدائشی جنون، مرگی، بعض شدید امراض (چیچک،
 خسرہ، بخار، مائونیا اور شدید کھانسی وغیرہ) خوف و ہراس یا غم و غصہ،
 امراض قلب اور مادہ سِل وغیرہ وغیرہ۔

علامات :- یہ بیماری عموماً بچہ پیدا ہونے کے ایک ہفتہ سے
 لے کر دو تین سال کی عمر تک زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس سے زائد عمر والے
 بچوں میں یہ بیماری کم ہوا کرتی ہے۔ چھ ماہ کی عمر تک دورے زیادہ
 تشویشناک ہوا کرتے ہیں خصوصاً اگر بچہ کمزور ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے
 ایک ہفتہ تک دردوں کی حالت اور بھی خطرناک اور ہلک ہوا کرتی
 ہے۔ خصوصاً جن بچوں کے والدین میں آتشک کا اثر ہو۔ معمولی

حالات میں دورے چھ سات ماہ یا اس سے اوپر کی عمر میں زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ خفیف حالات میں بچے کے عضلات پھڑکنے لگتے ہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو گھوم جاتے ہیں، سانس مشکل سے آتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت خود بخود رفع ہو جاتی ہے لیکن شدید حالات میں بچہ چیخ مارتا ہے اور پکایک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو کھینچ جاتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اینٹھ جاتی ہیں تمام جسم میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ دانت میٹھ جاتے ہیں۔ نبض تیز اور باریک چلنے لگتی ہے۔ کبھی پاخانہ پیشاب نکل جاتا ہے۔ یہ کیفیت چند منٹ رہ کر دورہ ختم ہو جاتا ہے اور بچہ خوف زدہ ہو کر روتا روتا سو جاتا ہے۔

نوٹ :- یہ مرض جس قدر کم عمر میں ہو اسی قدر خطرناک ہوا کرتا ہے۔
 پرہیز و ہدایات :- اصل سبب مرض کو معلوم کریں کیونکہ اس مرض کے بے شمار اسباب ہیں۔ اسباب اور علامات کے مطابق مناسب پرہیز اور علاج سے کام لیں جسے دیکھو اپنے موقع پر۔ بچہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، بوقت دورہ گلے کے بند یا بٹن کھول دیں اور بچے کے سر کو ادبجا رکھیں۔ اس کے ہاتھ اور انگلی وغیرہ کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔
 نوبت ختم ہونے پر عضلات میں خود بخود نرمی آ جاتی ہے اور وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں لانے کے لیے بچے کے منہ پر آب سرد کے چھینٹے ماریں۔ قبض کسی حال میں نہ رہنے دیں۔ پاخانہ صابن کی بٹی یا گلیسرین سیازیٹری سے کرا دیں۔

علاج :- (۱) بچہ سوتے میں اچانک چونک پڑے آنکھیں سرخ ہو جائیں۔ پتلیاں پھیل جائیں۔ اعضاء اکڑ جائیں۔ چہرہ تھماتے لگے اور منہ سے پھین جاری ہو جائے تو بیلادونا مفید ہے۔ اکثر و بیشتر علامات میں بیلادونا کام آتا ہے۔

(۲) اگر بیلادونا فیل ہو جائے اور دورہ کے بعد ذکی الحسی بہت زیادہ پائی جائے، مریض شور و غل قطعی برداشت نہ کر سکتا ہو اور نہ ہی خود کو چھونے دیتا ہو تو گنیٹشیا فاس دینا چاہیے۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں گنیٹشیا فاس کا استعمال اور بھی مفید ہوا کرتا ہے۔

(۳) خنازیری مزاج کے بچے جن کے دانت مشکل سے یا قبل از وقت نہایت تیزی سے نکل رہے ہوں تو کلکیر یا کارب دوا ہے۔

(۴) اگر بچہ چڑچڑاہو، غصہ یا جوش سے دورہ آجاتا ہو یا بچے کے دانت نکل رہے ہوں۔ بچہ چاہے کہ ہر وقت گود میں لے کر گھمایا جائے، بوقت دورہ بچہ پیچھے کواکڑ جائے، اعضاء میں جھٹکے ہوں۔ چہرہ، آنکھ، زبان اور ہونٹ میں پھر کن پائی جائے۔ بچہ چہرہ کو ادھر ادھر گھمائے تو کمیولا دینا چاہیے۔

(۵) اگر پیٹ میں کیڑے ہوں، بچہ ناک میں اکثر انگلی ڈالا کرتا ہو۔ دورہ کے وقت کل جسم اکڑ جائے تو سنا مفید ہے۔

(۶) اگر دورہ کے قبل بچہ یک دم چیخ مارے معلوم ہو کہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ یا بخار کی حالت میں یہ کیفیت ہو جائے، اعضاء ہلنے لگیں

اور بول و براز خطا ہو جائے تو سٹرا مونیم دوا ہے۔ اگر سوتے میں بچہ کی انگلیاں چلیں گویا وہ کچھ تلاش کر رہی ہیں تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔
(۷) پیکا یک ڈر کر بچہ میں تشنجی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تمام جسم میں یا چہرہ کے عضلات میں خصوصاً آنکھوں میں پھڑکن پائی جائے، دانت بٹھ جائیں اور منہ سے پھین نکلنے لگے۔ دورہ ختم ہونے کے بعد بچہ گہری نیند سو جائے تو ہیوسمس مفید ہے۔

(۸) بایو کیمیک میں مگنیشیا فاس $6 \times$ دیں۔ دانت نکلنے کے زیادہ میں کلکیر یا فاس اور مگنیشیا فاس باری باری سے دیں ڈریا اعصابیت کی وجہ سے دوروں کے لیے کالی فاس اور مگنیشیا فاس یکے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آگنیشیا، کیو پریم، اوپیم، ہیلی اوس سائیکوٹا اور کافیا وغیرہ بہت مفید ہیں ان ادویہ کے بعد زکیم، اورم میور، برائی اونیاء، آرنیکا، اپیکاک اور نکس و امیکا کی طرف توجہ کریں۔

اشارات

- ۱۔ دورے چوٹ سے :- آرنیکا۔ برائی اونیاء۔ ہیسپر۔
- غذا کی بے اعتدالی سے :- اپیکاک۔ پلسا ٹیلا۔ نکس و امیکا۔
- خوف سے :- اکوناٹ۔ ہیوسمس۔ آگنیشیا۔ اوپیم۔ وریٹرم۔
- کیٹروں سے :- بیلادونا۔ سنا۔ ہیوسمس۔ سٹرا مونیم۔

ابھاروں کے دب جانے سے :- انٹیم ٹارٹ - آئرلینڈ - کیو پرم -
 اپیکاک - سٹرا مونیم - سلفر - زنکم -
 دانت نکلنے کے زمانہ میں :- ایشیوٹا - کلکیریا - کیموٹلا - سائیکوٹا -
 کانیا - کیو پرم - کالی بروم - کریازوٹ - مگنیشیا فاس - شام
 اور زنکم -

پیٹ کے کیڑے

INTESTINAL WORMS

آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں جن میں تین قسم کے
 کیڑے خاص اہمیت رکھتے ہیں (۱) کدو دانہ (TAPE WORM) جو
 شکل میں تخم کدو کے مانند ہوتا ہے، جو باہم مل کر کے ایک لڑی کی شکل اختیار
 کر لیتا ہے اس قسم کے پرے کرم کی لمبائی ایک گز سے لے کر تیس چالیس
 گز تک دیکھی گئی ہے لیکن عموماً اس کی لمبائی پانچ سے بیس گز تک ہوتی ہے۔
 یہ کیڑا عموماً چھوٹی آنتوں میں رہتا ہے۔ اس کرم کا ہر ایک ٹکڑا جو پاخانہ کے
 ہمراہ خارج ہوتا ہے بذات خود ایک کامل کرم ہوتا ہے۔

(۲) گچوے (ROUND WORM) اس کی لمبائی ۵ انچ سے لے کر
 ایک فٹ تک ہوتی ہے کبھی اس سے بھی زیادہ لمبے کیڑے دیکھے نہیں آتے
 ہیں۔ اس کے منہ کے اندر چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں یہ کرم بھی

چھوٹی آنتوں میں رہتے ہیں لیکن بعض وقت آنتوں سے معدہ، جگر، ہفتہ یا پیشاب کی نالی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تعداد میں اکثر دو تین ہوا کرتے ہیں لیکن کبھی سیکڑوں کی تعداد میں بھی دیکھے گئے ہیں۔

(۳) چرنے، سوتی کیڑے (THREAD WORM) اس کیڑے کی لمبائی $\frac{1}{16}$ انچ سے لے کر $\frac{1}{4}$ انچ تک ہوتی ہے جس کے سر میں تین لبوں والا منہ ہوتا ہے۔ یہ کیڑے دونوں سروں پر کاؤ دم ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے اندھی آنت میں رہا کرتے ہیں لیکن کبھی دیگر آنتوں میں یا معدہ و معدہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ ان کی تعداد ہزاروں تک ہوتی ہے۔

نوٹ:۔ ہر قسم کے کیڑے براز کے ساتھ خارج ہو کر انڈے دیتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ساگ پات یا خراب پانی کے ساتھ پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔

اسباب:۔ ناقص غذا کا کھانا، خراب پانی پینا، سوندھی یا بھئی اشیاء کا کثرت استعمال، ناقص پھلوں کو دیر دھوٹ ہوٹے کھانا، وغیرہ۔
وراجل گندے پانی یا سنترے کاریوں یا میوہ جاستہ پر کیڑوں کے انڈے کم و بیش موجود ہوتے ہیں جو خوردبین سے ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ جب اس قسم کی ناقص، گندی یا سڑی ہوئی اشیاء شکم میں جاتی ہیں تو ان کے ہمراہ کیڑے بھی پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں وہ پیٹتے ہیں اور کیڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

علامات:۔ پیٹ میں اکثر درد ہوتا رہتا ہے، سچے اپنی ناک نہ چتا رہتا ہے، منہ سے رال بہتی ہے اور بد بو آیا کرتی ہے۔ غذا جزو بدن

نہیں ہوتی، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، بچہ خواب میں دانت پیستتا ہے۔ یا بار بار چونکتا ہے۔ سونے میں تکیہ رکھنے سے ترتر ہو جاتا ہے۔ اجابت بے قاعدہ ہوتی ہے۔ مقعد کے مقام پر خارش ہوتی ہے۔ نازک مزاج بچوں میں بعض وقت تشنج، عیشہ یا مرگی کے دورے آنے لگتے ہیں۔

پرہیز و ہدایات :- بچے کو صاف ستھرا رکھیں، پانی اور دودھ وغیرہ نہایت پاکیزہ اور صاف دیں۔ میٹھی اور سوندھی اشیاء سے بچے کو پرہیز کرائیں۔ پھل اور ترکاریاں بغیر دھوئی ہوئی سرگزدا استعمال کریں۔ البتہ نمک کا زیادہ کھانا مفید ہوا کرتا ہے۔

علاج :- (۱) کدو دانہ خارج کرنے کے لیے کیوکر بیٹیا مدر شکچر ۵ قطرہ فی خوراک دن میں تین بار دیں۔ کئی دن مسلسل استعمال کے بعد اگر خاص نفع نہ معلوم ہو تو کیوکر پریم آکسائیڈ ٹیم ہائڈریم $1 \times$ دیں۔

(۲) اگر کدو دانوں کے ساتھ ساتھ قبض کی شکایت ہو، پیٹ میں درد رہتا ہو، چہرہ پر پیلاہٹ اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے یا لے جائیں تو فلکس فاس مدر شکچر یا ۳۰ استعمال کرائیں۔ مدر شکچر کے علاوہ اس کا تیل بھی استعمال کرایا جاتا ہے جس کی مقدار خوراک $\frac{1}{2}$ ڈرام سے $\frac{1}{4}$ ڈرام تک اور بڑوں کو ایک ڈرام تک ہے۔

(۳) کدو دانہ کے اخراج کے لیے گرنیٹم 30 بھی خاص دواؤں میں سے ہے۔ آنکھوں کے گرد پیلے یا نیلے حلقے، ناک اور مقعد پر خارش اور سرسراہٹ سی معلوم ہونا۔ ناف کے گرد درد کا ہونا اس دوا کے حلقہ اثر

میں آتے ہے۔ اس کا مریض کھٹی یا تر چیزوں کا بڑا شائق ہوتا ہے۔

(۴) اگر دستوں میں کیڑے خارج ہوتے ہوں، مقعد میں تکلیف دہ خارش ہوتی ہو، مریض کھانے کے باوجود ڈبلا اور کمزور ہوتا جائے، سانس میں بدبو ہو۔ رال کی کثرت سے تکیہ تر ہوتا جاتا ہو تو مرک سال دیں۔
(۵) ناک میں ہر وقت کھجلی یا سرسراہٹ ہو جس کی وجہ سے ناک گریڈنے کی خواہش ہو، بھوک زیادہ ہو، میٹھی اشیاء کا شائق ہو و ناف کے گرد درد معلوم ہوتا رہتا ہو۔ پیشاب سفید ہو جو رکھنے پر دودھ کی مانند ہو جاتا ہو مقعد کے مقام پر خارش ہو، سونے کی حالت میں دانت پیستا ہو تو سنا پھوٹی طاقت میں بہت مفید ہے۔ اگر سٹائیل ہو جائے تو سنٹو فائن دیں۔

(۶) سوتی کیڑوں کے اخراج کے لیے سنٹو فائن $1 \times$ بہترین دوا ہے دن میں دو بار صرف تین دن تک دیں۔ اس دوا کی علامات سنا سے بہت کچھ ملتی جلتی ہیں۔ ناک میں خارش کا ہونا، سونے میں دانتوں کا پیسنا۔ رات میں کھانسی کا پیدا ہونا، اور نیند میں بے چینی کی حالت وغیرہ اس دوا کی خاص علامات ہیں۔ سنٹو فائن فیل ہونے پر آئیوڈیم مدرٹکچر ایک حصہ اور پانی تین حصہ ملا کر چار چار قطرے ہر ۳ گھنٹہ کے بعد دیں۔

(۷) کیچوے کے اخراج کے لیے چینو پوڈیم اکسیر ہے $3 \times$ دینا چاہیے۔ روغن چینو پوڈیم بھی بقدر ۵ سے ۱۵ بوند ہر تین گھنٹہ کے بعد استعمال کرنا بہت مفید ہے۔

(۸) بائیو کیمک میں نیشترم فاس ہر قسم کے کیڑوں کے لیے مجرب دوا ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ کلکیریا، سلفر، سپائی، جیلیا، سٹانم، میو کریم، پلساٹیل اور انڈیگو اس مرض کے لیے بہت مشہور ہیں حسب علامت دینا چاہیے۔

پسلی چلنا۔ ذات الجنب

PLEURISY

اسباب :- زکام کا ہونا۔ سردی لگنا۔ بھیگ جانا۔ سینہ پر چوٹ لگنا۔ یا مادہ سل کا پھیپھڑوں کے غلاف میں سرایت کر جانا وغیرہ اس کے خاص اسباب ہیں۔ کبھی انفلوئنزہ، عفونی بخار اور بعض قسم کے بخاروں کے دوران میں بھی خون کے زہریلے ہو جانے سے پسلی میں درد ہونے لگتا ہے۔ علامت :- اس بیماری میں پھیپھڑوں کے غلاف (پلیوریا) میں درم آجاتا ہے۔ یہ مرض عموماً ایک ہی جانب ہوتا ہے لیکن بعض وقت دونوں جانب ہوتا ہے۔ مریض کو بخار اور کھن زیادہ ہوتی ہے۔ سانس لینے میں پسلی کے نیچے گڑھا پڑ جاتا ہے۔ سانس لینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ سینہ منغم سے جکڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے۔ نبض تیز اور سخت چلتی ہے۔ سانس دیتے وقت اس شدت کا درد ہوتا ہے گویا کوئی بر جھی پھور رہا ہے۔ بخار ۱۰۳ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ (بعض حالات میں ۱۰۵ درجہ تک جاتا ہے) کمزور

بچوں میں جب دونوں طرف درد ہوتا ہو تو نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو رونی کے کپڑے پہنا دیں جسم گرم رہے
ٹھنڈی ہوا سے مریض کو محفوظ رکھیں۔ پیٹھ و سینہ کو بخوبی سینک کر کے یا
گرم تیل مل کر ایک رونی کا پهل کھ کر باندھ دیں اور حرکت کرنے سے یا
زیادہ بولنے سے مریض کو باز رکھیں۔ غذا نہایت لطیف دیں۔ دودھ،
مونگ کی دال کا پانی، سا بودانہ یا شوربا وغیرہ سیال اشیاء مریض کو دی جاسکتی
ہیں، شدت پیاس کی حالت میں پانی تھوڑا تھوڑا چوس کر پینا چاہیے۔
زیادہ پانی پینا مضر ہے۔ بخار رفع ہو جانے کے بعد خشک اور بے نمک غذا
زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

علاج :- (۱) ابتدائی حالت میں جب کہ بخار ہو، بے چینی زیادہ ہو
سانس تیز چلتی ہو تو اکونائٹ بہت عمدہ کام کرتا ہے 4×3 یا 3×3 یا 3×3 چکر کی
شکل میں دینا زیادہ مناسب ہے۔ مدر ٹنکچر کی حالت میں دو دو بوند فی خوراک
ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

(۲) اگر اکونائٹ فیل ہو جائے اور بلغم خشک یا لسدار گاڑھا (جو مقدار
میں بہت کم نکلے)۔ پیاس زیادہ ہو اور قبض پایا جائے تو برائی اونیا دینا چاہیے۔
اس کے ٹنکچر کو سرسوں کے تیل میں ملا کر خارجی طور پر بھی لگائیں۔

(۳) اگر برائی اونیا دینے کے بعد بھی سونپوں کی سی چھن قائم رہے۔
تو کالی کارب اور کالی نائٹ دیں۔

(۴) شدید قسم کے نزلے کی وجہ سے پسلی چلتی ہو، سانس سینہ میں

نہ سہائے۔ سینہ میں بلغم خرخر بولتا ہو لیکن باہر نہ نکلتا ہو یا سیٹی کی سی آواز نکلتی ہو تو انٹم مارٹ مفید ہے۔ اگر انٹم مارٹ فیل ہو جائے تو سلفر کی ایک خوراک دے کر انتظار کریں۔

(۵) دُبے پتلے بچے جو کمزور زیادہ ہوں، سانس لینے میں تکلیف ہو، بچہ کو پسینہ زیادہ آتا ہو، سانس لینے میں خرخر اہٹ ہو۔ درد کی وجہ سے بچہ بولنا نہ چاہے۔ بائیں کرڈ لیٹنے سے تکلیف بڑھ جائے۔ پیپھڑے بھی ماؤٹ ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہوں تو فاسفورس دوا ہے۔

(۶) مادہ سل کا زہر سہرایت کر جانے کے باعث اگر ذات الجنب کی شکایت ہو تو آرسنک آئیوڈائڈ یا ہیسپر سلفر دیں۔

(۷) مزمن پلوریسی میں ہیسپر، آئیوڈیم، سلفر، یا کلیریا کارب میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔

(۸) ذات الجنب کے آخری درجہ میں جب نبض متغیر ہونے لگے، چہرہ کا رنگ نیلگوں ہو جائے اور مریض پنکھا کرنے کی خواہش کرے تو کاربودج دیں۔

(۹) بایوکیک میں فیرم فاس اور کالی میور باری باری سے دیں

نہایت مفید ہے۔

(۱۰) نہ رجبہ صدر ادویہ کے علاوہ لیکسیس کینتھرس۔ ایپس۔ بیلاڈونا۔ آرنیکا۔ سمی سی فوگا۔ کیو پریم اور نکس وامایکا وغیرہ کا شمار اہم ترین ادویہ میں سے ہے۔ حسب موقع دیں۔

سوکھا۔ (بچوں کی وق)

MARASMUS

اسباب :- موروثی وق، خنازی مادہ، مرض آشک، خراب اور ناقص غذا، کمی خون، عام کمزوری، آلات ہضم کی خرابی، کثافت و کندگی، خراب بود و باش، حفظان صحت کے اصولوں کی پیروی نہ کرنا، پیٹ میں کیڑوں کا ہونا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ مرض چھوت سے بھی ہو جاتا ہے یعنی بیمار کی چھوت سے تندرست بچہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

علامات :- اس مرض میں بچہ سوکھتا جاتا ہے۔ گردن پتلی پڑ جاتی ہے۔ تمام جسم کے مقابلہ میں سر بڑا ہوتا ہے۔ پیٹ نکل آتا ہے۔ بچے کی تھیلی کو اگر نل کر سونگھیں تو ایک قسم کی بدبو آتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ رنگ برنگ کے متعفن دست آنے لگتے ہیں۔ ٹانگیں بالکل سوکھ جاتی ہیں۔ سونے کی حالت میں سر اور چہرہ پر پسینہ آتا ہے۔ کمزوری بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ بعض وقت ضعف و نقاہت کے باعث بچہ کے رونے کی آواز بھی مشکل سنائی دیتی ہے۔ اگر ابتدا ہی سے اس کا باقاعدہ علاج اور پرہیز نہ کیا گیا تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- سب سے مقدم چیز بچہ کی صفائی ہے۔ بچے کے جسم پر ہر روز مچھلی کا تیل یا روغن زیتون ملنا چاہیے۔ اور

روزانہ صبح و شام کپڑے بدلنا چاہیے۔ سرد ہوا سے بچنے کو بچانا چاہیے۔
 رہنے کا کمرہ نہایت صاف، کھلا ہوا اور روشن ہو۔ غذا کی احتیاط بھی نہایت
 ضروری ہے۔ بچے کے ہاضمہ کو درستی پر لائیں۔ چونکہ اوپر کا دودھ پینے والے
 بچے عموماً اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وٹامن اے ان کو کافی مقدار
 میں نہیں ملتا ہے اور بچوں میں کیلشیم کمی ہوتی ہے۔ اس لیے بچہ کو اگر
 گدھی کا دودھ دیا جائے تو تمام دودھوں سے (ما سوائے ماں کے دودھ
 کے) بہتر ہے۔ اس دودھ میں کم و بیش وہ تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں
 جو ماں کے دودھ میں ہیں۔ اگر گدھی کا دودھ نہ مل سکے تو بکری کا دودھ
 بحالت مجبوری غنیمت ہے۔ دودھ میں ہم وزن پانی ملا نا ضروری ہے۔
 گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے اچھا ہوتا ہے جو بکری کا نہ ملنے کی
 صورت میں پانی ملا کر دیا جاسکتا ہے۔ تازہ دودھ ہر حال میں بہتر ہوا کرتا
 ہے۔ اگر دودھ باقاعدہ ہاضم نہ ہوتا ہو تو دودھ میں ایک چمچ چرنے کا پانی
 ملا لینا چاہیے۔ علاوہ ازیں بچہ کے منہ میں ہر وقت دودھ نہ لگائے رکھنا
 چاہیے۔ معدہ کو آرام کے لیے تھوڑا وقت ضرور دینا چاہیے۔ اگر بچے کو
 وٹامن اے کی اور زیادہ ضرورت ہو تو عمر کے لحاظ سے جس قدر کہ بچے
 برداشت کر سکیں زردی بیضہ، بالائی، مکھن کا ڈکور آئیل، میووں کا رس
 وغیرہ دیں۔

علاج :- (۱) اگر بھوک بہت لگتی ہو اور باوجود زیادہ کھانے کے
 بچہ کا جسم سوکھتا جاتا ہو۔ پیٹ بڑا ہوا ہو۔ کبھی قبض ہوتا ہو اور کبھی دست

آنے لگتے ہوں۔ ٹانگیں سوکھ جائیں۔ گردن اس قدر پتلی ہو جائے کہ سر کا بوجھ نہ اٹھاسکے تو ابراہیم مفید ہے۔ یہ دوا نیچے کے اعضاء کے سوکھنے کے لیے خصوصیت سے کام آتی ہے۔

- (۲) اگر بچہ کی نشوونما بے قاعدہ ہو رہی ہو۔ پیٹ پھولا ہوا ہو، سر بڑا ہوا اور تالو کھلا ہوا، دانت وقت سے نکلتے ہوں، جلد ڈھیلی ہو اور اس پر جھریاں پڑ جائیں، بچہ دودھ سے رغبت نہ رکھتا ہو بلکہ کھریا، مٹی، کوئلہ یا انڈا وغیرہ کھانے کا شائق ہو، بچہ کے سر پر پسینہ آتا ہو، نیز پاؤں پسینہ سے تر تر رہتے ہوں، پاخانہ سبز اور کھاری بودالا ہو تو کلکیر یا کارب دوا ہے۔ یہ دوا اکثر و بیشتر حالات میں بچوں کے سوکھنے میں دی جاتی ہے۔ اگر صبح کو ایک خوراک سلفر اور دن میں تین خوراک کلکیر یا کارب دیا جائے تو یہ دوا حیرت انگیز کام کرتی ہے۔ یہ نسخہ بہت مستند ہے۔
- (۳) اگر بچہ کو بھوک زیادہ ہو اور ہر وقت کھانا ہی چاہتا ہو لیکن جس قدر زیادہ کھائے اتنا ہی سوکھتا جائے۔ جگر اور تلی بڑھ جائے۔ چہرہ اور جسم کا ادیری حصہ مرجھا جائے۔ جلد میں جھریاں پڑ گئی ہوں۔ غدد جاذبہ پیٹ کے اندر انگلیوں سے محسوس ہوتے ہوں۔ اس کے علاوہ گردن کے غدد بھی سخت معلوم ہوتے ہوں۔ ہڈیوں میں بد وضعی ہو تو آئیو ڈیم بہت مفید ہے۔ خنازیری مزاج بچوں کے لیے یہ مخصوص دوا ہے۔
- (۴) اگر پرانے طیسریا کی وجہ سے جگر اور تلی کی خرابی سے نشوونما خراب ہو گئی ہو اور بچہ کو سوکھا ہو گیا ہو تو کلکیر یا آرس دوا ہے۔

(۵) ایک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے بچوں کے سوکھا کے لیے مائی مکس^{۳۴} تجرب بتلایا ہے جس کا مصنف نے اب تک تجربہ نہیں کیا۔ البتہ بعض ڈاکٹر اس کو استعمال کر کے حیرت انگیز کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔

(۶) بچہ کے پسینہ نیز پاخانہ سے سخت قسم کی بدبو مثل سڑے ہوئے پنیر کے آتی ہو۔ سر پر بے حد پسینہ ہو (جس کو سلیشیا و کلکیر یا بھی درست نہ کر سکا ہو) پاؤں ٹھنڈے اور پسینہ سے تر ہوں۔ شکم بڑھا ہوا اور ہڈیاں غیر نشوونما یافتہ ہوں کمزوری اور لاغری زیادہ ہو۔ ہاضمہ خراب ہو گیا ہو۔ بچہ دودھ ڈالتا ہو، یا کھانے کے بعد ہی پاخانہ کی حاجت ہوتی ہو۔ پاخانہ خشک اور مٹیالے رنگ کی گولیوں میں ہوتا ہو جھپیں بعض وقت انگلیوں سے نکالنا پڑے تو سینی کو لا دوا ہے۔ سوکھے کی بیماری میں اس کو اکسیر اعظم بتایا جاتا ہے بشرطیکہ بچہ کی جلد میلی، چکنی، مٹیالی اور مرجھائی ہوئی ہو اور مندرجہ صدر تمام علامات موجود ہوں۔

(۷) متعفن دست۔ بچہ بار بار پانی مانگے مگر ایک وقت میں صرف دو چار گھونٹ پیے۔ حد سے زیادہ کمزوری پائی جائے، بے چینی اور گھبراہٹ زائد ہو۔ دودھ یا کھانا ہضم نہ ہو، بلکہ قے سے خارج ہو جاتا ہو، غنودگی کی حالت میں بھی بچہ میں بے چینی اور کراہنا پایا جائے تو آرسنک دینا چاہیے۔

(۸) باپو کیمک میں کلکیر یا فاس سوکھے کی شرطیہ اور مجرب دوا ہے اگر اس کو سلیشیا کے ساتھ باری باری دیں تو اور بھی مفید ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سارسا پرپلا - نیٹرم میور - فاسفورس
برٹیا کارب اور چائنا وغیرہ کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے۔

ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا

RICKETS

اسباب :- ناقص دودھ، خراب غذا، تنگ و تاریک مکان میں
رہنا، ماں کی صحت کا خراب ہونا، (جس کی وجہ سے ماں کا دودھ ناقص
ہو جاتا ہے) گندی آب و ہوا۔ ایسی گائے یا بھینس کا دودھ استعمال
کرنا جو گھر پر صرف خشک چارہ پر رہتی ہوں۔ نشاستہ اور میدہ کا
کثرت استعمال وغیرہ۔

علامات :- یہ بیماری تین مہینہ سے کم کے بچے کو شاذ و نادر ہی
ہوتی ہے۔ عموماً چھ سات مہینہ سے لے کر دو سال کی عمر تک اس کا خطرہ
رہتا ہے۔ اس بیماری میں ہڈیوں میں اجزائے معدنی کے کم ہو جانے سے
ان میں کمزوری اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں
دانت دیر میں نکلتے ہیں۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ سوتے میں سر اور
چہرہ پر پسینہ آ جاتا ہے۔ راتوں کو بے چینی رہتی ہے۔ پیٹ بڑا ہو جاتا
ہے۔ جگر بڑھ جاتا ہے۔ ہڈیوں میں بد وضعی پیدا ہو جاتی ہے ران اور
پنڈلی کی ہڈیوں کے سرے موٹے ہو جاتے ہیں اور مثل کمان کے

خم کھا جاتی ہیں۔ سر کی ہڈیوں کے جوڑ نمایاں نظر آتے ہیں۔ سر بڑا معلوم ہوتا ہے۔ بچہ کیڑا ہو جاتا ہے اور قد و قامت چھوٹا رہ جاتا ہے۔ اگر اس مرض میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں اور بچہ کو مزمن کھانسی یا تشنج یا نمونیہ کا حملہ ہو جائے تو نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔

پہرہ ہمیشہ ہدایات :- اگر خاندانی طور پر یہ مرض ہو جاتا ہو تو بچہ کی ماں کی غذا اور صحت عامہ کی طرف خاص توجہ کرنا چاہیے۔ ماں کو عمدہ دودھ خوب پینا چاہیے اور ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جس میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی کی کثرت ہو علاوہ ازیں حتی الوسع دھوپ اور روشنی میں زیادہ رہنا چاہیے۔ بچہ کی غذا میں نشاستہ والی اشیاء قطعاً نہ ہونا چاہیے صرف تازہ اور عمدہ دودھ دینا چاہیے۔ جو بچے اوپر کا دودھ پیتے ہوں ان کو گدھی کا دودھ دینا چاہیے۔ بحالت مجبوری گائے کا دودھ دیں اور پھلوں کا رس ماں اور بچہ دونوں کو دیں۔ اور ایسی غذائیں دیں جن میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی پائے جاتے ہوں وٹامن ڈی دودھ، مکھن، بالائی، انڈے کی زردی، نباتاتی روغنیاں اور میوہ جات میں زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں۔ جو جانور باہر دھوپ میں ہری ہری گھاس چرتے ہیں ان میں وٹامن ڈی کی کثرت ہوتی ہے۔

ماں کو چاہیے کہ بچہ کو صاف ستھرا رکھے اور سردی سے بچے کو محفوظ رکھے، اگر بچے کو اوپر کا دودھ مضمّن نہ ہوتا ہو تو اس میں ایک چمچہ چرنے کا پانی ملا دینا چاہیے۔

علاج :- (۱) اس مرض کی کلکیر یا کارب نہایت اہم دوا ہے۔ اس کو اونچی طاقت میں دینے سے بہت جلد نمایاں طور پر فائدہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس دوا کی مخصوص علامات یہ ہیں۔ سر کا مقابلہ بڑا ہونا، پیشانی کا آگے کی طرف نکل آنا، متعفن پسینہ، چہرہ زرد، ہڈیوں کا بے قاعدہ نشوونما پانا، بچہ کا دیر میں چلنا وغیرہ وغیرہ۔

(۲) اگر سر اور چہرہ پر پسینہ زیادہ آتا ہو جو متعفن قسم کا ہو، ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی ہوں، سر بڑا ہو اور تالو کھلا ہوا ہو تو سلیشیا مفید دوا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کلکیر یا کارب فیل ہو جائے تو عموماً سلیشیا دینے سے کامیابی ہوتی ہے۔

(۳) جن بچوں کے پاؤں پر بکثرت پسینہ آتا ہو، بچہ کا قد چھوٹا ہو کر رہ جائے، ہڈیاں غیر نشوونما یافتہ ہوں، جگر بڑھ گیا ہو تو گنیشیا میور بہت مفید ہے۔ اگر شام کے وقت تلووں میں جلن ہو جس کی وجہ سے کپڑا پاؤں پر نہ اڑھ سکے تو یہ دوا اور بھی بالمشل ہو جاتی ہے۔

(۴) با یو کیمک میں کلکیر یا فاس اس مرض کی مجرب اور اہم دوا ہے۔ حفظ ماتقدم کے طور پر بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ سر پر پسینہ کی زیادتی اور متعفن دست کی حالت میں سلیشیا کے ساتھ باری باری دیں۔

(۵) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ فلورک ایسڈ۔ فاسفورس۔ اور ام میور۔ لائیگو۔ سلفر۔ ہیپر اور مرک حسب علامت دینا چاہیے۔

کالی کھانسی

WHOOPIING COUGH

اسباب :- معمولی کھانسی، سردی سرایت کر جانا، زکام و بانی،
 طائفائے بخار، نمونیا، نزلہ زکام کا بار بار ہونا، خراب آب و ہوا، ناقص
 غذا اور کثافت و غلظت وغیرہ۔ یہ بیماری عموماً چھوت سے ہوا کرتی ہے۔
 اور اکثر وبا کے طور پر پھیلتی ہے جو رفتہ رفتہ دورے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
 علامات :- کھانسی دورے کی شکل میں اٹھتی ہے۔ کھانسی مسلسل
 آتی ہے جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔
 سانس میں ابتری ہو جاتی ہے۔ کھانسی میں ہوپ کی آواز آتی ہے۔ یہ
 حالت چند منٹ تک رہتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے سکون ہو جاتا
 ہے۔ اس کے بعد پھر اسی قسم کی کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے۔ رات کو دورے
 زیادہ آتے ہیں اور بچے کا سونا حرام ہو جاتا ہے۔ شدید حالات میں
 دورے کے وقت بچے کا بول و براز خطا ہو جاتا ہے بعض وقت منہ سے
 خون آ جاتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کی میعاد چھ ہفتہ
 سے لے کر آٹھ یا دس ہفتہ تک ہے بعض وقت چھ ہفتہ سے قبل بھی
 صحت ہو جاتی ہے۔ نہایت لاغر بچے جن کے پھیپڑے کمزور ہوں اور جن کو
 اس قسم کی کھانسی کے دوران میں تیز بخار ہو جائے تو انجام عموماً
 بہتر نہیں ہوتا۔

پر مہینہ و ہدایات :- بچے کو سردی اور سرد ہوا سے محفوظ رکھیں۔
 تنگ اور کثیف مکان میں نہ رہیں۔ قبض نہ رہنے دیں۔ سینہ کو روئی کے
 پل سے اچھی طرح سینک دیں۔ تیز گرم سالہ، ترشی اور شیرینی سے
 سخت پرہیز کرائیں۔ دوران مرض میں مونگ کی دال کا پانی یا شوربا اور
 پھلکا دیں۔ اگر کمزوری بہت زیادہ ہو تو بخنی دیں یا دودھ میں منقہ جوش دے کر
 وہ دودھ گرم گرم پلا سکتے ہیں۔ خالص دودھ سے عموماً کھانسی بڑھ جاتی ہے۔

علاج :- (۱) جب دم گھٹنے والی کھانسی ہو، بلغم مقدار میں زیادہ
 اور سردار ہو یا سینہ میں بلغم بھرا ہوا معلوم ہو۔ اور دورے جلد جلد ہوتے
 ہوں اور جب قے ہو جاتی ہو تو سکون ہو جاتا ہو تو اپیکاک دینا چاہیے
 ابتدائی حالت میں یہ دوا خوب کام کرتی ہے۔

(۲) اگر بوقت دورہ کے مریض کا چہرہ سرخ ہو جائے اور تھمانے لگے،
 کھانسی میں کتے کے بھوکنے کی سی آواز نیکلے۔ آواز بیٹھ جائے، حلق میں
 سرسراہٹ سی معلوم ہونے کے بعد کھانسی کا دورہ اٹھتا ہو، کھانسی خشک
 ہو تو بیلا ڈونا مفید ہے۔ ابتدائی مرحلہ میں جیسے ہی کھانسی شروع ہو
 اس وقت میں یہ دوا عمدہ کام کرتی ہے۔

(۳) شدید کھانسی کے دورے جو یکے بعد دیگرے ہوتے ہوں،
 ہنسنے، گانے، پینے یا زور سے چیخنے پر کھانسی شروع ہو جاتی ہو، آدھی
 رات کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ کھانستے وقت بچہ دونوں ہاتھوں سے
 سینہ کو پکڑ لیتا ہو تنفس میں دقت ہوتی ہو اور قے ہو جاتی ہو تو ڈر دسرا

دینا چاہیے۔ کالی کھانسی میں اگر پیچیدگیاں نہ پیدا ہوئی ہوں تو یہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے۔

(۴) اگر دیر تک تشنجی کھانسی آتی ہو، بلغم گھڑ گھڑاتا معلوم ہوتا ہو جس سے دم گھٹنے لگے، لسدار بلغم بذریعہ قے خارج ہوتا ہو، کھانسی کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہوتا ہو تو کیو پرم دیں۔ یہ دوا عموماً اُس وقت کام آتی ہے جب ڈر و سرائنا کام رہا ہو۔

(۵) اگر تمام دوائیں فیل ہو جائیں اور مریض کمزور ہو جائے، پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ ہو، حلق میں سرسراہٹ پائی جائے تو وریٹرم البم۔ ہر بار دورہ کے بعد دینا چاہیے۔

(۶) کھانسی کا دورہ صاف، تار دار اور لسدار بلغم کی قے سے ختم ہوتا ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی آرام ہو جاتا ہو۔ حلق میں سرسراہٹ ہوتی رہتی ہو، بچہ صبح سویرے کھانسی سے جاگ پڑتا ہو تو کوکس کیکٹائی دوا ہے۔

(۷) بایو کیک میں کالی میور اور گنیشیا فاس باری باری سے دیں۔ اگر گنیشیا فاس ناکام رہے تو کلکیریا فاس اور کالی میور کے بعد دیگرے دینا چاہیے۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سیپیا، سپنجیا، میفاٹس، کالی بانی، انٹرمٹارٹ، گورٹیم ریو برم اور پلسا ٹیلا کی طرف ضرورتاً توجہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام دوائیں کالی کھانسی کے لیے نہایت اہم ہیں۔

اشارات

- ا۔ کالی کھانسی جس میں غذا کی تے ہو دورے یک دم آئیں اور اچانک غائب ہو جائیں۔۔ پسٹیلہ۔
- ب۔ کھانسی جس میں لہسار یا پانی کا ساتار دار بلغم نکلے۔ کالی بانی۔
- ج۔ دورے بہت جلد جلد یکے بعد دیگرے گویا کھانسی کا لامتناہی سلسلہ۔ کورٹیم ریو برم۔
- د۔ کھانسی، چہرہ نیلا ہو جائے بوقت دورہ مریض کو احساس گویا زندگی ختم ہو جائے گی۔ میفائٹس۔
- س۔ کھانسی کو تحریک دینا جب بچہ غصہ میں آئے۔ انٹرمارٹ۔
- س۔ کھانسی کا دورہ جس میں گھٹنے شکم سے لگ جائیں۔ تھرڈن۔
- ص۔ کھانسنے سے پھوڑے کا سادرد، کھانسی بالکل خشک۔
- انٹرم سلف اورم $\times$ ۱
- ط۔ پاؤں یا سر ننگا کرنے سے کھانسی کے دورے۔ سلیشیا۔

کانچ نکلا

PROLAPSUS ANI

اسباب :- عام کمزوری۔ دائمی قبض۔ مقعد کے چھلکے کا ڈھیلا ہونا،

آنتوں میں کیڑے۔ پرانے دست یا پیش و غیرہ۔

علامات :- اجابت کے وقت یا اس کے بعد مقعد کے اندر سے ایک سرخ گوشت کا لوتھڑا نکل آتا ہے۔ جو بسا اوقات آبدست کے وقت ہاتھ سے دبانے سے اندر پھر چلا جاتا ہے۔ شدید حالات میں زور سے ہنسنے یا کھانسنے سے بھی کالچ نکل آیا کرتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو لٹا کر پاخانہ پھرائیں۔ پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال کر جوش دیں۔ اس کو ٹھنڈا کر کے آبدست لیا کریں اور کالچ پر نہ ہی پانی دھاریں۔ قبض ہرگز نہ رہنے دیں۔ کمزوری کی حالت میں مقوی اشیاء اور پھل وغیرہ کا استعمال کرائیں۔

علاج :- اس مرض میں اگنیشیا۔ پاڈو فائلم۔ روٹا۔ ایلو۔ سیلا ڈونا۔ سلفر۔ مرک۔ کلیریا۔ نکس و امیکا۔ فاسفورس۔ ہامیلنس۔ میورٹیک ایسڈ۔ سیپیا۔ ایپس۔ آرسنک اور میگنیم وغیرہ بہت مفید ادویہ ہیں۔
بایو کیمک میں فیرم فاس اور میگنیشیا فاس دینا چاہیے۔
نوٹ :- کالچ نکلنے میں نے عموماً پاڈو فائلم یا اگنیشیا سے علاج کیا ہے مجھے کبھی دوسری دوا دینے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ دونوں دوائیں کالچ کے لیے اکیر ہیں۔ چڑچڑے اور اعصابی مزاجوں کو اگنیشیا دینا چاہیے۔

اشارات

۱۔ کالچ پاخانہ کے قبل نکلے۔ پاڈو فائلم۔

- ب۔ کانچ پاخانہ کے دوران یا بعد۔ پاڈو فائلم۔ اگنیشیا۔
 ج۔ دستوں کے دوران۔ پاڈو فائلم۔
 د۔ کھڑے ہونے سے۔ فیرم آئیڈ۔
 س۔ پیشاب کے دوران کانچ نکل آئے۔ میورٹیک ایسڈ۔
 سس۔ کانچ میں درد ہو۔ آرسنک۔
 ص۔ جھکنے پر، پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھنے پر۔ (بلا زور لگائے)
 روٹا۔

گلسوے۔ کرمبول

MUMPS

اسباب :- حلق کے غدود کا متورم ہونا، نزلہ وزکام، سردی لگنا، ناقص غذا اور خراب پانی پینا۔ کثافت و گندہ گی۔ ابھاروں کا دب جانا وغیرہ۔
 علامات :- اس بیماری میں کان کے نیچے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت صرف ایک ہی غدود میں درم ہوتا ہے اور کبھی دونوں میں۔ معمولی سا بخار بھی ہو جاتا ہے اور طبیعت سُست ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عموماً تین روز تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اکثر حالات میں خود بخود تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- بچہ کو سردی سے محفوظ رکھیں۔ صفائی کا

محافظ خاص طور پر رکھیں۔ مقام ماؤفہ کو دو ایک بار سینک دیں۔ ٹھنڈی
نیز ثقیل اشیاء سے پرہیز۔

علاج: (۱) ابتدا میں بے چینی، پیاس، الجھن اور بخار کی حالت
میں اکونائٹ دیں۔

(۲) اگر بخار بہت تیز ہو گیا ہو جس کی وجہ سے چہرہ سرخ اور تھمایا ہوا
معلوم ہوتا ہو، حلق تنگ ہو گئی ہو، سیال چیز مشکل سے نگلی جاتی ہو۔ تو
بیلادونا مفید ہے۔

(۳) کرمبول جس میں منہ سے رل بکثرت ہے، منہ کھولنے میں
دقت ہو، بچہ کو پیاس معلوم ہوتی ہو تو مرک دیں۔
(۴) اگر بھیگ جانے سے کرمبول کی شکایت ہو گئی ہو، حلق میں
خشکی کا احساس ہو، نگلنے میں دقت ہو، زبان کی نوک پر شلشی نشان ہو
تو رشاکس دوا ہے۔

(۵) حلق میں خشکی، زبان کی جڑ میں درد، حلق میں جلن، تالوسیا ہیٹل
سرخ، نگلنے میں درد ہوتا ہو یا یہ احساس کہ حلق میں کوئی گولا رکھا ہے۔ تو
فانی ٹولا کا مفید ہے۔ کرمبول کے لیے فانی ٹولا کا شمار اہم ترین
ادویہ میں سے ہے۔

(۶) باپو کیمیکس فیرم فاس اور کالی میور باری باری دینا چاہیے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ لکسیس، ہیپر کاربوئرج، کیمو ملا۔

کالی بانی اور لپاٹیل وغیرہ کی طرف توجہ کریں اور علامات کے مطابق دین۔

سوتے میں پیشاب کرنا

NOCTURNAL ENURESIS

اسباب :- عام کمزوری، جسم میں کیلشیم (چونا) کی کمی، شانہ کی کمزوری، گھونگھٹ کا لمبا ہونا، سپاری میں خراش یا ورم کا ہونا، چرنوں (سوتی کیڑے) کا پایا جانا، آلات ہضم کا کمزور ہونا وغیرہ۔

علامات :- سوتے وقت بستر پر بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے بعض وقت بچہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا پیشاب کر رہا ہے۔ جس کے بعد پیشاب ہو جاتا ہے۔ کبھی بچہ کو کوئی خواب نہیں دکھائی دیتا۔ یہ مرض عصبی مزاج والوں کو خصوصیت سے ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- بچے کی عام صحت کو بہتر بنانا چاہیے مقوی اور زود ہضم غذا دیں۔ بار بار کھانے کو نہ دیں بلکہ وقت مقررہ پر غذا وغیرہ دیں۔ رات کو پیشاب کر کے لیٹنا چاہیے۔ نیز رات کو پیشاب کرنے کے لیے بچہ کو دو ایک بار جگا لینا چاہیے۔ اگر آنتوں میں کیڑوں کے باعث یہ شکایت ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں اور میٹھی اشیاء دینا بند کر دیں۔

نوٹ :- چونکہ اس مرض میں دوا کے انتخاب میں معالجین اکثر غلطی کر جایا کرتے ہیں اس لیے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ ہومیو پیتھک علاج میں ادویہ کے انتخاب کا دار و مدار علامات پر ہے اس لیے کوئی بھی دوا کسی مرض کے لیے پیٹنٹ نہیں ہو سکتی۔ اس بیماری میں اکثر ہومیو پیتھ صرف محدود

پیشینٹ ادویہ سے کام لیتے ہیں اور باقاعدہ علامات لے کر دوا کے انتخاب میں اپنا دماغ نہیں لڑاتے جس کی وجہ سے اکثر اوقات ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

علاج :- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا سلفر ہے جو اکثر و بیشتر حالات میں علامات کے مطابق ہوتی ہے۔ (اس دوا کا اثر دیر تک رہتا ہے اس لیے اس کو جلد جلد دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی)۔

(۲) اگر کسی وجہ سے سلفر فیل ہو جائے تو اگر لڑکی ہے تو سیپیا یا پلسا ٹیلا دیں اور اگر لڑکا ہے تو کلکیر یا کارب یا نکس و امیکا دیں۔

(۳) اگر پیٹ میں کیڑوں کے باعث پیشاب ہوتا ہو، پیشاب میں تیزبو ہو، ناک میں کھجلی معلوم ہوتی ہو تو سنا دیں۔

(۴) اعصابی مزاج بچوں کے لیے کلکیر یا سلفر۔ سلیشیا اور بیلا ڈونا دوائیں ہیں۔

(۵) اگر پہلی ہی نیند میں پیشاب ہو جاتا ہو۔ یہ حالت موسم سرما میں بڑھ جاتی ہو اور موسم گرما میں گھٹ جاتی ہو، مثلاً نہ کمزور ہو تو کاسٹم دینا چاہیے۔

(۶) باپو کیمک میں کلکیر یا فاس اس مرض کی نہایت عمدہ دوا ہے۔

(۷) اس مرض کے لیے ذیل کی تمام دوائیں نہایت ضروری ہیں۔

آرسنک۔ آرنیکا۔ ارجنٹم نائٹ۔ نیزوٹک ایسڈ۔ بیلا ڈونا۔


پلسا ٹیلا۔ رشاکس۔ سلفر۔ سلیشیا۔ سیپیا۔ فیرم مٹ۔ کاسٹم۔

کریا زوٹ۔ کلکیر یا۔ گریفائٹس۔ لیک کینم۔ یگنیٹیا میور۔ نائٹک ایسڈ۔

نیٹرم میور - ہمپیر اور چائنا وغیرہ -

اشارات

- ۱۔ پیشاب کرنے کا خواب دیکھے اس کے بعد پیشاب نکل جائے۔
سیپیا - کریا زوٹ -
- ب۔ عادت کے سوا اور کوئی اصل وجہ نہ ہو - ایکوی سیٹم -
- ج۔ بچہ کو جگانا مشکل ہو جائے بیلڈوٹا - کریا زوٹ -
- د۔ جب کمزوری اس کا باعث ہو - چائنا - کلکیریا فاس -
- س۔ پہلی نیند میں پیشاب نکل جائے - ایسڈ فاس - سیپیا -
کاسٹم - کریا زوٹ -
- س۔ تشنگی طہر پر پیشاب بستر میں نکل جائے - اربٹم ٹائٹ - جلیسم -
نکس و امیکا -



باب چہارم

امراض نسواں

استقاط حمل

ABORTION - MISCARRIAGE

منوجٹ :- حمل قرار پانے کے بعد اگر سات ماہ سے قبل جنین رحم سے خارج ہو جائے تو اُسے استقاط حمل کہتے ہیں۔ تیسرے ماہ تک اگر استقاط ہو جائے تو اُسے ڈاکٹری اصطلاح میں "ابارشن" ABORTION کہتے ہیں اور اس کے بعد ساتویں ماہ تک "میس کیج" MISCARRIAGE کہلاتا ہے۔

اسباب :- رحم پر چوٹ لگنا، رحم کا کمزور ہونا، کثرت محنت و مشقت، کمی خون، کثرت جماع، کثرت اشیائے منشی، کوئی وزنی چیز اٹھانا، کودنا یا ٹھکر کھانا، دماغی جذبات، فکر، غصہ، رنج و غم، اچانک دھماکے کی

اوپنی آواز کان میں پڑنا، دست آور یا تیز قسم کی ادویہ استعمال کرنا اور زن و شوہر میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو آتشک کا مرض ہونا۔ یا بعض شدید امراض از قسم چیچک، سیل یا نمونیا وغیرہ وغیرہ کا ہونا اس کے خاص اسباب ہیں۔

علامات :- رحم سے کم و بیش خون کا جاری ہونا حمل کے ساقط ہونے کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اسقاط سے پہلے حاملہ کی طبیعت سُست ہو جاتی ہے۔ پیٹ، کمر، اور رانوں میں درد زہ کی مانند ٹھہر ٹھہر کر درد ہوتا ہے۔ ہلکی سی حرارت آ جاتی ہے۔ رحم سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ جب درد جلد جلد اُٹھنے لگتا ہے تو پھر حمل اکثر گرہی جاتا ہے۔ اگر خون کم آتا ہو اور در د بھی خفیف ہو تو بعض اوقات حمل ٹھہر بھی جاتا ہے۔

نوٹ :- بعض حالات میں خون زیادہ مقدار میں نکلنے سے مانتہائی کمزوری کی حالت میں مریضہ کو غش آ جاتا ہے جس سے زندگی معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ اگر دیگر شدید عوارضات از قسم سل و نمونیا وغیرہ بھی موجود ہوں اور مریضہ میں خون کی کمی ہو تو بھی نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔ عام طور سے تیسرے چوتھے مہینے حمل زیادہ تر ساقط ہوتے ہیں۔ اس سے قبل کا اسقاط زیادہ تر خطرناک نہیں ہو کرتا لیکن تین چار ماہ گزر جانے کے بعد اسقاط حمل بہت خطرناک یا مُہلک ہوتا ہے۔

تشخیص و تفریق | اسقاط حمل اور رُکے ہوئے حیض کے خون میں تفریق کیا کرتے ہیں۔ اسقاط حمل میں مذکور بالا

تمام علامات کے علاوہ سب سے پہلے خون بہ کثرت خارج ہوتا ہے

جس میں سے لو تھڑے بھی کافی نکلتے ہیں اور وضع حمل کا درد نہایت شدت سے ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے مگر معمولی رکے ہوئے حیض میں درد قطعی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت معمولی۔ مریضہ پر غشی وغیرہ نہیں طاری ہوتی اور نہ اس قدر کمزوری غالب آتی ہے۔

پرہیز و ہدایت :- مریضہ کو آرام سے لٹائیں اور کسی شے کی حرکت نہ کرنے دیں۔ جب خون بہت خارج ہونے لگے اور اسقاط رک نہ سکے تو پھر یہی کوشش کرنی چاہیے کہ حمل جلد ساقط ہو جائے۔ اسقاط کے بعد مریضہ کو کوئی غذا نہ دینا چاہیے صرف دودھ، منقے یا موٹھ کو جوش دے کر اس کا پانی دیں۔ چار دن کے بعد مونگ کی دال یا شورپہ اور روٹی کا پھلکا دیں۔

حفظ ما تقدم | حمل ساقط ہونے کا اصل سبب دریافت کریں۔ چنانچہ اگر زن و شوہر میں سے کسی ایک کو آتشک کا مرض ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ جن مستورات کا حمل دو ایک بار گر چکا ہو ان کو چاہیے کہ حمل کے ایام میں وہ ان دنوں میں آرام سے بستر پر لیٹی رہا کریں جن دنوں میں ان کا پہلا حمل ساقط ہوا تھا۔ بادی اور تیز گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ کوئی دزنی چیز نہ اٹھائیں اور نہ ہی اچھلیں کو دیں۔ غرض کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے رحم پر بوجھ پڑے۔ قبض کسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر رحمی کمزوری اسقاط کا باعث ہو تو اس کا تدارک کریں۔

علاج :- (۱) اگر درد زہ کے مانند بار بار درد ہوں اور سیاہ رنگ کا

سیلان مقدار میں زیادہ شروع ہو جائے، مریضہ کو کھلی ہوا کی خواہش ہو تو سیکیل کار دیں۔ حمل کے ابتدائی نیز آخری ایام میں یہ بہت عمدہ دوا ہے راتوں میں سرسراہٹ اور چیونٹیوں کی سی رینگن کا ہونا اس کی ایک خاص علامت ہے۔

(۲) اگر خون چکدار اور سرخ ہو، دبانے والے درد کم و بیش متلی کے ساتھ پائے جائیں، غشی اور ضعف ہو۔ خون بغیر کسی رکاوٹ کے باقاعدہ طور پر آ رہا ہو۔ ناف کے گرد درد زیادہ ہو تو اپیکاک دیں۔

(۳) اگر مندرجہ صدر دونوں ادویہ ناکام رہی ہوں تو کیمولادیں۔

(۴) اگر تیسرے مہینے اسقاط ہو جاتا ہو۔ خون چکدار سرخ اور منجمد

نکلتا ہو۔ درد ذہ کے سے درد ہوتے ہوں تو سبائٹنا دوا ہے۔

(۵) اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے یا گر پڑنے سے اسقاط کا خطرہ ہو، تو

آرنیکا مفید ہے۔

(۶) درد ذہ کی سی تکلیف ہو، مریضہ ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرتی ہو۔

خون بار بار آتا ہو، تھوڑی دیر تک خون بند رہے اس کے بعد دو گنے زور سے جاری ہو علیٰ ہذا القیاس۔ تو پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔

(۷) اگر رجم کمزور ہو اور اسقاط حمل کی عادت ہو گئی ہو۔ تشنخی قسم کے

درد ہوتے ہوں۔ درد پیٹھ سے شروع ہوتے ہوں اور شکم کے نچلے حصہ میں

ہوتے ہوئے راتوں تک جاتے ہوں تو دوا دانی برقم x ۳ نہایت عمدہ کام کرتی ہے۔

(۸) مریضہ بہت کمزور ہو جس کے باعث اسقاط ہو جائے اور اُس کے بعد سیلان خون نہ رُکے تو چائنا دوا ہے۔
 (۹) بایو کیمک میں کلکیر یا فاس اور کالی فاس حفظ ماتقدم کے طور پر دیں۔

(۱۰) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ پلائنا۔ مرک۔ بیلادونا۔ سیپیا۔ سمی سنی توگا۔ کالوفائلم۔ سنامن۔ پلسیم۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب۔ چائنا۔ ایپس اور کالی کارب وغیرہ کا شمار خاص ادویہ میں سے ہے۔

اشارات

- ۱۔ غلط قدم پڑنے سے اسقاط۔۔ سنامن۔
- ب۔ ماں میں آتشکی مادہ کے باعث اسقاط حمل۔ مرک سال۔ سلفر۔ کلکیر یا کارب۔
- ج۔ خوف یا غصہ کے باعث۔ اکونائٹ۔ کیموملا۔
- د۔ اسقاط کی عادت ہوگئی ہو۔ فاسفورس۔ کالوفائلم۔ سبائنا۔ پلساٹیللا۔ ہیپو نالس۔ مرک۔
- س۔ یکایک ہتک یا کمزور کر دینے والے جذبات (مثلاً بڑی خبر یا غصہ کے اثرات) سے۔ حلیم۔
- س۔ اسقاط تمام جسم میں تشنج اور غشی کے ساتھ۔ ہیپوسمس۔
- ص۔ خوف سے اسقاط۔ اکونائٹ۔ گنیٹیا۔ اوپیم۔ حلیم۔

ط۔ خاموش عنہم سے۔ اگنیشیا۔ نیٹرم میور۔
ع۔ چوٹ کے بعد۔ آرنیکا۔ رشاکس۔

استحاضہ

(ایام حیض کے علاوہ خون آنا)

METRORRHAGIA

اسباب :- رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا ٹیڑھا ہو جانا۔ رحم کا
ڈھیرلا ہو جانا۔ رحم کے اندر بدگوشت کا بڑھ جانا۔ ورم رحم۔ رحم کے اندر
پھنسیوں کا ہونا یا رحم میں آنول کا ٹکڑا رہ جانا۔ مرض سل اور کثرت
مجامست وغیرہ۔

علامات :- رحم سے خون کبھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور کبھی ایک ہی
بار زیادہ مقدار میں دھار مار کر خون نکلتا ہے۔ بعض وقت اس کثرت سے
خون جاری ہوتا ہے کہ مرینہ کی جان پر بن آتی ہے۔ کمزوری بڑھ جاتی
ہے۔ کبھی مارے کمزوری کے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔
بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ کبھی پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ بے چینی،
گھبراہٹ، نفی، اور متلی کی شکایت ہو جاتی ہے بعض وقت دروزہ کا سا
درد ہوتا ہے۔

نوٹ :- حمل کے زمانہ میں خون کا دکھلانی دینا اکثر اسقاط کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔

پہرہ سیز و ہدایات :- مریضہ کو آرام سے بستر پر چٹ لٹائے رکھیں چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے سے باز رکھیں اور دن میں دو تین بار ہٹکری ایک ڈرام آدھ سیر پانی میں جوش دے کر ڈوش کریں۔ پانی خفیف گرم ہونا چاہیے تاکہ مریضہ برداشت کر سکے۔ سرخ مریچ، بادی، ترشی اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ دودھ، فیرینی، سا بودانہ اور دیگر مٹگی اور لطیف غذا کھانے کو دیں۔

علاج :- (۱) اس مرض کی سب سے عمدہ دوا اپیکاک ہے عموماً اس کی چند خوراکیں مرض کو قابو میں کر لیتی ہیں۔ متواتر چمکدار اور سرخ خون کا نکلنا، ناف کے پاس درد اور مثلی کا ہونا اس دوا کی مخصوص علامتیں ہیں۔ (۲) اگر خون برابر جاری رہے اور اپیکاک ناکام رہے اور درد زہ کا سا درد ہوتا ہو تو سیکیل کار دینا چاہیے۔ بہت مفید ہے۔ خون پتلا، سیاہ اور بدبودار ہونا اور ذرا سی حرکت سے سیلان کا بڑھ جانا سیکیل کی خاص علامات ہیں۔

(۳) اگر مریضہ میں کمزوری بہت ہو، غشی طاری ہو جاتی ہو۔ سیاہ خون کے لوتھڑے خارج ہوتے ہوں تو چائنا دیں۔ یہ دوا اس وقت بھی کام آتی ہے جب مندرجہ صدر دونوں دوائیں اپنا فعل انجام دینے سے قاصر رہی ہوں۔ (۴) اگر خون تھوڑی دیر تک ٹھہر جاتا ہو اور اس کے بعد اُس سے دو گنے زور سے خارج ہوتا ہو، مریضہ کو ٹھنڈی ہوا کی خواہش ہو تو پلسا ٹیلا دیں۔ اگر پلسا ٹیلا ناکام رہے تو کو نیم دیں۔ ان دونوں دواؤں کو اُس وقت

خاص طور سے دھیان میں لانا چاہیے جب اوپر کی لکھی ہوئی سب کی سب ادویہ اپنا اثر دکھانے سے معذور رہی ہوں۔

(۵) اگر ذرا سی حرکت سے خون جاری ہو جاتا ہو لیکن اکثر چلنے سے کم ہو جاتا ہو۔ خون مقدار میں زیادہ اور متعفن ہو۔ سیلان کے ساتھ درد زہ کے سے درد ہوں تو سبائٹا دیں۔

(۶) با یو کیمک میں فیرم فاس بہت عمدہ دوا ہے۔ درد کی حالت میں گنیشیا فاس کے ساتھ یکے بعد دیگرے دیں۔ غشی اور کمزوری کی حالت میں کالی فاس کے ساتھ باری باری دینا مفید ہے۔

(۷) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سیپیا۔ لیکسیس۔ ٹریپیم۔ بوتھر اپس۔ بیلا ڈونا۔ اسٹی لیگو۔ پلاٹنا۔ رٹاکس۔ ہیوسمس۔ کلکیریا۔ لائیکو۔ فاسفورس۔ ہامیلیس۔ نکس و امیکا۔ ٹائٹک ایسڈ۔ میلی فولیم۔ اور میورکس وغیرہ اس مرض میں بہت مفید ہیں۔ حسب علامت دیں۔

اشارات

- ۱۔ بد گوشت یا رسولی سے۔ کلکیریا۔ کونیم۔
- ب۔ پر نالہ کی طرح یک دم جاری ہو۔ اپیکاک۔ پلسا ٹیلا۔ بیلا ڈونا۔
- ج۔ گہرے رنگ کا (سیاہی مائل) سرخ خون جو کئی دنوں تک رتا رہے۔ اسٹی لیگو۔ کاربو۔ ج۔
- د۔ درد زہ کے سے درد۔ سبائٹا۔ سکیل۔ پلاٹنا۔ پلسا ٹیلا۔

کروکس - ہیوسمس - فیرم -
 سرا - خون سیاہ اور منجمد - کروکس - فیرم - لیکسیس - چائنا - کیمولا -
 پلساٹیل - لائیکو - سبائنا -
 س - خون چکدار سرخ - اپیکاک - بیلاڈونا - گلکیریا - لائیکو -
 ص - متفنن خون - سیکیل - کیمولا - بیلاڈونا - کروکس - سبائنا -
 ط - استحضہ میں جبکہ پیشاب تکلیف سے ہوتا ہو - ایری جیرن -
 ع - سن یاس کے زمانہ میں - سلفر سیپیا - گلکیریا - لیکسیس -
 ف - مسلسل خون - اپیکاک - ایری جیرن - ہیوسمس - کیمولا -
 کاربودج - کریا زوٹ -

بندش حیض

(حیض کا دیر سے آنا یا رک جانا)

AMENORRHOEA

اسباب :- درم رحم - حمل - ایام رضاعت (بچوں کو دودھ پلانے کا زمانہ) - سن یاس، رحم کا منہ بند ہو جانا - کمی خون - بعض مزمن امراض مثلاً سلی، دق، امراض جگر و گردہ وغیرہ - سیلان رحم - ایام حیض میں سردی کھا جانا وغیرہ - بعض دوسری مزاج یا موٹی تازی عورتوں کو حیض کمی کے ساتھ ہوا کرتا ہے یا بند ہو جاتا ہے -

علامات :- ہاتھ پیروں میں جلن ہوتی ہے، طبیعت سُست اور کسلند رہتی ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ بحالت کمزوری دھڑکن ہونے لگتی ہے۔ اعضاء شکنی ہوا کرتی ہے۔ بعض وقت حیض بند ہو جانے سے کان، ناک، یا منہ سے خون آجاتا ہے۔

اگر نوجوان لڑکیوں کو حیض نہ آئے اور پیڑ پود پر درد کی شکایت ہو تو رحم یا خصیتہ الرحم کی خرابی تصور کرنا چاہیے۔

موٹی تازی مستورات میں پیڑ و میں گرائی، کوٹھے اور ران میں درد اور اعضاء شکنی ہوا کرتی ہے۔ بعض حالات میں بخار بھی ہو جاتا ہے۔

کمی خون کے سبب سے اگر حیض کم ہوتا ہو یا دیر سے آتا ہو یا بالکل رک گیا ہو تو مریضہ میں اختلاج اور نقاہت و کمزوری کی علامات ہوتی ہیں۔ جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔

مزمن امراض کے دوران میں خون حیض ایک دم سے بند نہیں ہوتا بلکہ بتدریج کم ہوتا جاتا ہے اور بالآخر بند ہو جاتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- سب سے پہلے حیض بند ہو جانے کا سبب معلوم کریں اور اس کے مطابق اس کا علاج اور تدارک کریں۔ سردی کے باعث اگر خون حیض بند ہو گیا ہو تو مقام رحم پر سینک کریں یا گرم پانی میں کمر تک بٹھائیں۔ کمی خون کی حالت میں مقوی اور زود ہضم غذا دیں۔ تازہ پھل و میوہ جات کا استعمال کرائیں۔ دودھ، مکھن، بالائی وغیرہ کھانے کو دیں۔ لال مرچ، ماگوں، اشیاء، بادی اور قابض چیزیں مضر ہیں۔ مریضہ کو صاف اور ہوا دار جگہ پر

رکھیں۔ بعض وقت خارجی علاج یعنی مناسب شفاف یا ڈوش وغیرہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

علاج :- اس مرض کے لیے پلسا ٹیلا نہایت مفید دوا ہے جو اکثر و بیشتر حالات میں دی جاتی ہے۔ اگر کمی خون سے حیض دیر میں آئے یا حیض بند ہو جائے پیر تر ہو جانے سے بندش حیض، حیض مقدار میں کم ہوں یا تھوڑے عرصہ تک رہیں مریضہ کو ہر ٹھنڈی چیز اور ٹھنڈی ہوا بہت عمدہ معلوم ہوتی ہو، منکسر المزاج اور بہت جلد آنکھوں میں آنسو بھرنے کی رغبت ہو تو پلسا ٹیلا ہی دوا ہے۔ جب لڑکیوں کا پہلا حیض دیر میں ہو تب بھی یہی دوا دینا چاہیے۔

(۲) اگر پلسا ٹیلا فعل ہو جائے تو سپیا دیں۔ سپیا کی مریضہ میں اعصابیت اور نازک مزاجی پائی جاتی ہے۔ اور اندرونی اعضاء باہر گرتے محسوس ہوتے ہیں۔ بعض وقت بجائے حیض کے لیکوریا ہوتا ہے بقیہ علامات بہت کچھ پلسا ٹیلا سے ملتی جلتی ہیں۔

(۳) موٹی تازی یا خناریری مزاج کی مستورات زینہ چڑھنے سے جن کی سانس پھولنے لگے اور دھڑکن کی شکایت رہا کرتی ہو، پیرغم اور ٹھنڈے رہتے ہوں۔ ذرا سی حرکت سے پیشانی پر پسینہ آجاتا ہو تو کلکیر یا کارب دوا ہے۔

(۴) اگر حیض بند ہو گیا ہو اور بجائے حیض کے خون ناک یا کسی دوسرے مقام سے خارج ہو، پیڑ میں درد ہو۔ چلنے پھرنے سے تکلیف

زیادہ ہو جاتی ہو، مریضہ کو قبض ہو تو برائی اونیادیں۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو فاسفورس دیں۔

(۵) موٹی عورتوں میں جن کا بلا کسی علامت کے حیض بند ہو جائے اور کبھی نمودار ہو جائے۔ رحم نیچے کو دبتا ہوا محسوس ہوتا ہو۔ جسم پر جا بجا پیچھے دانے نکلا کرتے ہوں تو گریفائٹس مفید ہے۔

(۶) کمی خون کے باعث حیض میں کمی، غم و اندوہ کے اثرات مابعد اور پست حوصلگی، حیض یا تو بہت دیر میں ہوں یا قلیل مقدار میں یا بالکل بند ہو جائیں۔ بوقت حیض یہ احساس کہ ہر چیز آلات تناسل میں سے نکلی پڑتی ہے حیض کے ایام میں مریضہ مخموم اور سست ہو جاتی ہو تو نیٹرم میور دینا چاہیے۔ نیٹرم میور کے فیل ہو جانے پر کالی کارب دیں۔

(۷) نوجوان لڑکیوں کو ڈمیانہ مدرٹنکچر ۱۵ قطرہ فی خوراک دن میں تین مرتبہ دیں تو حیض کھل کر آنے لگتا ہے اور پھر باقاعدہ ہو جاتا ہے۔

(۸) حیض کو جاری کرنے کے لیے پانی ٹنس مدرٹنکچر یا گاسی پیم مدرٹنکچر دن میں ۳ بار دینا اکثر نفع بخش ہوتا ہے۔

(۹) باپو کیمک میں کالی سلف اور کالی فاس بہت مفید ہیں۔

(۱۰) ان کے علاوہ سلفر۔ ایپس۔ نکس وامیکا۔ فاسفورس۔ پلاٹنا۔

مگنیشیا کارب۔ ڈکمارا۔ بیلا ڈونا اور کالہ بودج وغیرہ بہت اہم ادویہ ہیں۔

حسب علامت دیں۔

اشارات

- ۱۔ بجائے حیض کے لیکوریا کا اخراج بہ کثرت ہو۔ کاسٹم۔
- ب۔ بندش حیض، ریاحی شکایت، پیشاب میں سرخ ریت۔ لائیکوپوڈیم۔
- ج۔ کمی حیض جس کے ساتھ دانستوں اور چوڑوں میں درد ہو۔ ٹیرنٹولا۔
- د۔ حیض صرف رات کو (دن کو خون حیض ندارد) ہو سٹا۔
- س۔ حیض کی کمی جس میں بینائی یکایک کم ہونے لگے۔ سیپیا۔ سیپیا گلیمن۔
- س۔ حیض بہت قلیل وقت تک رہے اور بالکل ذرا سا خون آئے تو پہلی دوا پلسا ٹیلا۔ (فائدہ نہ ہونے پر ایک خوراک سلفر کی دے کر پھر پلسا ٹیلا) اس کے باوجود ناکامی کی صورت میں گریفائیٹس یا کاربودج۔
- ص۔ بندش حیض جذبات کے باعث۔ کیموٹلا۔ پلاٹنا۔ نکس موسکاٹا۔ سمی سی نوگا۔
- ط۔ بندش حیض بھیگ جانے سے۔ پلسا ٹیلا۔ ڈکمارا۔ رشاکس۔
- سینی شو۔ کلکیر یا کارب۔ ہیلی بودس۔

کثرت حیض

MENORRHAGIA

اسباب :- رحم کا ڈھیلا ہونا۔ بار بار حمل کا گرنا۔ کثرت جماع۔

شہوت خیز باتوں میں دلچسپی لینا - رحم میں خراش کا ہونا - رحم میں کسی رگ کا منہ کھل جانا - رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا - رحم میں پھنسیاں یا رسولی وغیرہ کا ہونا - امراض جگر و قلب - جسم میں خون کی کثرت - دل اور پھیپھڑے کی بیماری کے باعث رحم کی رگوں میں خون کا جمع ہو جانا - اور رحم کے اندر آٹول کا ٹکڑا رہ جانا وغیرہ وغیرہ -

علامات :- خون حیض بکثرت آتا ہے - کبھی مسلسل ایک ہی رفتار سے آتا ہے اور کبھی ٹھہر ٹھہر کر زیادہ مقدار میں خارج ہوتا رہتا ہے بعض وقت خون کا سیلان اس شدت سے ہوتا ہے کہ مریضہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے - جو مستورات قلب اور پھیپھڑے کے عوارض میں مبتلا ہوں ان کے لیے یہ حالت بڑی تشویشناک ہوا کرتی ہے بعض حالات میں تلف جان کا اندیشہ ہوتا ہے - خون زیادہ مقدار میں نکل جانے سے مریضہ بہت لاغر اور کمزور ہو جاتی ہے - چہرہ زرد پڑ جاتا ہے - بھوک غائب ہو جاتی ہے - کبھی پاؤں پر درم بھی آجایا کرتا ہے - خون کا رنگ کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی سیاہی مائل یا سیاہ - علاوہ ازیں خون کبھی پتلا ہوتا ہے اور کبھی پیچھا -

تشخیص و تفریق | استحضار اور کثرت حیض میں تفریق کیا کرتے ہیں چنانچہ اگر حیض کے ایام میں خون بکثرت آئے تو

اس کو مینوریجیا یعنی کثرت حیض کہتے ہیں - گویا مینوریجیا میں ادراار خون عموماً وقت مقررہ پر ہوتا ہے - البتہ بعض وقت ذرا جلد ہو جاتا ہے اور دیر تک رہتا ہے لیکن استحضار میں ادراار خون بلا وقت ہوتا ہے یا یوں

سمجھنا چاہیے کہ دو حیضوں کے درمیان جو خون آتا ہے وہ استحاضہ ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریضہ کو کسی ہوادار کمرہ میں آرام سے لٹائے رکھیں، چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے سے مریضہ کو روکیں۔ خیالات پاکیزہ رکھیں۔ گرم پانی میں پھٹکری ڈال کر اندام نہانی نہ کریں۔ ترشی، بادبانی اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ سبب دانه، دودھ، مونگ کی کھچڑی، پالک، خرفہ، ترٹی، نوکی اور شلجم وغیرہ کی ترکاری کھائیں۔ آلو، بیگن، گوہی، کھل، اروی اور ہر قسم کے گوشت سے پرہیز ضروری ہے۔

علاج :- اگر خون حیض چکدار سرخ ہو، زیر ناف درد ہوتا ہو جس کے ہمراہ متلی بھی ہو تو اپیکاک دوا ہے۔ اگر خون حیض شرمگاہ سے لے کر اڑی تک مثل دھار کے چلے تو بھی اپیکاک ہی دوا ہے۔

(۲) اگر حیض مقررہ ایام سے کئی روز قبل شروع ہو جائے حیض بکثرت ہو اور زیادہ عرصہ تک جاری رہے۔ پیرنم رہتے ہوں۔ زینہ چڑھنے میں مریضہ کو تنفس اور چکر کی شکایت ہو جاتی ہو تو کلکیر یا کارب دینا چاہیے۔ بچہ کو دودھ پلانے کے زمانے میں حیض کا کثرت سے آنا بھی اس دوا کے زیر اثر آتا ہے۔

(۳) پرشہوت لمبی، گوری اور نازک مستورات کو حیض کثیر ہو جس کے

باعث انتہائی کمزوری، تکان اور نقاہت ہو جائے۔ کمر اور پیٹ میں درد ہو۔

خون زردی مائل ہو تو فاسفورس دینا چاہیے۔ دودھ پلانے والی مستورات کے لیے یہ بہت موزوں دوا ہے۔

(۴) حیض بکثرت درد کے ساتھ اور بار بار ہوتے ہوں۔ خون حیض مقدار میں زیادہ اور سیاہ رنگ کا ہو تو پلاٹنا دیں۔ لیکن اگر حیض مقدار میں زیادہ نہیں ہے بلکہ زیادہ عرصہ تک قائم رہے تو عموماً اپیکاک یا اگنیشیا دوا ہوتی ہے۔

(۵) بار بار حیض اور زیادہ دنوں تک رہے۔ مریضہ مغموم رہتی ہو۔ سرد آہیں بھرے، قبض رہتا ہو۔ بوقت پاخانہ کا سچ نکل آتی ہو۔ خون سیاہ، متعفن اور منجمد ہو جو درد سے آتا ہو تو اگنیشیا مفید ہے۔

(۶) رحم سے بڑے پھپھرے منجمد خون کے نکلیں اس کے بعد مٹیا لے خون کا اخراج کثرت کے ساتھ ہو۔ لیکوریا کی شکایت ہو، رحمی کمزوری پائی جائے تو الطرس فارسی نو سادہ رٹنکچر یا سچ قطرہ فی خوراک دن میں چار بار دیں۔

(۷) اگر خون سیاہ رنگ کا ہو۔ رات کو کمی ہو جاتی ہو دن کو پھر بدستور کثرت کے ساتھ خارج ہوتا ہو۔ رحم کی شریان کمزور ہو گئی ہوں۔ شکم میں پھوڑے کا سادہ ہو، شرمگاہ میں ذکی احساس ہو تو ہامیلٹن دوا ہے۔

(۸) سن یاس کے زمانہ میں خون کا زیادہ مقدار میں آنا۔ خون سیاہ منجمد یا تار دار ہو۔ ذرا سی تحریک سے خون آنے لگتا ہے تو اسٹی لیگو دینا چاہیے۔ رحم سے خون جاری ہونے کی فرس شکایت میں اس دوا کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔ مندرجہ صدر علامات پر اگر اسٹی لیگو کام نہ کرے تو لکیسیس دیں۔ چاند پر جلن کا ہونا لکیسیس کے حلقہ اثر میں آتا ہے۔

(۹) پایوکیماک میں کثرت حیض کے لیے کلکیر یا فلور بہت عمدہ دوا ہے۔

(۱۰) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ سائنا۔ بیلا ڈونا۔ سیکیل۔ مرک۔

ونکا مائٹز - نکس و امیکا - ٹریلیم - سلفر - چائنا اور سیپیا وغیرہ کی طرف
بھی توجہ کریں اور حسب علامت دیں -

اشارات

ا - خون حیض کی لگاتار دھار - سخت کمزوری - ونکا مائٹز -

ب - قلب کی شکایات کے ساتھ - ڈیجیٹلیس -

ج - چوٹ سے - آرنیکا -

د - دق کی مستورات میں - فاسفورس - شامہ سیننی شو - کالی کارب -

کلکیریا -

س - حیض جلد جلد مقدار میں زیادہ اور ہر بار درد سر اور بخار -

روڈوڈنڈرن -

س - سن یاس کے زمانہ میں - اسٹی لیکو - لیکسیس - سبائنا -

سیکیل - نکس و امیکا -

ص - دُہلی پتلی عورتوں میں - سیکیل - فاسفورس -

ط - لیٹنے سے زیادتی ہو - کریا زوٹ -



درد کے ساتھ حیض آنا

DYSMENORRHOEA

اسباب :- رحم میں درم کا ہونا ، رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا ٹیڑھا ہو جانا ۔ رحم میں خراش کا ہونا ۔ وضع حمل کے بعد رحم کا اپنی جگہ پر واپس نہ آنا ۔ رحم کے اعصاب کا ذکی احس ہونا ۔ سردی لگنا ۔ اور کثرت مباشرت وغیرہ ۔

علامات :- حیض آنے سے دو چار روز پہلے پیڑو اور کمر میں درد ہوتا ہے ۔ سر میں درد ہو جاتا ہے ۔ اور طبیعت کسلند اور متوحش رہتی ہے ۔ حیض مقدار میں کم ہوتا ہے اور نہایت تکلیف سے خارج ہوتا ہے ۔ بعض وقت اس شدت کا درد ہوتا ہے کہ مریضہ کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے ۔ پرہیز و ہدایات :- مریضہ کو آرام سے ہوا دار کمرہ میں لٹائے رکھیں نقل و حرکت نہ کرنے دیں ۔ پیڑو کے مقام پر سینک کریں ۔ اگر رحم ہٹ جانے سے حیض درد سے آتا ہو تو کسی ہوشیار دالی یا لیڈی ڈاکٹر سے اس کو اصل جگہ پر لے آئیں ۔ مباشرت کے لیے اعتدال سے کام لیں ۔ قبض نہ رہنے دیں ۔ کھٹائی ، مرچ ، تیل اور بادی و ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں ۔

علاج :- (۱) حیض کی بے قاعدگی اور حیض درد کے ساتھ ہونے میں اشوکا مدھنچرہ سے ۱۵ قطرہ فی خوراک دن میں دو یا تین بار دینا بہت مفید ہے

لیکوریا کی حالت میں یہ دوا اور بھی عمدہ کام کرتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اشوکا فیل ہو جائے تو ابرو ماگٹا مدرٹکچر مندرجہ صدر مقدار خوراک کے حساب سے دینا کافی ہوا کرتا ہے۔ ابرو ماہر قسم کی رحمی بے قاعدگیوں کو بہت جلد درست کر دیتا ہے۔

(۲) حیض سیاہ اور گاڑھا یا منجمد ہو جو ٹھہر ٹھہر کر آوے۔ درد شدید ہو پیٹرو میں، پیٹھ اور رانوں میں اینٹھن معلوم ہوتی ہو، پیاس نہ ہو۔ مریضہ کو کھلی اور ٹھنڈی ہوا اچھی معلوم ہوتی ہو تو پلسا ٹیلا دینا چاہیے۔ پلسا ٹیلا دوا ان مستورات کے لیے خصوصیت سے کام آتی ہے جو منکسر المزاج ہوں اور بات بات پر رو دیتی ہوں۔

(۳) اگر تشخیصی قسم کا درد ہوتا ہو، مریضہ درد سے چبھتی ہو۔ درد زہ کا سا درد مسلسل ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہو (خاص کر حیض کے ایام میں) حیض مقدار میں کم ہو تو کالوفائلیم دیں۔ اس کے فیل ہو جانے کے بعد جلیسم دینا چاہیے۔ پیشاب زرد رنگ کا زیادہ مقدار میں ہونا جلیسم کا خاص نشان ہے۔

(۴) حیض رکا ہوا یا قلیل (عموماً اعصابی یا گٹھیادی مزاج کی مستورات ہیں) رحم کے مقام میں تیز درد جو ایک جانب سے دوسری جانب جائے۔ درد نہایت سخت مثل وضع حمل کے ہو بعض وقت مریضہ کو جھک کر دوسرا ہو جانا پڑتا ہو۔ کمزوری زیادہ ہو جاتی ہو۔ خون کے منجمد لوٹھڑے خارج ہوتے ہوں تو سمی سی نوکا دینا چاہیے۔ مریضہ کے بائیں پستان میں درد پایا جانا بھی اس دوا کی خاص علامتوں میں سے ہے۔

(۵) جن عورتوں میں خون کی کمی ہو، حیض کم ہوتا ہو یا قطعی رک گیا ہو، پیشاب درد سے ہوتا ہو یا خون آمیز ہو تو سینٹی شو X ۱ بہترین کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے حیض کی تکلیف دور ہی نہیں ہو جاتی بلکہ عورت موٹی تازی ہو جاتی ہے۔ گویا یہ سبز بھس والی مستورات میں ٹانگ کا کام کرتی ہے۔

(۶) دوران حیض میں جانکنی کا سا درد ہو جس سے مریضہ پاگل سی ہو جاتی ہو، حیض یا تو کم گاڑھا اور سیاہ ہوتا ہو یا جلد جلد مقدار میں زیادہ۔ یا حیض دب جائے اور سیلان الرحم شروع ہو جائے۔ اعضاء مستورات میں جن کو دوران حیض میں ناقابل برداشت درد ہو جو ٹانگوں کے نیچے تک جائے گویا اعضا مفلوج ہو گئے ہیں تو زنتھا کسا لکم دینا چاہیے۔ یہ دوا نازک اندام، عیش پسند، دُلی پتلی اور ہسٹریکل مستورات میں بہت عمدہ کام کرتی ہے۔

(۷) اگر دوا ہنسنے میں ورم ہو۔ حیض قلیل مقدار میں درد کے ساتھ ہوتا ہو، درد کی نوعیت جلندار اور ڈنک مارنے کی سی ہو۔ پیشاب بھی مقدار میں کم ہوتا ہو۔ رحم میں بوجھ معلوم ہوتا ہو تو ایس دوا ہے۔

(۸) با یو کیمک میں گنیشیا فاس نہایت مجرب دوا ہے۔ اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو کالی فاس کے ساتھ باری باری دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ بیلا ڈونا۔ نکس و امیکا۔ امونیا کارب۔ ارنٹھم مٹ۔ اسارم۔ ورٹیرم۔ کاسٹم۔ کوکولس۔ کافیا۔ اگنیشیا۔ کیو پرم۔ کیو ملا۔ سیکیل اور ہیلو نائس کی طرف توجہ کریں۔ یہ تمام ادویہ

نہایت عجیب و غریب اور اس مرض میں بہت ضروری ہیں۔

اشارات

- ا۔ پاؤں بھیگ جانے سے حیض درد سے ہو۔ پلسا ٹیلا۔ رٹاکس۔
- ب۔ سن یاس میں۔ سورنیم۔
- ج۔ بار بار پاخانہ یا پیشاب کی حاجت حیض جلد مقدار میں زیادہ اور سیاہ گاڑھا۔ نکس و امیکا۔
- د۔ نیچے دبانے والا درد۔ چہرہ میں تتماہٹ۔ خون نہایت سرخ چمکدار، درد ٹھہر ٹھہر کر اٹھے۔ بیلا ڈونا۔
- س۔ خون گاڑھا سیاہ، غم سے حیض رک جائے۔ مریضہ سرد آہیں بھرے۔ اگنیشیا۔
- س۔ بانجھ عورتوں میں پستان میں درد اور سختی کے ساتھ۔ فائی ٹولا کا۔
- ص۔ حیض قلیل، گندے پانی کی مانند۔ پیشاب میں تعفن۔ ڈکاروں کی کثرت۔ نائٹرک ایسڈ۔

خارش شرمگاہ

VULVAR PRURITIS

اسباب :- کثافت، غلاظت، ورم اندام نہانی، ایام حمل،

سیلان رحم، خون حیض کی ابتری، مرض بواسیر یا آنتوں میں کیڑے اور
چرنے وغیرہ۔ بعض اوقات اس کا کوئی خاص سبب سمجھ میں نہیں آتا۔

علامات :- شرمگاہ میں سخت خارش ہوتی ہے۔ بعض وقت
زیادہ کھجلانے سے لبھائے فرج متورم ہو جاتے ہیں یا جلد پھل جاتی ہے۔
ذکی الحسی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ذرا سا کپڑا چھو جانے سے جان پر
بن آتی ہے۔ ایام حمل میں جب کھجلی کی شکایت ہو جاتی ہے تو بسا اوقات
پورے نوچینے تک کم دبیش قائم رہتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- اندام نہانی کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے
بورک ایسڈ یا صرف صابن اور گرم پانی سے چائے ماؤفہ کو دھو ڈالیں
اور خارجی طور پر بورکس ایک حصہ اور گلیسرین ۸ حصہ ملا کر لگائیں۔ ترشی
اور بادی اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ قبض ہرگز نہ رہنے دیں۔
جماع سے پرہیز رکھیں۔

علاج :- (۱) اگر کھجلی بہت زیادہ ہوتی ہو جس کی وجہ سے خواہش
جماع بہت بڑھ جائے جو بعض وقت دیوانگی کی حد تک پہنچ جائے،
مریضہ دوسروں کو اپنے سینہ سے لگانا چاہے تو پلاٹنا بہت مفید دوا
ہے، اس کی مریضہ عموماً سوتے وقت اپنے آپ کو برہمنہ کر لیتی ہے جو
اس کا ایک رہنما کن نشان ہے۔

(۲) شرمگاہ کی کھجلی، خواہش نفسانی کا بڑھ جانا، خارش خواہ
ایام حمل میں ہو یا اس کے علاوہ ہو تو کیلیڈیم بہت مفید ہے۔ واقعی

یہ دوا اکثر و بیشتر حالات میں حیرت انگیز نفع دکھاتی ہے۔ بعضوں نے اس کو شرمگاہ کی خارش میں مجرب لکھا ہے۔ کیڑوں کے باعث اگر کھجلی ہوتی ہو جس سے مریضہ مُشت زنی پر اُتر آئے، تب بھی اس دوا کو فراموش نہ کرنا چاہیے۔

(۳) کھجلی جس سے لہہائے فرج متورم ہو جائیں۔ خواہش نفسانی بڑھ جائے۔ بیرونی حصہ پر خارش خصوصیت سے ہوتی ہو یا پیشاب کے وقت مثانہ نیز اندام نہانی میں خارش ہونے لگتی ہو تو امبرا دیں۔

(۴) لہہائے فرج میں دانے اور کھجلی۔ مریضہ کو سیلان الرحم کی بھی شکایت ہو۔ جسم کے دیگر حصص پر داد کے سے داغ پڑ گئے ہوں تو سپیا دینا چاہیے۔

(۵) اگر فرج میں خشکی ہو، لیکوریا (سیلان الرحم) سوزشی قسم کا ہو جس سے خارش پیدا ہو جائے۔ جماع سے نفرت ہو تو نیٹرم میور دیں۔ اگر خارش کے ساتھ شرمگاہ کے بال بھی گرتے جاتے ہوں تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۶) شرمگاہ میں خارش اور لہہائے فرج پر درم اور شدید خارش رانوں اور لہہائے فرج کے درمیان بھی خارش ہو۔ مریضہ لہہائے فرج کو ہر وقت ہاتھوں سے ملتی رہے کھجلی کے بعد مقام ماؤفہ پر صلب ہونے لگے تو کرپازوٹ دوا ہے۔ اگر جماع کے بعد آلات زنا نہ سے خون آجاتا ہو تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۷) نثر نگاہ میں شدید خارش اور ورم، خواہش جماع زیادہ ہو، کھجلا نے کے بعد جلن ہو تو کینتھرس، کو نیم، مرک میں سے کوئی دوا دیں۔ یہ تینوں دوائیں اپنے فعل میں عجیب و غریب اور بہت کچھ مشابہ ہیں۔

(۸) باپو کیمک میں نیٹرم میور اس مرض کی عمدہ دوا ہے۔ فرج میں ورم ہونے کی حالت میں فیرم فاس دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ لائیکو سلفر۔ کولین سونیا۔ ارٹیکا یورنس۔ ٹیرنٹولا۔ نائٹرک ایسڈ۔ رسٹاکس۔ کاسٹم اور امونیا کارب کی طرف توجہ کریں اور حسب علامت دیں۔

اشارات

- ۱۔ پیشاب کے لگ جانے سے خارش میں زیادتی ہو۔ مرک۔
- ب۔ چلنے سے زیادتی ہو۔ نائٹرک ایسڈ۔
- ج۔ حمل کے دوران۔ امبرا۔ سیپیا۔ کلکیریا۔ مرک۔
- ہیلونائٹس۔ کیلیڈیم۔
- د۔ حیض کے قبل۔ گریفائٹس۔ سلفر۔ مرک۔
- س۔ سیلان الرحم سے۔ سلفر۔ سیپیا۔ کریازوٹ۔ کلکیریا۔
- نائٹرک ایسڈ۔ کولین سونیا۔ مرک۔
- س۔ جماع کے بعد۔ نائٹرک ایسڈ۔
- ص۔ شہوانی خارش۔ اوری جنم۔ پلاٹنا کیلیڈیم۔ کینتھرس۔

کونیم - مرک - اسبرا -

تنگلیفات دوران حمل

AILMENTS DURING PREGNANCY

حمل کے ایام میں متلی، قبض، بد ہضمی، درد سر، اور معدہ کی اکثر شکایات ہو جایا کرتی ہیں۔ کبھی دانت میں درد ہو جایا کرتا ہے اور کبھی سینہ کی علامات رونما ہو جاتی ہیں۔ معمولی حالت میں علاج کی چنداں ضرورت نہیں لیکن جب تکلیف زیادہ ہو تو علاج کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- حاملہ ستورات کو حفظانِ صحت کے اصولوں پر کار بند رہنا چاہیے۔ قابض، گرم اور نفاخ اشیاء سے پرہیز کریں۔ زود ہضم ہلکی اور لطیف اشیاء کے استعمال کو جائز رکھیں۔ دوران حمل میں کودنا پھانڈنا، وزنی بوجھ اٹھانا، زیادہ دماغی کام کرنا ممنوع ہے۔

علاج :- (۱) متلی ادرتے کے لیے سب سے پہلے اپیکاک دیں۔ بشرطیکہ ادبکائی اُس وقت آتی ہو جب معدہ بالکل خالی ہو۔

(۲) اگر کھانے کے بعد ادبکائی اور متلی ہوتی ہو۔ مریضہ منکسر المزاج اور ٹھنڈی دکھلی ہوا کی دلدادہ ہو تو پلسا ٹیلا دوا ہے۔ بھوک کا نہ لگنا اور ڈکاروں کا آنا بھی اس کے حلقہ اثر میں آتا ہے۔

(۳) کھانے کی بو سے حاملہ کو نفرت ہو جس کی وجہ سے متلی ادرتے

ہو جائے تو سمفوریکارپس نمبر ۲۰۰ کی صرف ایک خوراک کافی ہوا کرتی ہے لیکن بعض ڈاکٹروں نے اس کی $\times$ طاقت کو حمل کی متلی اور قے میں بے حد مجرب بتایا ہے۔

(۴) قبض اور صبح کی متلی کے لیے نکس و امیکا اور انا کارڈیم میں سے کوئی دوا دینا چاہیے۔ بشرطیکہ صرف کھاتے وقت تو تکلیف رفع ہو جاتی ہو مگر اس کے بعد پھر تکلیف جوں کی توں عود کر آتی ہو۔

(۵) اگر جنین کی حرکت بہت زیادہ ہوتی ہو تو اوپیم نمبر ۲۰۰ کی صرف ایک خوراک کافی ہوا کرتی ہے۔

(۶) دوران حمل میں متلی کے لیے سلفر۔ سیپیا اور اسپیکاک چوٹی پر کی دوائیں ہیں۔ حسب علامت دیں۔

(۷) حاملہ کے دانت میں درد کا ہو جانا (نیزدیکھو درد دانت) سیپیا سب سے عمدہ دوا ہے اس کے بعد کیمو ملا۔ پلسا ٹیلا اور گلکیریا کارب کی طرف توجہ کریں۔

(۸) ٹانگوں میں اینٹھن کے لیے کالوسنتھ ہیپوسمس۔ گلکیریا کارب۔ کیمو ملا۔ نکس و امیکا۔ آرنیکا اور ورٹیرم۔

(۹) دوران حمل قبض کے لیے برائی ادنیا اور سیپیا دونوں عمدہ دوائیں ہیں۔ اگر یہ دوائیں فیل ہو جائیں تو پھر لائیکو، الیومنا اور سلفر میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔

(۱۰) حمل کے ایام میں پیشاب رک جانے میں پلسا ٹیلا، اکونائٹ

یا نکس و امیکا دیں۔

(۱۱) اگر حاملہ کو از خود پیشاب ہو جاتا ہو تو پہلے پلسا ٹیلا اور پیا دیں

اس کے بعد کاسٹکم اور نیٹرم میور۔

(۱۲) اگر حاملہ کو تھوک بکثرت آتا ہو تو نیٹرم میور مفید ہے۔

(۱۳) حاملہ مستورات کے دستوں کے لیے کیمولایا پلسا ٹیلا دیں۔

(نیز دیکھو دست)۔

(۱۴) باپو کیمیک میں کھٹی، غیر منہضم یا جھاگ دار پانی کی تے میں

نیٹرم میور اور کالی میور دیں۔ تمام اعضا میں تھکاوٹ۔ کلکیر یا فاس۔

بطور ٹانگ کالی فاس دیں۔ صبح کی متلی یا غیر منہضم غذا کی تے فیرم فاس۔

نوٹ:- حاملہ مستورات کو ایس۔ نیچی طاقت میں یا نوزوڈ وغیرہ (بیماریوں کے

زہر سے تیار کردہ دوا) کے دینے سے احتراز کریں کیونکہ بعض وقت ایسی ادویہ سے

اسقاط کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ نیٹرم میور کی ادنیٰ طاقتیں بھی بعض وقت نقصان پہنچاتی ہیں

حاملہ مستورات کو باپو کیمیک ادویہ کی دو خوراک روزانہ

حفظ ما تقدم

حسب ذیل طریقہ سے دینا بہت مفید ہے۔ ایک روز

صبح کے وقت کلکیر یا فلور کی ایک خوراک اور شام کو کلکیر یا فاس کی ایک

خوراک دیں پھر دوسرے دن صبح کے وقت کالی فاس اور شام کے وقت

گنیشیا فاس دیں اور اسی صورت سے پورے نو مہینے تک یہ ادویہ استعمال

کراتے رہیں تو دوران حمل میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ اور بچہ بھی

نہایت تندرست اور توانا پیدا ہوتا ہے۔ یہ نسخہ نہایت مجرب اور

مستند ہے۔ امریکہ کے بعض ڈاکٹروں نے ان ادویہ کو PREGNANCY COURSE کے نام سے تحریر کیا ہے۔

وضع حمل

LABOUR

جس وقت دردزہ شروع ہوں تو مریضہ کو قدرت کے فعل پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دردزہ شروع ہونے کے دو گھنٹہ سے لے کر آٹھ گھنٹہ تک ولادت کا انتظار کرنا چاہیے۔ بعض وقت دردزہ کا زب (جھوٹے دردزہ) کو سچا دردزہ سمجھ کر نا تجربہ کار دائیاں بچہ جنانے کی فکر کرنے لگتی ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی عملی کارروائیاں کرنے لگتی ہیں جو زچہ اور بچہ دونوں کیلئے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے کہ نادان دائیاں درد شروع ہوتے ہی زچہ کو بیٹھنے اور کانکھنے کی تاکید کرتی ہیں جو سخت غلطی ہے۔ ایسا کرنے سے زچہ آئندہ زور لگانے کے قابل نہیں رہتی اور رحم کی تھیلی قبل از وقت پھٹ کر ولادت میں تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ بسا اوقات صرف تھوڑی دیر تک دردزہ ہونے کے بعد لوگ زچہ کو کھانے کی ادویہ دینا شروع کر دیتے ہیں ایسا نہ کرنا چاہیے بلکہ اگر ولادت میں غیر معمولی دیر ہو رہی ہو یا کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہوں تو علاج کی طرف ضرور توجہ کرنا چاہیے۔

وضع حمل کے بعد زچہ کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں۔ کمرہ نہایت

صاف اور ستھرا ہونا چاہیے زچہ اور بچہ کی صفائی بہت ضروری ہے۔
 زچہ کو سردی سے بچانا چاہیے۔ اور ولادت کے بعد کم از کم ایک ہفتہ تک
 زچہ کو بستر سے نہ اٹھنا چاہیے ورنہ رحم سے جریان خون شروع ہونے کا
 احتمال رہتا ہے۔ پہلے ہفتہ میں زچہ کے بدن کو آب گرم میں تولیا بھگو کر اس سے
 صاف کر دینا چاہیے اس کے بعد قریب دو ہفتہ تک گرم پانی سے غسل
 دینا مناسب ہوا کرتا ہے۔ سرد پانی سے زچہ کو ہرگز نہیں نہلانا چاہیے۔
 بچہ پیدا ہونے کے چھ سات گھنٹے کے بعد تک اگر زچہ کو پیشاب نہ ہو تو
 پیڑ اور اندام نہانی پر سینک کرنا چاہیے۔ زچہ کو غذا نہایت ہلکی اور لطیف
 دیں۔ دودھ، سا بودا نہ یا کھچڑی (تین حصہ دال مونگ اور ایک حصہ چاول)
 دیں۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے کو نہ دیں۔ نیز نفاخ اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کرائیں۔

(۱) دروزہ کاذب یعنی جھوٹا دردزہ جو عموماً ولادت کے ایک
دردزہ ہفتہ قبل ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے کالوفائلم بڑی عمدہ دوا
 ہے۔ علاوہ ازیں ناکانی دردزہ جو بچے نہ آتے ہوں اور بچہ باہر نہ آتا ہو تو
 یہ دوا اکسیر کا کام کرتی ہے۔

(۲) دردزہ سے قبل اگر کالوفائلم یا سمی سی فوگا کا استعمال کر دیا جائے
 تو عموماً ولادت میں بہت آسانی ہو جایا کرتی ہے۔

(۳) اگر دردنا قابل برداشت ہوں جن سے مریضہ اپنی زندگی سے
 مایوس ہو جائے یا وضع حمل کے درد رک جائیں اور مریضہ بکواس کرے تو
 کافی دوا ہے۔

(۴) ولادت کے دوران میں اگر درد رک جائیں تو پلسا ٹیلا اور سکیل نہایت مفید ہیں یا اگر رحم کا منہ کشادہ ہونے میں سُستی پائی جائے جس کے باعث ولادت میں دیر ہو رہی ہو اور ناقابل برداشت درد ہو رہے ہوں تو یہ دونوں دوائیں حیرت انگیز کام کرتی ہیں۔ اکثر اوقات پلسا ٹیلا کی ادویچی طاقتیں ایسی حالت میں جلد از جلد دہرانے سے بچہ جلد پیدا ہو جاتا ہے۔

(۵) تشنجی درد جو یکایک آئیں اور غائب ہو جائیں، درد نہایت شدید ہوں تو بیلٹا ڈونا دوا ہے۔ لیکن اگر بہت ہی شدید اور بہت تیز ہوتے ہوتے ہوں تو کافی یا کیمو ملا دینا چاہیے۔ اگر تشنجی دروں کے ساتھ ساتھ مریضہ کو بار بار پاخانہ پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو نکس و امیکا دیں۔ اگر درد بے قاعدہ ہو رہے ہوں تو یہ دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۶) جب درد یک دم سے بند ہو جائے اور خون کا غلبہ سر کی طرف ہو اور بستر گرم معلوم ہو تو ادو پیم دینا چاہیے۔

(۷) اگر پٹ میں بچہ مر گیا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے پلسا ٹیلا یا سکیل مجرب ادویہ ہیں۔

(۸) با یو کیمل میں کالی فاس اور گنیشیا فاس بوقت درد زہ دینے سے ولادت میں آسانی ہو جاتی ہے۔

نوٹ:- ولادت کے ایک یا دو ماہ قبل کالی فاس کا استعمال کرنے سے زچہ اور بچہ دونوں کو تقویت پہونچتی ہے۔ اور ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔

آنول کا نہ کرنا | وضع حمل کے پندرہ بیس منٹ بعد عموماً آنول گرہا یا کرتی ہے لیکن نصف گھنٹہ تک اگر خارج نہ ہو تو دایہ کو چاہیے کہ زچہ کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ کر نیچے کودائے تاکہ آنول رحم سے بچر کر باہر نکل جائے ذیل کی ادویہ آنول کو گرانے میں مجرب ہیں۔

(۱) اگر آنول رک گئی ہو تو پلسا ٹیلا کی چند خوراکیں کافی ہوا کرتی ہیں دس دس منٹ کے بعد دہرانا چاہیے۔ اگر پلسا ٹیلا نا کام رہے تو کالوفائلم کی دو خوراکیں دس دس منٹ کے وقفہ سے دے کر نتیجہ کا انتظار کریں۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو سیکیل دیں۔ آنول رک جانے کی حالت میں عموماً سیکیل دیا کرتا ہوں مجھے ہمیشہ کامیابی ہوئی۔

(۲) با یو کیمک میں کالی فاس آنول کو خارج کرنے کی عمدہ دوا ہے۔

(۳) آنول رک جانے میں حسب موقع سبائٹا۔ پلاٹنا۔ سیپیا اور

بیلڈ ڈونا کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔

درد ما بعد | (۱) بچہ پیدا ہونے کے بعد جو درد ہوا کرتے ہیں۔ ان کے لیے عموماً آرنیکا نمبر ۲۰۰ کی ایک خوراک کافی ہوا کرتی ہے۔

شاذ و نادر دوسری دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ آرنیکا دینے سے رحم ٹسکڑنے لگتا ہے اور اپنی اصلی حالت پر آجاتا ہے۔ آرنیکا فیل ہونے پر پلسا ٹیلا دیں۔

(۲) اگر درد ما بعد قطعاً نہ ہوتے ہوں (کم و بیش درد کا ہونا ضروری ہے)

اور رحم ٹسکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہ آتا ہو تو پلسا ٹیلا یا سیکیل دیں لیکن اگر یہ دوائیں ولادت کے وقت استعمال کرائی جا چکی ہیں تو ادویم دیں۔

(۳) اگر ولادت کے بعد درد نہایت شدید اور ناقابل برداشت ہوں تو کالوفائلٹم - کیموٹلا - سمی سی فوگا اور زنتھا کسٹلم میں سے کوئی دوا دیں -
 (۴) باپو کیمیک میں فیرم فاس ولادت کے مابعد درودوں کے لیے اکیر ہے -

نفاس وضع حمل کے بعد جو خون آیا کرتا ہے اُسے نفاس کہتے ہیں -
 نفاس پہلے دن تو بہت سرخ ہوتا ہے لیکن دوسرے دن سے حصض کی مانند ہو جاتا ہے - ہفتہ عشرہ کے بعد زردی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سفیدی مائل رطوبت نکلتی ہے بعض حالات میں نفاس مقدار میں بہت ہو جاتا ہے بعض وقت رحم میں خون کے منجمد ٹکڑے پھنس جانے سے نفاس رک جاتا ہے جس کے سبب سے پرسوت کا بخار ہو جاتا ہے - ایسی حالت میں پیڑو - اور اندام نہانی کی سینک کریں اور حسب ذیل دوائیں دیں -
 (۱) اگر نفاس ناکافی ہو یا بالکل رک گیا ہو تو پلسا ٹیلا بہت مفید اور چوٹی پر کی دوا ہے -

(۲) نفاس رک جانے میں سکیل - اکونائٹ اور برائی اونیابھی بہت مفید ادویہ ہیں حسب علامت استعمال کرائیں -

(۳) اگر نفاس مقدار میں زیادہ آتا ہو تو پلاٹنا - چائٹنا - اپیکاک اور سائٹنا دیں -

(۴) اگر نفاس میں مواد بھی شامل ہو تو مرک - سیپیا - چائٹنا اور کلیر پاکارب بہترین دوائیں ہیں -

نوٹ:- اگر زچہ بہت کمزور ہوگئی ہو تو چائنا شبر ۲۰۰ کی ایک خوراک دیدینے سے زچہ میں نمایاں طور پر تبدیلی ہو جاتی ہے بعض حالات میں کالی کارب سے بھی یہی نفع پہونچتا ہے۔

دودھ کا بخار | بچہ پیدا ہونے کے عموماً دوسرے یا تیسرے روز دودھ اُترنے سے زچہ کو بخار آ جاتا ہے جسے دودھ کا بخار کہتے ہیں۔ جب چھاتیوں سے دودھ نکل جاتا ہے تو یہ بخار خود بخود رفع ہو جاتا کرتا ہے۔ لیکن اگر پستان میں تناؤ زیادہ ہو، یا کسی وجہ سے بچہ نہ پی سکے اور تکلیف زیادہ ہوتی جائے تو بذریعہ بوتل یا دودھ کھینچنے کے آلے سے (برسٹ پلیس) دودھ کو خارج کرویں۔ اور ذیل کی ادویہ کام میں لائیں۔

(۱) دودھ کے بخار کے لیے سب سے عمدہ دوا بیلادونا ہے۔ بخار پستانوں میں سرخی اور تنگی کا ہونا اور ٹھہر ٹھہر کر ٹیس کا اٹھنا اس دوا کی مخصوص علامتیں ہیں۔

(۲) اگر کسی وجہ سے بیلادونا فیل ہو جائے تو برائی اونیہ کی چند خوراکیں جلد جلد دہرانے سے چھاتیوں کا تناؤ بھی کم ہو جاتا ہے اور بخار دُور ہو جاتا ہے۔

(۳) شدید بخار کی حالت میں جبکہ مریضہ کو موت کا خوف ہو تو اکونائٹ دیں۔

(۴) باپو کیمک میں فیرم فاس بہت عمدہ دوا ہے۔

پستان کی تکلیفات | بعض وقت سینہ میں دودھ جم جاتا ہے یا چوٹ لگ جانے سے ورمی کیفیت ہو جاتی ہے

جس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات سینہ پک جاتا ہے اور ان میں نشتر دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کبھی سرپستان کو صاف نہ رکھنے اور دودھ پلانے سے ان میں شگاف ہو جاتے ہیں اور ان میں دکھن ہوتی ہے۔ کبھی ان میں ذکی الحسی حد درجہ بڑھ جاتی ہے۔

نوٹ:- بائیں سینہ میں درم کے باعث اگر پھوڑا بن جائے تو وہ قلب کے پاس ہونے کی وجہ سے تشویش ناک ہوا کرتا ہے اور بعض حالات میں مملک ثابت ہوتا ہے۔

ابتداء میں اگر چھاتیوں میں دودھ جمع ہو کر تناؤ پیدا کر دے اور جس سے درمی کیفیت پیدا ہونے والی ہو تو برسیٹ پیپ یعنی آلہ سے دودھ خارج کر دیں یا نیگرم پانی میں نمک ڈال کر ماؤفہ پستان پر دھاریں۔ سرپستان میں زخم یا خراش وغیرہ ہو جانے کی حالت میں پہلے اس کو دو ایک بار روزانہ پانی سے دھوئیں، مواد پڑ جانے کی حالت میں، بچہ کو اپنا دودھ ہرگز نہ پلائیں۔ بلکہ فائٹولا کا مدرٹیکر گلیسرین میں ملا کر مقام ماؤفہ پر دن میں تین چار بار لگائیں۔ اور ذیل کی ادویہ حسب علامت کھانے کو دیں۔

علاج:- (۱) چوٹ لگ جانے سے سینہ میں درد ہو یا سرپستان چھل گئے ہوں تو آرنیکا مفید ہے۔

(۲) اگر دودھ جم گیا ہو یا کسی وجہ سے پستان میں درم اور درد ہو تو بیلا ڈونا دیں۔ اگر بیلا ڈونا کام نہ کرے تو برائی ادویہ دیں۔

(۳) اگر دودھ گاڑھا ہو گیا ہو یا جم گیا ہو، سرپستان میں شگاف

ہو گیا ہو یا اُن میں چھوٹے چھوٹے زخم ہو گئے ہوں تو فائٹولا کا اکیر ہے۔
اسی کو خارجی طور پر بھی لگائیں۔

(۴) اگر پستان بہت سخت ہو گئے ہوں تو کاربو انیملس، کونیم اور

فائٹولا کا عمدہ دوائیں ہیں۔

(۵) اگر پستان پکنے کی طرف مائل ہو، درد شدید ہو تو کھکیر یا کارب

دیں۔ لیکن پستان پھوڑے کی شکل اختیار کر چکا ہو تو ہیسپر سلفر دیں تاکہ یا تو

پھوڑا تحلیل ہو جائے یا پاک کر صاف ہو جائے۔

(۶) اگر زہر باد کی سی کیفیت ہو گئی ہو اور ڈنک لگنے کا سادرد ہوتا ہو

بخارتیز ہو تو وائپس دوا ہے۔

(۷) پستان میں اگر ناسور ہو گیا ہو یا پستان کے اندر سخت گومڑ اور

گٹھیاں پائی جائیں تو سلیشیا دیں۔

(۸) پستان میں ناسور یا بد گوشت ہو گیا ہو تو سارسا پرلیا مفید ہے۔

(۹) اگر دودھ بالکل خشک ہو گیا ہو یا دودھ کم ہو گیا ہو تو انگنس۔

سیکیل اور فائٹولا کا اہم ترین دوائیں ہیں۔

(۱۰) اگر دودھ سوکھا نا منظور ہو تو لیک لنیم دیں۔

زچہ خانہ کا بخار

(پوسٹ کا بخار)

PUERPERAL FEVER

اسباب :- یہ ایک متعدی بخار ہے جو زچہ کے خون میں مادہ تعفن کے سرايت کر جانے سے ہوتا ہے۔ ولادت کے بعد آنول یا نفاس کا اچھی طرح سے اخراج نہ ہونا، رحم میں خون کے لوتھڑوں کا رہ کر متعفن ہو جانا، زچہ و زچہ خانہ کی گندگی، دایہ کے ہاتھ و اوزار کا گندہ ہونا۔ اور زہر باد و غیرہ کی سمیت وغیرہ۔

نوٹ :- پچھاتیوں میں دودھ اُترنے کی حالت میں بھی بخار آجایا کرتا ہے۔ جو دو ایک روز میں خود بخود رفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بخار ٹھہر جائے اور دیگر علامات رونما ہونے لگیں تو سمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

علامات :- زچہ کو لرزے سے بخار چڑھ آتا ہے۔ رحم کے مقام پر درد ہوتا ہے، بے چینی اور کمزوری حد درجہ ہو جاتی ہے، تمام جسم زرد پڑ جاتا ہے کبھی متلی اور دست دتے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ نفاس رگ جاتا ہے۔ جب بخار زیادہ تیز ہوتا ہے تو اکثر ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے جس سے مریضہ کی حالت تشویش ناک ہو جاتی ہے۔ دستوں کا آنا بھی اس مرض میں بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب اس بخار کے ہمراہ نونیہ یا دیگر سینہ کے امراض پیدا ہو جائیں یا گردے بھی ماؤٹ ہو جائیں تو یہ حالت بھی خطرناک سمجھنا چاہیے۔

پر ہیز و ہدایات :- زچہ و بچہ کی صفائی سب سے مقدم چیز ہے۔
 اگر نفاس رک جانے سے بخار آگیا ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ کسی
 ہوشیار دایہ سے رحم کو دن میں دو بار بذریعہ ڈوش دھلوائیں اور مقام رحم پر
 سینک کریں۔ غذا نہایت ہلکی، رقیق اور زود ہضم دیں۔ یخنی، شوربہ، دودھ
 اور سا بودانہ وغیرہ عمدہ غذائیں ہیں۔ گھٹائی، مٹھائی یا ثقیل و باوی چیزیں
 ہرگز نہیں دینا چاہیے۔

علاج :- (۱) عفونتی زچگی کا بخار جس میں نبض کی رفتار بہت تیز
 ہو، بخار کی شدت اور بے عینیت پائی جائے تو پائسر و جنم دینا چاہیے۔ عموماً
 صرف پائسر و جنم دوا مرض پر حادی ہو جایا کرتی ہے۔ اگر یہ دوا کسی وجہ سے
 فیل ہو جائے تو سٹریپٹوکسین دیں۔

(۲) اگر نفاس رک جانے سے بخار ہو، مریضہ کے تمام جسم اور پیٹ
 میں آگ کی سی جلن کا احساس ہو، منہ میں خشکی اور پیاس زائد ہو، اندرونی
 طور پر بخار ہو لیکن تمام جسم ٹھنڈا ہو جس پر چھپا پسینہ پایا جائے، کمزوری
 زائد ہو۔ مزاج میں چڑچڑاہٹ ہو تو سیکیل کار دوا ہے۔

(۳) اگر بخار بہت تیز ہو، چہرہ میں تپتا ہٹ پائی جائے اور سر سامی
 کیفیت شروع ہوگئی ہو تو سیلاڈونا نمبر ۶ کی چند خوراکیں جلد جلد دہرائیں۔

(۴) عفونتی اور سمی بخار جس میں چہرہ تپتا یا ہوا ہو، جسم اور ناک و منہ
 سے تعفن آتی ہو۔ شکم ذکی احس ہو اور متعفن قسم کی آلائش نکل رہی ہو غرضکہ اگر
 سمی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے تو ایکی نیشیا بہت مفید ہے۔ داخلی

اور خارجی ہر دو طریقوں سے استعمال کریں۔

(۵) بخار، شکم میں اچھار، رحم اور شرنگاہ میں حد درجہ ذکی احمی۔
بہالت بخار یا تو زبردست بے ہوشی ہو یا ہذمان۔ مریضہ کی زبان باہر نکلی ہوئی ہو
یا سانپ کی زبان کی مانند ہستی معلوم ہوتی ہو تو لیکسیس دیں۔ اگر حلق میں زخم
پیدا ہو جائیں جن کا رنگ نیلگوں ہو تو لیکسیس اور بھی یقینی دوا بن جاتی ہے۔
(۶) اگر زچہ کو دست آنے لگیں جو پچکاری کی مانند چلیں تو پاؤڈر فائلم
دیں۔ — پیمپش میں بیلا ڈونا۔

(۷) با یو کیمک میں کالی میور سب سے بڑی دوا ہے۔ اس کو ابتدائی
حالت میں فیرم فاس کے ساتھ دیں۔ ہذیان اور دیگر فاسدانہ علامات میں
کالی فاس کے ساتھ باری باری دیں۔

(۸) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ آرسنک، پلسا ٹیلا، برائی ادنیا،
رشاکس، میورٹیک ایسڈ، وریٹرم ورائڈ، آئیوڈیم، سورنیم، اور
ہیوسمس وغیرہ کی طرف توجہ کریں۔

رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

UTERINE DISPLACEMENT

اسباب :- وضع حمل یا اسقاط کے بعد بے احتیاطی گھرنے سے
رحم کا اپنی اصلی وضع پر نہ آنا، ورم اندام نہانی، رحم پر چوٹ لگنا، اونچا نیچا

پاؤں پڑ جانا، اُچھلنا کودنا، عام کمزوری - ورم رحم - رحم میں خون کا جمع ہو جانا
رحم میں رسولی وغیرہ کا ہونا - رحم اور اس کے ملحقات کا ڈھیلا پڑ جانا -

علامات :- پیڑ و اور کمر میں گرائی اور درد کی شکایت رہتی ہے۔
نقل و حرکت سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ پیشاب بار بار ہوتا ہے یا رُک
رُک کر تکلیف کے ساتھ آتا ہے، خون حیض میں کمی ہو جاتی ہے یا درد کے
ساتھ حیض ہو جاتا ہے اور بعض وقت نیچے کی طرف اتر کر اندام نہانی کے
اندر ہی رہتا ہے لیکن کبھی باہر بھی نکل آتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- رحم کو انگلی یا سلائی سے اپنی اصلی وضع پر
لانے کے لیے کسی ہوشیار دائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ مریضہ کو آرام سے
بستر پر لٹائے رکھیں۔ چلنا پھرنا اور کام کاج کرنا مضر ہوا کرتا ہے۔ قبض
کسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ غذا ہلکی اور زود ہضم مثلاً دودھ، شوربہ
چپاتی، کھجڑی اور سا بودانہ وغیرہ دینا چاہیے۔ اور اصل سبب مرض کو رفع
کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔

علاج :- (۱) رحم کے اندر اجتماع خون یا ورم ہو، رحم اپنی جگہ سے
گزر گیا ہو شکم اور پیٹھ پر بھاری پن ہو، مبرز پر قابو نہ رہے، مریضہ کو دست
آتے ہوں اور ہر وقت دست کا احساس ہوتا ہو، ریا ح کے ساتھ پاخانہ
نکل جاتا ہو تو ایلو دینا چاہیے۔

(۲) رحم کے مقام میں بوجھ اور بے چینی، کمر اور پیڑ و اور کوٹھے میں
درد ہو ایسا معلوم ہو کہ رحم شرمگاہ سے باہر نکل پڑے گا تو سپیا - سلیم ٹنگ -

بیلا ڈونا۔ نکس و امیکا اور پلاٹنا بہترین دوائیں ہیں۔ کوٹھے اور پیڑوں میں ٹھہر ٹھہر کر درد اور سر میں ٹپکن کی حالت میں بیلا ڈونا۔ پاخانہ پیشاب کی بار بار حاجت اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے خروج رحم میں نکس و امیکا۔ کھانے سے نفرت، تنفس میں تکلیف رحم اپنی جگہ سے گر جائے۔ سیپا دیں۔ (۳) رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اور رحم کی تکلیف میں مریضہ خود کشی کے ارادے کرے یا اپنی قسمت کے متعلق اس کو تاریک پہلو نظر آتا ہو جس کی وجہ سے وہ حد درجہ غمگین اور مایوس ہو۔ پیشاب میں تکلیف اور قبض بھی پایا جائے تو اور مٹ بہت مفید ہے۔

(۴) علاوہ ازیں اگنیشیا، ہیلونائس۔ کالوفائلم۔ سمی سی فوگا۔ ٹیرنٹولا۔ ہائڈراسٹس۔ لیکسیس۔ کریازوٹ۔ ریشاکس۔ بنزوک ایسڈ۔ اور لیک کنینم وغیرہ بہت مفید ادویہ ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

ورم رحم

METRITIS

اسباب :- وضع حمل کے بعد جلد مباشرت کرنا۔ رحم پر چوٹ لگنا۔ بحالت حیض سردی کھا جانا۔ احتباس حیض۔ رحم کے اندر خارجی تیز دوائیں لگانا۔ کثرت جماع۔ عسر ولادت۔ ورم اندام نہانی۔ وضع حمل کے وقت بے احتیاطی برتنا۔ اسقاط حمل اور مرض سوزاک وغیرہ۔

علامات :- اس بیماری میں رحم کے مقام پر درد اور تشکن کی شکایت ہوتی ہے۔ پیٹرو میں بوجھ اور چھین معلوم ہوتی ہے جس کی ٹیس کمر اور رانوں تک جاتی ہے۔ اندام نہانی میں انگلی داخل کرنے سے رحم متورم اور دردناک محسوس ہوتا ہے۔ لعاب دار یا خون آمیز رطوبت آتی رہتی ہے۔ بعض حالات میں بخار اور متلی وغیرہ کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریضہ کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھیں نقل و حرکت نہ کرنے دیں۔ مباشرت سے سخت پرہیز کریں۔ بذریعہ اینا سبرج شرنگہ میں گرم پانی کی دھار پونچائیں اور باہر پیٹرو پر سینک کریں۔ غذا میں دودھ کھجڑی، مونگ کی دال کا پانی، آش جو اور دیگر لطیف اور زود ہضم اشیاء دیں۔

نوٹ :- جب یہ مرض خفیف ہوتا ہے تو عموماً صحت ہو جایا کرتی ہے لیکن اگر درم میں قواعد پڑ جائے یا مریض بے ہوش ہو جائے یا ہڈیانی کیفیت ہو جائے تو نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔

علاج :- اگر بے چینی زیادہ ہو۔ پیاس اور موت کا خوف پایا جائے۔ بخار تیز ہو اور سردی کھا جانے سے درم کی شکایت ہو گئی ہو تو اکوناٹ ابتدائیں بہت عمدہ کام کرتا ہے۔ ڈر، غصہ یا سردی سے حیض کے رک جانے کے بعد اگر درم ہو جائے تو یہ مفید ہے۔ مہنی مستویات میں اس دوا کا اثر نمایاں ہو جاتا ہے۔

(۲) اگر اکوناٹ فیل ہو جائے اور مریضہ کو تکلیف زائد ہو اور

سر میں ذرمی کیفیت پیدا ہو رہی ہو۔ اعضاء میں اینٹن اور تنج ہوتا ہو تو درم و رائڈ دینا چاہیے۔

(۳) اگر مرضیہ کا چہرہ سرخ اور تھمایا ہوا ہو۔ نفاس رک گیا ہو۔ سرسامی کیفیت پیدا ہو جائے کرتی ہو۔ پیڑو میں درد یکا یک ہوتا ہو اور غائب ہو جاتا ہو۔ رحم کے منہ پر سختی ہو تو سیلا ڈونا دوا ہے۔

(۴) منکر المزاج اور نازک عورتیں جن کو حیض یا نفاس رک جائے، رحم میں درد ہو۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو اور معدہ میں ابتری پائی جائے تو پلسا ٹیلا مفید ہے۔

(۵) رحم میں درد اور پیڑو کے تمام اعضاء میں نیچے دبنے کا احساس، رحم کے مقام میں جکڑن سی ہو۔ سیلان رحم کی شکایت ہو۔ رحم کی گردن میں سوئیوں کی سی چھن ہو تو سیپیا دینا چاہیے۔

(۶) رحم میں ورم جس میں یہ احساس ہو کہ پیڑو کے تمام اعضاء شکرگاہ کے راستہ باہر نکل جائیں گے یعنی آلات تناسل نیچے کودتے ہوئے معلوم ہوں۔ تو سیلا ڈونا۔ سلیم ٹنگ۔ نیٹرم میور۔ پلاٹنا۔ اور سیپیا میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔

(۷) رحم میں ورم اور صلبن دار درد۔ حیض بے قاعدہ اور درد سے ہوں۔ پاخانہ، پیشاب کی بار بار حاجت ہو تو ٹکس دامیکا دوا ہے۔

(۸) بایو کیمک میں ابتدا میں جبکہ بخار وغیرہ ہو تو فیرم فاس دیں۔ ورم کے دوسرے درجہ میں کالی میور دوا ہے۔ اگر رحم میں پتھر کی سی سختی پائی جائے

تو کلکیر یا فلور دیں۔ اگر حیض نہایت درد سے ہوتے ہوں تو گنیشیا فاس کے ساتھ ملا کر باری باری کسی دوسری دوا کے ساتھ دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ مرک۔ رشاکس۔ ہیومس۔ آرینک۔ جلیسم اور لائیکوپوڈیم وغیرہ بہت مفید ہیں۔ حسب علامت دینا چاہیے۔

لیکوریہ۔ سیلان الرحم

LEUCORRHOEA

اسباب :- مزمن قبض۔ ورم رحم۔ رچی کمزوری۔ کمی خون۔ کثرت جماع۔ رحم کا ٹل جانا۔ کم سنی میں حمل قرار پانا۔ حیض کا بند ہو جانا اور مرض سوزاک۔ آتشک۔ سل یا گٹھیا بانی وغیرہ۔

علامات :- اندام نہانی سے دودھ جیسی سفید رطوبت خارج ہوتی ہے بعض حالات میں سفید سفید چھچھڑے سے خارج ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پیروں میں جلن رہتی ہے۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے۔ طبیعت حسست اور کسلند رہتی ہے۔ کمر میں درد رہا کرتا ہے۔ سر میں بھی بھاری پن یا درد ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں اینٹھن سی ہوا کرتی ہے۔ مریضہ بہت کمزور ہو جاتی ہے اور بقول شخصے عورت کے بدن میں گھن لگ جاتا ہے۔ بعض حالات میں پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ ماہواری آیام درد سے آتے ہیں۔ کبھی سیلان اس کثرت سے ہوتا ہے کہ ایڑی تک بہہ کر آ جاتا ہے۔ مریضہ انتہائی کمزور

زرد اور لاغر ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ کبھی رطوبت سوزشی بھی ہوا کرتی ہے جس سے اندام نہانی میں خارش ہو جاتی ہے۔ بعض عورتوں میں سیلان رحم کی وجہ سے محل قرار نہیں پاتا۔

پرہیز و ہدایات :- قبض کا رفع کرنا معالج کا پہلا کام ہے کیونکہ قبض کی حالت میں اس مرض میں اور بھی تیزی ہو جایا کرتی ہے۔ قبض کو شافہ وغیرہ سے بھی دور کیا جاسکتا ہے۔ غذا نہایت ہلکی اور ملائم دیں۔ مونگ کی کھچڑی، دودھ، سابو دانہ، شوربہ وغیرہ کھانے کو دیں۔ نیز مقدی تازہ پھل مریضہ کو کھلائیں اور صحت عامہ کو درستی پر لائیں۔ کھٹائی، مرج، تیل، بادی اور نفاخ اشیاء سے گریز رکھیں۔ جماع سے حتی الوسع پرہیز کریں۔

اندام نہانی کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے ورنہ رطوبت کی خارش سے درد اور زخم کے ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ چنانچہ گرم پانی میں پھٹکری ڈال کر اندام نہانی کو دن میں دو تین بار دھوئیں یا محض گرم پانی سے اندام نہانی کو صاف رکھیں۔

علاج :- (۱) اگر رطوبت سفید یا زردی مائل ہو، حیض دیر کو ہوتا ہو یا قلیل مقدار میں رطوبت گاڑھی یا پتلی سوزشی اور جلن دار ہو تو پلسا ٹیلا بہت مفید ہے اور اس مرض کی نہایت عمدہ دوا ہے جو اکثر و بیشتر حالات میں بالمثل ہوا کرتی ہے۔

(۲) اگر پلسا ٹیلا سے فائدہ نہ ہو اور رطوبت سوزشی خارش پیدا

کرنے والی اور متعفن قسم کی ہو جس میں مچھلی یا مواد کی سی بدبو آئے، پیشاب میں بھی بدبو پائی جائے تو سیپیا دیں۔ پلسا ٹیلا کے بعد عموماً اس دوا کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔

(۳) اگر اوپر کی دونوں دوائیں ناکام رہیں اور مریضہ اپنے ہاتھوں اور پیروں میں جلن کی شکایت کرے رطوبت جلن دار ہو تو سلفر دینا چاہیے۔ اس دوا میں رطوبت کا کوئی بھی رنگ ہو سکتا ہے۔ لیکن زرد رطوبت عموماً دیکھنے میں آتی ہے۔

(۴) اگر پرناز کی طرح سے رطوبت ہے، رطوبت مقدار میں زیادہ ہو جو پتلی اور سوزشی ہو۔ پیٹرو کے مقام میں درد ہوتا رہتا ہو تو گریفائٹس دوا ہے۔

(۵) رطوبت مقدار میں زیادہ اور پھیلن پیدا کرنے والی اور زرد رنگ کی ہو۔ قبض۔ پاخانہ پھرنے میں بہت زور لگانا پڑتا ہو، سیلان رحم ایڑی تک بہہ کر جائے حیض کے بعد مرض میں زیادتی ہو تو ایوینا دوا ہے۔

(۶) لیکوریا جس میں چھپڑے خارج ہوں۔ جن میں سخت قسم کی تعفن آئے، پیچھ اور کمر میں درد نیز کمزوری پائی جائے تو سورنیم مفید ہے۔ وہ مستورات جو جلدی امراض میں مبتلا ہوں ان کے لیے یہ خاص دوا ہے۔

(۷) دودھ کی مانند رطوبت، حیض جلد جلد اور بکثرت، مریضہ کمزور ہو، ٹھنڈی ہوا سے نقصان پہنچتا ہو، پاؤں تر رہتے ہوں۔ تو گلیریا کارب دیں۔

(۸) سیلان رحم قبل حیض، رطوبت لمدار اور بہ کثرت خارج ہو جو کپڑے کو چمڑا یعنی سخت کر دے، حیض مقدار میں کم ہو نیز تھوڑے عرصہ تک رہے تو لیکسیس دینا چاہیے۔ یہ دوا سن یاس کی حالت کے لیے مخصوص اور مجرب ہے۔

(۹) اگر بالمثل دوا کے انتخاب میں دقت ہو تو الشرس فاری نورسا مدر شکر یا اشوکا مدر شکر فی خوراک پانچ سے دس قطرہ دن میں تین بار دینا بہت مفید ہے۔
(۱۰) سیلان رحم گاڑھا جس کے ساتھ کمر کے درد میں یہ احساس ہو کہ کمر کے ٹوٹ کر دو حصے ہو جائیں گے تو ادا شٹا x ۳ مجرب ہے۔ اگر اس کے ہمراہ صبح کو آنور کا مرتبہ نیگرم دودھ کے ساتھ کھائیں تو اور بھی مفید ہے۔

(۱۱) بایو کیمیک میں اگر رطوبت البیومن یعنی انڈے کی سفیدی کی مانند ہو تو کلگیر یا فاس بہت مفید ہے۔ پانی کی سی پتلی رطوبت جو چھلین پیدا کرنے والی ہو یا جس کے ساتھ دودسریا شرمگاہ میں خارش پائی جائے تو نیٹرم میور دیں۔ اگر مریضہ میں کمزوری اور اعصابیت پائی جائے تو کالی فاس و نیٹرم میور باری باری دیں۔

(۱۲) مندرجہ صدر اودیہ کے علاوہ مرک - اسبرا - سیکیل - کیوبے با - چارٹنا - امونیا میور - ایسکولس - کوکولس - بودسٹا - کاربوانیس - لیمیم ٹنگ - کریازوٹ - نکس دامیکا - اور زنگم میں سے کوئی دوا حسب علامت دیں۔ یہ سب دوائیں اپنے اپنے خواص میں عجیب و غریب ہیں۔

اشارات

لیکوریا بالائی کاسا - پلسا ٹیلا - سکیل - کلکیریا فاس -
 پتلا پانی کاسا - چائنا - پلسا ٹیلا - سکیل - سیپیا - گریفائٹس -
 نائٹرک ایسڈ - نیٹرم میور - کریازوٹ - سلفر -
 پرنالے کی طرح رطوبت ہے - حلیم سلیشیا - سیپیا - کلکیریا کارب -
 گریفائٹس - لائیکو -
 جلن دار - بورکس - پلسا ٹیلا - سلفر - سیپیا - کریازوٹ - کلکیریا کارب -
 حیض کے قبل - بووٹا - پلسا ٹیلا - سیپیا - فاسفورس - کریازوٹ -
 کلکیریا - گریفائٹس - نیٹرم میور - لیکسیس -
 حیض کے بعد - الیومنا - بورکس - بووٹا - پلسا ٹیلا - کلکیریا کارب -
 کلکیریا فاس - لائیکو -
 سوزاکی - پلسا ٹیلا - اورم میور - نائٹرک ایسڈ -
 دودھ کاسا - سیپیا - کلکیریا کارب - پلسا ٹیلا - سلیشیا - کلکیریا فاس -
 متعفن رطوبت - اریلیا - سورنیم - سیپیا - سلفر - نائٹرک ایسڈ - نمکس -
 آلات تناسل میں شدید خارش ہو - کلکیریا - کونیم - نیٹرم میور - سلیشیا -
 سلفر - کاربودج -

حمل کے دوران - پلسا ٹیلا - سیپیا - کریازوٹ - کوکولس - میورکس -

ہسٹیریا۔ اختناق الرحم

(دورہ کی بیماری)

HYSTERIA

اسباب :- فتور حیض، رحمی تکلیفات، مزمن قبض، انا کامی محبت، رنج و غم، تفکرات، غصہ و مایوسی، مشقت زنی، کثرت محنت و ماعنی، داعصابی اور جذباتی مزاج۔ خواہشات نفسانی کا پیدا ہونا اور ان کا پورا نہ ہونا، اور ریاحی امراض وغیرہ۔ یہ مرض کبھی موروثی بھی ہوتا ہے خصوصاً جن کے والدین شرابی ہوں یا آشک اور خنازیر کا اثر رکھنے والے ہوں ان کو اس مرض میں مبتلا ہونے کا زیادہ احتمال رہتا ہے۔

علامات :- یہ مرض عموماً عورتوں کو ہوا کرتا ہے لیکن کبھی مرد بھی اس کے شکنجے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ دس بارہ برس سے چالیس برس کی عمر تک کی عورتیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ معمولی ہسٹیریا میں پیٹ میں سے ایک گولا سا اٹھ کر حلق کی طرف آتا معلوم ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے مریضہ کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ڈکاریں یا جامائیاں آنے لگتی ہیں۔ دل دھڑکنے لگتا ہے۔ مریضہ سخت بے چین اور ادا میں سی معلوم ہوتی ہے۔ کان میں سنسناہٹ۔ آنکھوں کے سامنے چکا چوندھ اور سر میں درد ہو جاتا ہے۔ کبھی مریضہ پر سخت اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے اور وہ مختلف حصہ جسم میں

شدید درد کی شکایت کرتی ہے۔ یا مختلف فرضی امراض کی شکایت کرتی ہے جس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ بعض وقت خود معالج کو بجائے ہسٹیریا کے اعصابی درد یا دیگر امراض کا شبہ ہوتا ہے۔

شدید حالات میں ہاتھوں پیروں میں تشنج ہو کر مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے بعض وقت مریضہ یکایک چیخ مار کر رونے لگتی ہے یا قہقہہ مار کر ہنسنے لگتی ہے اور اس کو ایک گولہ پیٹ سے اٹھ کر اوپر کی طرف آتا ہوا محسوس ہوتا ہے جوں ہی وہ گولہ حلق تک پہنچتا معلوم ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں اکڑ جاتے ہیں۔ دانت بند ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مریضہ عجیب و غریب حرکات کرتی ہے، ہاتھ پاؤں مارتی ہے۔ اپنے سر کے بال نوچتی ہے یا کپڑے پھاڑتی ہے اور آس پاس کے آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ مریضہ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور آخر کار کھلکھلا کر سنسن دیتی ہے یا رونے لگتی ہے یا تے کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سو جاتی ہے۔ کبھی مریضہ ابتدا ہی سے بالکل خاموش بے ہوش پڑی رہتی ہے۔ جس کے ساتھ بعض حالات میں ہڈیاں بھی ہو سکتا ہے۔ اس مرض کا دورہ عموماً دوسرے تیسرے مہینہ ہوتا ہے لیکن اس سے قبل یا اس سے بعد بھی ہوتا ہے۔ کبھی سال میں صرف ایک ہی بار اس کا حملہ ہوتا ہے کبھی مہینہ میں ایک بار یا دو تین بار، کبھی ہر ہفتہ اور کبھی دن میں کئی بار یعنی ایک دورہ کے ختم ہوتے ہی مریضہ کو دوسرے دورہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ دورہ کی مدت چند منٹ سے لے کر کئی گھنٹہ تک ہے لیکن بعض حالات میں دو تین دن تک مسلسل دورہ قائم رہتا ہے۔

نوٹ :- اس بیماری کو مرض باؤ گولہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پیٹ میں سے ایک گولہ سا اٹھ کر حلق کی طرف جاتا معلوم ہوتا ہے۔ جاہل لوگ اس کو آسیب خیال کرتے ہیں اور بھوت پریت یا جن وغیرہ کی آمد سے منسوب کرتے ہیں اور باقاعدہ علاج کے بجائے مریضہ کے لیے جھاڑ پھونک اور دعا توہید کرایا کرتے ہیں۔

تشخیص و تفریق اسٹیریا اور مرگی میں تشخیص کرنا ضروری ہے۔ اسٹیریا کی مریضہ ظاہر اے ہوش ہوتی ہے مگر اس پاس کے آدمیوں کی آواز سنتی ہے۔ مرگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ بے ہوشی کے عالم میں اُس کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی۔ (۲) اسٹیریا میں ایک گولہ سا اٹھ کر حلق کی طرف جاتا محسوس ہوتا ہے لیکن مرگی میں ایک قسم کی سرسراہٹ جسم کے بعض حصص میں شروع ہوتی ہے جو سر کی طرف جاتی محسوس ہوتی ہے۔ (۳) مرگی میں منہ سے پھینا نکلتا ہے اور زبان دانت تلے کٹ جاتی ہے لیکن مرض اسٹیریا میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی۔ (۴) دورہ مرض کے رفع ہونے کے بعد مرض اسٹیریا میں نیند نہیں آتی بلکہ کمزوری اور پیشاب کی کثرت پائی جاتی ہے جبکہ مرگی کے دورے کے بعد گہری نیند آتی ہے اور درد سر ہوتا ہے مندرجہ صدراتوں کے علاوہ اور بہت سی علامتیں ہیں جن کا فرق معالج کو تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔

نوٹ :- کنواری لڑکیاں جو اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ شادی کے بعد اکثر یہ شکایت رفع ہو جاتی ہے یا جوں جوں عمر بڑھتی ہے علامات مرض میں تخیف ہوتی جاتی ہے۔

پہرہ ہیز و ہدایات :- دورہ کے وقت مریضہ کو ہوا دار کمرہ میں آرام سے لٹا دیں اور گرمیوں کے بند وغیرہ کھول کر سر کو قدرے اونچا کر دیں۔ چہرہ پر آب سرد کے چھینٹے ماریں یا مناسب نخلہ سنگھائیں یا پاؤں اور تمام بدن پر خوب مالش کریں۔ ایسا کرنے سے عموماً مریضہ ہوش میں جلد آجایا کرتی ہے۔ اگر مریضہ رحمی تکالیف کا شکار ہو تو اس کا مناسب علاج کریں قبض ہو تو اسے رفع کریں اور آئندہ قبض نہ ہونے دیں۔ مریضہ کو خوش و خرم رکھیں اور خیالات کو نیک اور پاکیزہ بنائیں۔ اگر مریضہ بالغ اور شادی کے قابل ہو تو اس کی شادی کا بندوبست کر دیں کیونکہ اکثر شادی کے بعد یا تو اس مرض کی علامات میں تخفیف ہو جاتی ہے یہ یا مرض بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ غذا زود، مضم اور ملکی دینا چاہیے۔ شراب خوری اور دیگر اشیاء منشی سے سخت پرہیز کریں۔ ثقیل، تیز مسالہ دار اور نفاخ اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ علاج :- ہسٹیریا کے علاج میں پہلے الگیشیا، مشک، ٹیرنٹولا۔ کو نیم پلاٹنا۔ نکس موسکاٹا۔ اور اورم کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ان ادویہ کے بعد پلسا ٹیلا۔ بیلادونا۔ سٹرامونیم۔ ویلریانہ۔ ایسا فوٹیدا۔ کوکوس پیوٹمس۔ سمی سی فوگا اور فاسفورس کا مطالعہ کریں۔ بعد ازاں دیگر ادویہ مثلاً لکیسیس۔ حلسمیم۔ نیٹرم میور۔ ورٹرم ابم۔ سائیکوٹا۔ سیکیل، اوپیم، مگنیشیا میور اور سیپیا وغیرہ مفید ہیں۔ بہر حال اوپر کی سب کی سب ادویہ اپنی اپنی علامات میں عجیب و غریب ہیں۔

(۲) ناکامی محبت یا غم و اندوہ کے باعث ہسٹیریا کے دورے

مریضہ سرد آہیں بھرے اور سسکیاں لے یا یکے بعد دیگرے روتا اور ہنستا پایا جائے، پیٹ میں گڑ گڑاہٹ اور معدے سے حلق تک گولہ اٹھتا ہوا محسوس ہو۔ تو انگیشتیا دوا ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے اس دوا کو اس مرض کے لیے مجرب بتایا ہے۔

(۳) ہسٹیریا کے دورے کرازی قسم کے ہوں۔ یکایک بے ہوشی اور اس کے بعد در دسر دوسروں کو لعنت ملامت کرنے کی زبردست رغبت پائی جائے۔ شہوانی جذبات زیادہ ہوں۔ سینہ میں دھڑکن اور بھیجن کا احساس، نہ رکنے والی ہنسی اور اس کے بعد رنج کی کیفیت یکے بعد دیگرے پائی جائے تو مشک دوا ہے۔ اگر مریضہ کو پیشاب بہ کثرت ہوتا ہو تو بیر دوا اور بھی بالمثل ہو جاتی ہے۔

(۴) اگر مرگی کے ساتھ ہسٹیریا ہو۔ تمام اعضاء میں لرزہ پایا جائے۔ گھبراہٹ اور بے چینی زیادہ ہو، گانے بجانے سے تحریک ہوتی ہو۔ صرف تنہائی میں مریضہ بہتر ہو تو ٹیرنٹولا مفید ہے۔ یہ دوا مکار اور عیار عورتوں پر خوب کام کرتی ہے۔

(۵) مزمن ہسٹیریا یا غیر شادی شدہ بوڑھی عورتوں میں ہسٹیریا کے دورے معمولی باتوں سے مریضہ کو رنج پہونچے اور آنسو نکل پڑیں۔ لوگوں سے نفرت ہو پھر بھی تنہا رہنا نہ پسند کرے۔ مغموم اور ہر چیز سے لا پرواہی، دوران سر جو لیٹنے سے یا کروٹ سے زیادہ ہو۔ پیٹ میں گولے کا احساس جو اوپر کو حلق کی طرف جاتا محسوس ہو تو کو نیم بہت مفید ہے۔

(۶) جماع کی نہ رکھنے والی خواہش، مریضہ کو اپنا جسم ننگا کرنے کی زیادہ رغبت ہو۔ مریضہ متکبر ہو اور دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھتی ہو یہاں تک کہ اُن لوگوں سے نفرت کرے جن کو وہ جان سے زیادہ چاہتی ہو۔ دورہ کے ساتھ دم گھٹتا ہوا معلوم ہو، اعصابی کمزوری پائی جائے گوشت میں اینٹھن ہو جو دورہ کے وقت زیادہ ہو جائے تو پلاٹنا دینا چاہیے۔

(۷) ہسٹیریا کے دورہ کے وقت غشی یا نیند کی طرف طبیعت مائل ہو مریضہ کبھی تو زور سے قہقہہ مارے اور کبھی رونا شروع کر دے، کھانے کے بعد پیٹ پھول جائے، سوتے میں منہ اور زبان انتہائی خشک ہو جائے تو نمکس موسکاٹا دیں۔

(۸) غصہ، جذبات، خوف یا مایوسی سے ہسٹیریا کے دورے آنے لگیں جس میں مریضہ کبھی ہنسے اور کبھی چیخے، خودکشی کی طرف طبیعت زیادہ مائل ہو۔ ذرا سے شور سے مریضہ گھبرا جائے تو اورم دوا ہے۔

(۹) اگر درد کے ساتھ حیض آتے ہوں اور دیگر رحمی خرابی کے باعث دورے پڑنے لگیں، کمزوری اور کمی خون کی بھی شکایت ہو، دوران سزا اور کنپٹی میں یکایک سخت درد پایا جائے تو کالوفائلٹم دوا ہے۔

(۱۰) باپو کیمک میں کالی فاس اس مرض کی بہت عمدہ دوا ہے اگر تکلیف کے ساتھ غلیننی یا حیض کی بے قاعدگیاں موجود ہوں تو نیٹرم میور کے ساتھ یکے بعد دیگرے دیں۔

اشارات

- ۱۔ پیٹ سے گولہ اٹھ کر حلق کی طرف آنے کا احساس - اگنیشیا -
 اسافوٹیڈا - کونیم - سائیکوٹا - سیپیا - ویلریا نہ - لگنیشیا میور -
 ب۔ اعصابیت، چڑچڑاہٹ، زودرنجی کے لیے - اگنیشیا - کیمولا -
 فاسفورس - ویلریا نہ - وریٹرم - مشک - بیلاڈونا - ہیوسمس -
 ج۔ سکتہ کے مانند بے ہوشی کے لیے - بیلاڈونا - اگنیشیا - اودیم -
 کیمولا - لیکسیس -
 د۔ رعشہ کی حرکات - سمیسی نوگا - کاسٹلم - کیمولا -
 س۔ ریڑھ میں درد کی حالت - نکس وامایکا - اگنیشیا - کیوبہرہم -
 بیلاڈونا - سلفر -
 س۔ دم گھٹتا معلوم ہو - ہیوسمس - بیلاڈونا - اگنیشیا - اسافوٹیڈا -
 پلاٹنا - لیکسیس -

پایہ

وبائی امراض

انفلوئنزہ - نزلاوی بخار

INFLUENZA

اسباب :- یہ ایک قسم کا وبائی بخار ہے جو نزلہ اور زکام سے پیدا ہوتا ہے۔ مرطوب اور نشیبی مقامات پر یہ زیادہ پھیلتا ہے۔

علامات :- ابتدا میں نزلہ اور زکام کی کیفیت ہوتی ہے جس میں کم و بیش بخار ہو جاتا ہے۔ کھانسی آنے لگتی ہے۔ آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑی علامت اس مرض کی یہ ہے کہ مریض یکایک انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور تمام جسم میں سخت درد ہوتا ہے۔

یوں تو یہ مرض عموماً ہفتہ عشرہ میں اچھا ہو جاتا ہے۔ کثرت سے پسینہ یا پیشاب یا دست آکر اس مرض میں تخفیف ہوا کرتی ہے لیکن ذرا سی بے احتیاطی یا غلط علاج سے اس کا کیس بگڑ بھی جاتا ہے جس کے نتیجہ میں نمونیا ہو جاتا ہے یا حرکت قلب بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو سردی سے محفوظ رکھیں۔ ٹھنڈا پانی مریض کو نہ دیں۔ غذا میں خاص احتیاط سے کام لیں اور صرف ہلکی غذا آتش جو، دودھ یا سا بودانہ وغیرہ دیتے رہیں۔

علاج :- اس مرض میں رٹاکس - یو پیٹوریم پرنٹ - جلمسیم اور برائی ادونیا مخصوص دوائیں ہیں۔

(۱) تمام جسم میں موج کا سا درد ہو، ہڈیاں درد کریں۔ خشک کھانسی آئے یا بھیگ جانے سے نزلہ وی بخار ہو گیا ہو، درد میں حرکت سے سکون ہوتا ہو تو رٹاکس دوا ہے۔

(۲) اگر تمام ہڈیوں میں درد ہو جیسے کہ وہ ٹوٹ گئی ہیں سر میں غضب کا درد، آواز بھاری ہو جائے، بے چینی یا ستلی کی شکایت ہو، پسینہ قطعی نہ نکلتا ہو یا برائے نام ہو تو یو پیٹوریم پرنٹ دینا چاہیے۔ ہڈیوں میں درد، گوشت پوست میں درد کے ساتھ پایا جانا اس دوا کی خاص علامت ہے۔

(۳) صبح سویرے چھینکیں آئیں اور ناک سے پتلا زکام زیادہ مقدار میں بے مسلسل جاڑا معلوم ہو۔ کمزوری، غنودگی اور سستی زائد ہو، مریض لیٹا رہنا چاہے، پیاس بالکل نہ ہو تو جلمسیم دینا چاہیے۔

(۴) مریض چپ چاپ لیٹا رہنا پسند کرے کیونکہ حرکت سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ پیاس اور قبض کی شکایت ہو (ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں پیتا ہو لیکن زیادہ دیر کے بعد) ہونٹ خشک ہوں، کھانسی بالکل خشک ہو تو برائی ادنیٰ مفید ہے۔

(۵) تمام دن جاڑا معلوم ہو۔ سارے جسم میں دکھن اور چوٹ کا سا درد ہو، پھرے سے وحشت برے، آنکھوں میں دھندلا پن معلوم ہو، سر میں درد ہو، کمزوری زائد ہو تو بیٹیشیا بہت مفید ہے بعضوں نے بیٹیشیا کو وبائی نزلہ کے لیے مجرب بتایا ہے۔

(۶) وبائی نزلہ میں اسی کا زہر یعنی انفلوئنزیم نمبر ۳ دینا بہت مفید ہے۔ انفلوئنزہ کی تمام علامات اس دوا میں پائی جاتی ہیں بحفظ ماتنقم کے طور پر اس دوا کو دن میں دو بار دینا چاہیے۔

(۷) اعضاء میں حد سے زیادہ کمزوری اور نا طاقتی پائی جائے۔ جس کی وجہ سے مریض برابر لیٹا رہے۔ نزلہ زیادہ مقدار میں بہتا ہو۔ بے چینی حد سے زیادہ پائی جائے۔ پیاس بار بار معلوم ہو لیکن پانی پی نہ سکے یا صرف ایک آدھ گھونٹ پی لے۔ آدھی رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ ٹھنڈک سے نفرت ہو گرمی سے آرام ملتا ہو۔ ناک سے صلیں دار قسم کی رطوبت نکلتی ہو تو آرسنک دوا ہے۔

(۸) باپو کیمک میں فیرم فاس اور نیٹرم سلف یکے بعد دیگرے دینا بہت مفید ہے۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ مرکب - ڈکمارا - فاسفورس -
 نکس و امیکا - اکونائٹ اور سلفر بہت مفید اور خاص دوائیں ہیں -
 اگر یہ دوائیں بھی بالمثل ثابت نہ ہوں تو سیلا ڈونا - اپیکاک - ریو مکس
 شکٹا - پلسا ٹیلا اور انٹم ٹارٹ کی طرف توجہ کریں اور حسب علامت دیں -

چیچک

SMALL POX

اسباب :- یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے جو مریض کے
 جسم یا لباس یا ہوا کے ذریعہ سے پہونچتا ہے - اس کی چھوت تندرست
 اشخاص کو بہت جلد لگ جاتی ہے ، رطوبت ، غذا یا دودھ وغیرہ کے
 فصد کے جوش سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے - بچوں اور سیاہ فام اشخاص کو
 یہ مرض زیادہ ہوتا ہے - عموماً یہ مرض عمر میں ایک ہی بار ہوا کرتا ہے لیکن
 بعض وقت دوبار بھی اس کا حملہ ہوتا ہے -

علامات :- اس مرض میں یکایک تیز بخار ہوتا ہے - کمر اور سر پہ
 شدید درد پایا جاتا ہے - الجھن اور بے چینی بڑھ جاتی ہے - بخار آنے کے
 تیسرے دن جسم پر چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہوتے ہیں جو ابتدا میں
 بالکل مچھر کے کانٹے کے سے ہوتے ہیں - جو دو ایک روز میں بڑے
 ہو جاتے ہیں اور ان میں شفاف رطوبت بھر جاتی ہے ، چھو یا مساتھن

کے بعد دانوں کی رطوبت مواد کی شکل میں بدل جاتی ہے اور ان کی نوکیں اُبھر آتی ہیں اور حرارت جسم کافی بڑھ جاتی ہے جس سے بعض وقت ہڈیاں کیفیت ہو جاتی ہے۔ دسویں روز دانے مرجھانے لگتے ہیں اور پھر ان پر کھرنڈ بن جاتے ہیں۔ جو رفتہ رفتہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور مریض کو صحت ہو جاتی ہے۔

پیچپاک کے دانے مختلف قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ کبھی دانے بہت قریب قریب یا ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تشویشناک ہوا کرتے ہیں اور مریض مشکل سے جانبر ہوتا ہے۔ اسی طرح جن دانوں میں رطوبت پیپ میں نہ بدلے بلکہ ان کے نیچے خون جاری ہو جائے تو یہ صورت بھی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ بعض حالات میں دانے بے قاعدہ اور ٹیڑھے میڑھے نکلتے ہیں۔ ان میں بھی مواد کے بجائے خونی رطوبت ہوتی ہے۔ یہ شکل بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔

جس وقت میں دانے اچھی طرح سے نہ اُبھریں بلکہ معمولی اُبھار سا ہو کر دانے اندر کو دب جائیں تو بھی نتیجہ عموماً خراب ہوتا ہے۔ بعض حالات میں اس مرض میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں مریض کو سوزش حنجرہ، امراض چشم، منونیا اور سرخ بادہ وغیرہ موزی امراض ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ سب روپدایات۔ مریض کو صاف ستھرے کمرہ میں رکھیں۔ ہوا کے سرد جھونکے سے مریض کو بچائے رکھیں۔ رفع درد کمر کے لیے مقام درد پر سینک کریں۔ اگر آنکھیں بہت سرخ اور متورم ہوں تو ان پر سرد پانی میں

سرکٹا ترک کر کے رکھیں یا کوئی مناسب سرمہ لگائیں یا بورک ایڈ ایک ڈرام
عرق کلاب ایک اونس باہم ملا کر صبح و شام چند قطرے آنکھ میں ڈالیں۔ کوئی
تیز دوا آنکھوں میں ہرگز نہ ڈالیں۔ ورنہ آنکھ میں خراش ہو کر اس کے ضائع
ہونے کا احتمال رہتا ہے۔

غذا نہایت ہلکی اور زود ہضم دیں۔ بحالت کمزوری مقوی غذا کا بھی
خیال رکھیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں اور چکنائی، گوشت اور مٹھائی وغیرہ سے
پرہیز رکھیں۔ آتش جو، دودھ، شوربا، نیم برشت انڈا دینا مفید ہے۔

انتباہ چونکہ یہ ایک چھوت والا مرض ہے۔ اس لیے ایسی تدابیر عمل
میں لانی چاہئیں کہ دوسروں تک یہ بیماری نہ پہنچنے پائے۔
چنانچہ مریض کو علیحدہ کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ ہر شخص کو اس کمرہ میں نہ جانا چاہیے
یہاں تک کہ معالج کو بھی زیادہ دیر تک وہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔
اور دوسرے مریض کو دیکھنے سے پہلے غسل کر کے اپنا لباس بدل لینا چاہیے
مریض کے تھوک و پاخانہ پیشاب کو جلا دینا چاہیے یا اس میں کوئی جریم کش
دوا ڈال دینا چاہیے۔

حفظ ماتقدم حفظ ماتقدم کے لیے ویر پولینیم نمبر ۳۰ دن میں دوبار اور
تیسرے چوتھے دن ایک آدھ خوراک سلفر دے دیا کریں
یا ہر چوتھے روز ویر پولینیم نمبر ۲۰ کی ایک خوراک دیں سیراسینا اور لینڈنیم
بھی حفظ ماتقدم کے لیے اہم دواؤں میں سے ہیں۔
علاج :- (۱) چیچک کے لیے ویر پولینیم بہت عمدہ دوا ہے۔

ابتداء سے لے کر آخر تک اسی کو نمبر ۳ طاقت میں دن میں چار بار دینا چاہیے اور کبھی کبھی ایک آدھ خوراک سلفر کی بھی دیدیا کریں تاکہ اس کے اثر میں اور بھی تیزی پیدا ہو جائے۔ اکثر و بیشتر حالات میں یہی ایک دوا کافی ہوا کرتی ہے مصنف کا بھی ذاتی تجربہ ہے کہ دیرپو لینم دینے سے مریض پیچیدگیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور مرض کی مدت ضرور کم ہو جاتی ہے۔ اگر دیرپو لینم بخار اتارنے سے قاصر رہے تو مصنف بیلا ڈونا دے کر بخار اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیرپو لینم یا کوئی دوسری دوا حسب علامت تجویز کرتا ہے۔

(۲) مرض کی ابتدا میں جبکہ جسم یا چہرہ پر سرخی نمودار ہو، بخار، دردر اور بے چینی زیادہ پائی جائے، مریض کو روشنی سے نفرت ہو اور کسی کسی وقت ہذیانی کیفیت طاری ہو جاتی ہو تو کوناٹ 1×4 اور بیلا ڈونا 4×4 باری باری دینا بہت مفید ہے۔

(۳) اگر ابتدا ہی سے کیس گہڑتا معلوم ہو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ چہرہ بھر بھرایا ہوا اور نبض نہایت کمزور ہو۔ دانوں کا رنگ سیاہ ہو اور جلد نیلگوں معلوم ہو، مریض کو تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید پیاس ہو اور بے چینی زیادہ چائی جائے تو آرسنک دوا ہے۔

(۴) ۷۰ قی جہرہ کے لیے پیشیا نمبر ۳ مجرب ہے۔ بسا اوقات اسی کو شروع سے آخر تک کھلانے سے مکمل شفا ہو جاتی ہے۔ دن میں چار بار دینا چاہیے۔

(۵) اگر مرض کی نوعیت ٹائیفائیڈ کی سی ہو جائے حرکت سے آرام ہو (یعنی اس کا مریض بے چینی اور شدت درد سے کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور تب ہی اس کو عارضی سکون ہوتا ہے۔ خاموش لیٹنے سے تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے) زبان خشک ہو اور اس پر مثلثی نشان ہو۔ کمر نیز تمام جسم میں درد ہو تو رٹاکس دیں۔ یہ دوا اس وقت بھی مفید ہے جبکہ دانوں میں مواد پڑ چکا ہو اور ان میں کھجلی ہوتی ہو یا جس وقت کہ چہرہ پر درم ہو اور یکے بعد دیگرے جاڑا اور بخار کی کیفیت ہو۔

(۶) اگر دانے باقاعدہ باہر کو نہ ابھر رہے ہوں۔ کمر میں درد ہو، تنفس میں دقت پائی جائے مریض پر غنودگی طاری ہو تو انٹیم ٹارٹ دینا بہت مفید ہے اس کے دیتے ہی دے ہوئے دانے باہر کو ابھر آتے ہیں بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ بالکل ابتدا ہی میں اگر اس دوا کو استعمال کر دیا جائے تو چیچک کا پورا کورس بغیر کسی پیچیدگی کے صحیح سلامت پورا ہو جاتا ہے۔

(۷) اگر دانے ایک میں مل جائیں، گلے میں سوجن اور درد ہو، رال بہ کثرت ہے، خون آمیز دست آویں تو مرک سال مفید ہے۔

(۸) باپو کیمک میں قیرم فاس اور کالی میوہ باری باری دیں۔ غنودگی، تھوک کی زیادتی اور آبلوں کے آپس میں مل جانے کی حالت میں نیٹریم میوہ دیں۔

(۹) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ ہائڈراسٹس۔ ویکسینیم۔ میلنڈرینیم۔ سیراسینا۔ تھوجا۔ برائی ادنیا۔ ایکسیپس۔ سورینیم۔ جلیسمیم۔ اور اونیاکارب وغیرہ بہت مفید اور اہم ہیں۔ حسب علامت دیں۔

اشارات

- ۱۔ سیاہ رنگ کے دانے۔ آرٹک۔ لیکسیس۔ رشاکس۔ کروٹلیس۔ فاسفورس۔
- ب۔ دانے دب جائیں یا دیر میں نکلیں۔ دیر پوینیم۔ سیلفر۔ برائی اونیہ۔ زنک۔ آرٹک۔ ہائیڈریس۔ کروٹلیس۔
- ج۔ دست شروع ہو جائیں۔ آرٹک۔ رشاکس۔ انٹیمٹارٹ۔ مرک۔
- د۔ نزلاوی کیفیت۔ انٹیمٹارٹ۔ فاسفورس۔ رشاکس۔ آرٹک۔
- س۔ فاسدانہ کیفیت۔ ہائیڈراسٹس۔ رشاکس۔ نائٹریک ایسڈ۔
- ایکی نیشیا۔ چائنا۔ سورنیم۔

خسرہ (چھوٹی چیچک)

MEASLES

اسباب :- اس مرض کا پھیلانے والا ایک خوردبینی جرثومہ ہے۔ جو مریض کے تھوک، پاخانہ، پیشاب، برتن یا ہوا وغیرہ کے ذریعہ سے تندرست انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ غذا یا دودھ کے فضلہ کے جوش سے یہ مرض جلد ہو جاتا ہے۔

علامات :- پہلے بخار اور نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے چھینکیں آتی ہیں، آنکھ اور ناک سے پانی بہتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور روشنی برداشت نہیں ہوتی۔ تیسرے، چوتھے یا پانچویں روز جسم سرخ ہو کر اُس پر خشکاش کی مانند سرخ سرخ دانے نمودار ہوتے ہیں۔ دانوں کے بخوبی نکل آنے کے بعد بخار اور دیگر علامات میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ساتویں دن دانے مرجھا جاتے ہیں اور ان پر سے بھوسی کی مانند کھرندٹ جھڑ جاتے ہیں۔ جس کے بعد مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

خسرہ کی کئی قسمیں ہیں۔ جن کا بیان طول ہو جانے کی بنا پر یہاں نہیں کیا جا رہا ہے۔ بعض وقت دانے ظاہر ہو کر غائب ہو جاتے ہیں یا جلد پر سیاہ سیاہ داغ پڑ جاتے ہیں اور ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ تمام علامات نہایت خطرناک ہوا کرتی ہیں۔

بچوں میں بحالت کمزوری نمونیا ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورتوں میں اس مرض سے حمل ساقط ہو جاتا ہے۔ دوران خسرہ نمونیا، کان کی تکلیفات از قسم درم اور زخم، دست اور پچیش کا بھی خطرہ رہا کرتا ہے۔

پرہیز و ہدایات :- مریض کو صاف ستھرے کمرے میں آرام سے لٹائے رکھیں، اس کو باہر نہ نکلنے دیں۔ سرد ہوا کے جھونکے سے مریض کو بچائیں۔ خصوصیت بچوں کو بیمار کے کمرے میں نہ جانے دیں۔ مریض کے بستر پر نیز کمرہ کے فرش پر غاکسی چھڑک دیں۔ غذا نہایت

ہلکی اور سریع المضم از قسم دودھ، شوربا، آش جو، اور سا بودانہ وغیرہ دیں۔
حفظ ما تقدم جب خسرہ کی وبا پھیلی ہو تو بطور حفظ ما تقدم پلسا ٹیلا
 نمبر ۶ کی ایک خوراک روزانہ صبح دینا چاہیے۔ اور
 کبھی کبھی ایک آدھ خوراک سلفر کی بھی دینا چاہیے بعض ڈاکٹروں نے
 تھو جا اور آرسنک کو بھی بطور حفظ ما تقدم استعمال کر کے بہترین نتائج
 حاصل کیے ہیں۔

علاج ۱۔ جب نزلہ کی ابتدائی علامات رونما ہوں، بخار بہت تیز
 ہو، بے چینی اور اُکھن زیادہ ہو، نبض تیز اور بھری ہوئی چلتی ہو، پیاس
 کی شدت ہو تو اکوناٹ دوا ہے۔ ابتدائی حالت میں یہ دوا عجیب و
 غریب ہے۔ چند خوراکیوں سے مرض کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ اس
 دوا کے اثر کو تیز کرنے کے لیے ایک خوراک سلفر کی بھی دیدینا چاہیے۔
 (۲) نزلا دی کیفیت، آنکھوں سے آنسو بہیں، آنکھیں سرخ ہوں،
 منہ خشک ہو لیکن پیاس نہ ارد، کھلی ہوا کی خواہش ہو، رات کو دست
 آتے ہوں یا دانے دیر میں نکلتے ہوں تو پلسا ٹیلا بہت مفید ہے۔
 عموماً یہ دوا مرض کی ابتدا سے لے کر آخر تک استعمال ہوتی ہے۔
 تا وقتیکہ کوئی خاص پیچیدگی نہ پیدا ہو گئی ہو۔ اکثر ڈاکٹروں کا اس پر
 اتفاق ہے۔ درمیان میں ایک آدھ خوراک سلفر بھی دیدینا چاہیے۔
 تاکہ دوا اپنا فعل تیزی سے کرنے لگے۔
 (۳) اگر پلسا ٹیلا ناکام رہے اور نزلا دی کیفیت بدستور آنکھیں،

کان اور ناک بُری طرح سے مبتلائے مرض ہو جائیں اور علامات شدید تر ہونے لگیں تو کالی بائی دوا ہے۔

(۴) اگر دانوں کا اُبھار ٹھیک طور سے نہ ہو یا دانے دب گئے ہوں۔ کھانسی خشک ہو۔ سینہ میں درد ہو۔ پیاس اور قیض کی شکایت ہو۔ مریض لیٹا رہنا چاہے تو برائی اونیا مفید ہے۔

(۵) اگر بخار کافی تیز ہو، مریض پر ہذیانی کیفیت طاری ہو۔ نکلنے میں دقت ہو، چہرہ نہایت سرخ اور متما یا ہوا ہو۔ تپکن کا درد سر ہو، خشک تشہی کھانسی آئے، روشنی قطعی برداشت نہ ہو، سوتے ہیں مریض چونکے اور بھاگے تو بیلا ڈونا مفید ہے۔

(۶) اگر باوجود مناسب ادویہ کے مریض کی حالت سدھرتے نہ معلوم ہوتی ہو یا دانے یکا یک غائب ہو جائیں۔ ہونٹ خشک اور جھلے ہوئے ہوں، بخار، گھبراہٹ اور بے چینی نمایاں طور پر ہو، تھوڑے تھوڑے پانی کی شدید ترین پیاس ہو۔ کمزوری حد درجہ بڑھ جائے تو آرسنک بہت عمدہ دوا ہے۔

(۷) بایوکیماک میں فیرم فاس اور کالی میو ربتدا سے آخر تک استعمال کرائیں۔ اگر دانے اندر کو دب جائیں تو کالی سلف دے کر دانوں کو اُبھاریں۔ اور اس کے بعد پھر فیرم فاس اور کالی میو رباری باری سے دینا شروع کریں۔

(۸) مندرجہ صدر دواؤں کے علاوہ انٹم کرڈ۔ انٹم ٹارٹ

فاسفورس - زنک - حلیم - مرک - کاربودج - لیکسیس وغیرہ قابل ذکر
اور اپنے اپنے فعل میں عجیب و غریب ہیں حسب علامات دینا چاہیے۔

اشارات

ا - خسرہ جس میں آنکھ میں بھی تکلیف ہو جائے :- یوفریشیا - پلساٹیل -
سلفر - مرک - آرسنک - کالی بانئ - انٹم ٹارٹ -
ب - کان کی تکلیفات میں :- پلساٹیل - سلفر - مرک - لائیکو -
نائٹرک ایسڈ - کاپیکیم - کالی بانئ -
ج - کھانسی خشک :- کافیا - کیمولا - اکونائٹ - کالی بانئ -
شکٹا - ریوکس - ڈروسرا - برائی اونی -
د - بلغمی کھانسی :- پلساٹیل - سلفر - ڈاکمارا - اکونائٹ -
اپیکاک - انٹم ٹارٹ - کالی بانئ - ہیپر سلفر -
س - فاسد یا سیاہ دانے :- لیکسیس - آرسنک - کروٹیل -
س - دانے دیر میں نکلیں یا دب جائیں :- برائی اونی - سلفر -
آرسنک - فاسفورس - کاربودج - کیمفر - یوفریشیا - مرک -
پلساٹیل -

طاعون

PLAQUE

گو یہ مرض بہت پُرانا ہے اور دنیا کے تمام حصوں میں پھیل چکا ہے لیکن ہندوستان میں اس کا درود پہلی مرتبہ ۱۶۱۲ء میں شہنشاہ جہانگیر کے عہد میں ہوا تھا۔ ۱۸۹۶ء میں یہ بیماری ہندوستان کے اکثر حصوں میں پھیلی اور اب یہ بیماری ہندوستان میں قریب قریب ناپید ہے۔

اسباب :- یہ ایک قسم کا شدید متعدی وبائی بخار ہے۔ مرطوب مقامات میں، کثیف اور مرطوب ہوا، گنجان آبادی، بعض فضلات نباتی و حیوانی وغیرہ میں طاعون کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔

علامات :- طاعون کی کئی قسمیں ہیں اور اس کے اعتبار سے ان کی علامتیں بھی جدا گانہ ہیں۔ اختصار کے طور پر چند اقسام کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

پہلے مریض میں درد سر، درد کمر، خفیف

(۱) غدد و الاطاعون بخار اور ضعف کی شکایت رہتی ہے۔

اس کے بعد بخار میں تیزی ہو جاتی ہے۔ بے خوابی اور بے چینی بڑھ جاتی

ہے۔ شدت بخار میں ہذیانی کیفیت ہو جاتی ہے اور بعض وقت

بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے جو ایک خراب علامت ہے معمولی حالات

میں عموماً ۱۰۴ درجہ تک بخار رہتا ہے لیکن شدت مرض میں ۱۰۶ تک

تجاوز کر جاتا ہے۔ دو تین روز کے بعد ران، بغل، اور گردن کے غدود متورم ہو جاتے ہیں یعنی گلٹیاں نکل آتی ہیں جن میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے۔ بعض حالات میں جسم پر بڑے بڑے فاسد قسم کے پھوڑے نکل آتے ہیں۔ کمزوری بہت بڑھ جاتی ہے۔ غرض مریض کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔

نزلہ یا نمونیا والا طاعون یہ طاعون کی خراب قسم ہے۔ اس میں کھانسی، زکام اور سینہ میں درد ہوتا

ہے اور طاعون کی سمیت پھیپھڑوں میں سراپت کر جاتی ہے۔ خون آمیز بلغم خارج ہونے لگتا ہے۔ تنفس میں دقت ہو جاتی ہے اور ضعف و غشی طاری ہو کر مریض جاں بحق ہو جاتا ہے۔

خونی طاعون یہ بھی ایک بدترین قسم کا طاعون ہوتا ہے جس میں جلد کے نیچے جریان خون ہو کر جسم کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ ناک، منہ، پیشاب اور پاخانہ سے خون بہ کثرت آتا ہے جس سے مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔

تشخیص :- ابتدا میں طاعون کی تشخیص کرنا ذرا مشکل ہے۔ تاہم شدت بخار۔ درد سر اور گلٹیوں کا نمودار ہونا اس کی رہنما کن علامات ہیں۔ پرہیز و ہدایات :- مریض کو علیحدہ کمرہ میں رکھا جائے۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور ہوا دار ہو۔ کمرہ میں تندرست آدمیوں کی آمد و رفت نہ رکھیں۔ مریض کا تھوک اور پاخانہ پیشاب پر کوئی جراثیم کش دوا ڈال دیا کریں۔ بخار آنے میں غذا قطعی طور سے بند کر دیں۔ یا صرف دودھ، آبلہ، یا

شور با وغیرہ دیں۔ گلیٹھوں پر سینک کریں یا پیتہ رومی گھس کر نیگم گلیٹھوں پر لگائیں۔

حفظ ماتقدم ہم نیکہ یہ تحقیق ہو چکا ہے کہ چوہے طاعون میں مبتلا ہو کر اس مرض کو پھیلانے کا باعث ہوتے ہیں اس لیے جہانتک ہو مردہ چوہوں کو ہاتھ نہ لگائیں بلکہ کسی چیز سے پکڑ کر باہر کنارے لے جائیں اور ان پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دیں۔ گھر کے تمام کڑے اور سوراخ بند کر دیں۔

(۲) بہتر یہ ہے کہ وہاں پھیلنے پر مکان کو چھوڑ کر میدان میں جھونپڑے بنا کر رہیں اور چار چھ ہفتہ تک مکانات کو خالی پڑا رہنے دیں۔

(۳) طاعون سے مرے ہوئے آدمی کی تجھیز و تکھین نہایت احتیاط سے کریں۔ اس کے کپڑے جلا ڈالیں تاکہ کپڑوں کے ذریعہ تندرست اشخاص میں طاعون کے جراثیم سرایت نہ کر جائیں۔

(۴) طاعون کے جراثیم عموماً ایک فٹ کی بلندی تک اُچھل سکتے ہیں اس لیے اگر دبا کے اتیام میں موزہ اور دستانے پہنے جائیں تو بہت کچھ حفاظت ہو سکتی ہے۔

(۵) ایسی چیزیں جو خون کو جوش میں لانے والی ہوں ان سے پرہیز کریں۔ جماع سے بھی پرہیز رکھیں۔

(۶) اپنے جسم، مکان اور آس پاس کی زمین اور نالیاں وغیرہ صاف رکھیں۔ مکان میں فنائیل چھڑک دیں۔ آبادی کے قریب کوڑا کرکٹ وغیرہ

جلادیں۔ گھر کو خشک رکھیں۔ اپنے کپڑوں اور بستر وغیرہ کو دھوپ دکھا دیا کریں۔

(۷) ہر وقت اگنیشیا یعنی پیپتہ رومی کا ایک بیج اپنے پاس رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس میں سوراخ کر کے گلے میں پہن لیں تاکہ اس کی رگڑ جسم پر لگتی رہے۔

(۸) حفظہ ماتقدم کے طور پر اگنیشیا نمبر ۳۰ بہت مفید ہے۔ صبح و شام استعمال کریں یا چوتھے روز ایک خوراک نمبر ۲۰۰ کی دیدیا کریں۔

علاج :- (۱) طاعون کی سب سے عمدہ دوا اگنیشیا ہے۔ اس کی چند خوراکیوں سے پیپتہ زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور بخار میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ طاعون میں اکثر و بیشتر حالات میں اسی دوا کی علامات دیکھنے میں آیا کرتی ہیں۔ گھٹی نمودار ہونے پر اسی کے تخم کو یعنی پیپتہ رومی کو گھس کر گھٹی پر لگانا چاہیے۔

(۲) شدید بخار، سر میں تپکن کا درد، چہرہ سرخ اور نتکایا ہوا ہو۔ مریض شور و غل و روشنی برداشت نہ کر سکتا ہو۔ سر سامی کیفیت طاری ہوگئی ہو۔ بدن میں درد ہو۔ پیاس کم ہو تو بیلادونا دینا چاہیے۔

(۳) اگر دوپہر کے وقت یا آدھی رات کو تکلیف بڑھ جاتی ہو۔ جلن اور سوزش ہوتی ہو۔ اُجھن اور انتہائی بے چینی پائی جائے۔ تھوڑے سے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس معلوم ہو۔ کمزوری زائد آگئی ہو تو آرسنک

(۴) اگر سمیت زیاده ہو، غنودگی اور غشی پائی جیسا کہ درجہ ہوا ہے

بہت بڑا جائے تو پاٹرو جنم دیں

(۵) جب دل کی رفتار کمزور معلوم ہوتی ہو اور حرکتِ قلب بن ہو جانے کا

خدا شہ ہو، ہمیت زیادہ پائی باطنیہ تو ناجا وینا یا ہے۔

(۶) آخری اور نازک حالت سپر کہ بنی غیر مستقیم ہو جاسکے کہ

پینے کے اور مریض کے کی ہوا کی خوشبو کو کاٹ دینا اور

وقتاً بکثرتاً

(۷) باپ کی تک میں فیرم خاص اور کافی عیوید باری باری دیتا ہوتا۔

مفید ہے۔ اگر کسی میں درد، ورم یا سوزش ہو تو نیم فاس اسٹیکسین دینا

(۸) مندرجہ صدر اردو یہ ہے کہ عازمہ فاضلہ میرزا بیوہ بیگم شاہ

کروٹلیس - خانیقولا کا - - - - -

بہت مفید اور مخصوص دوا ہے جس کا نام ہے

5-16

CHOLERA

اسباب :- یہ ایک متعدی مرض ہے جو وبا کے طور پر پھیلا کر رہتا ہے۔

اس کے پھیلانے والے ایک قسم کے خوردبینی جوائنٹیم ہوتے ہیں۔ تاکہ سترج

گمزور دل اور ہاضمہ کی خرابی والے اشخاص اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں

اس بیماری کی چھوت پانی، دودھ یا دیگر کھانے والی اشیاء کے ذریعہ سے تندرست اشخاص کے جسم میں پہنچ کر مرض کا باعث ہوتی ہے۔ مریض کی قے و پاخانہ میں لاکھوں کی تعداد میں جراثیم پائے جاتے ہیں جو دوسرے تندرست اشخاص تک کسی نہ کسی صورت سے پہنچ جاتے ہیں۔ گندی ہوا، تنگ و تاریک مکان، ناقص یا ثقیل غذا اور جسمانی کمزوری وغیرہ کی حالت میں ہیضہ ہونے کا زیادہ خدشہ رہا کرتا ہے۔

علامات :- اس بیماری میں شدت سے قے اور دست آنا شروع ہوتے ہیں۔ قے میں پہلے کھائی ہوئی غذا خارج ہوتی ہے پھر صرف چاول کی پیچ کا سا پانی نکلتا ہے۔ دست بھی اسی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ پیشاب رک جاتا ہے۔ سر اور پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ گھبراہٹ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ بار بار پیاس معلوم ہوتی ہے اور پینے کے بعد قے ہو جایا کرتی ہے اور یہ کیفیت دو تین گھنٹے سے لے کر دس بارہ گھنٹے تک رہتی ہے اگر اس درمیان میں مریض سنبھل گیا تو خیر ورنہ کمزوری اور نقاہت کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ جسم کی حرارت ۹۵ درجہ یا اس سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ سرد پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور نبض غیر منتظم ہو جاتی ہے۔ اسی حالت میں مریض راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

بعض وقت بدہضمی کے دست آجایا کرتے ہیں جس کے ہمراہ

کبھی قے بھی آجاتی ہیں۔ ایسی حالت میں نا تجربہ کار معالج ہیضہ کا شہہ کر کے اسی کا علاج کرنے لگتے ہیں۔ یا ہیضہ کی حالت کو معمولی قے اور دست سمجھتے ہیں اس لیے ہیضہ کی مختصر اور مخصوص علامتیں بھر درج کی جاتی ہیں :-

(۱) مسلسل چاؤل کی تیج کی مانند دست اور اسی رنگ کی قے

ہونا۔

(۲) پیشاب کا بند ہو جانا۔

(۳) دو ہی تین دستوں کے بعد۔۔۔ بے انتہائی کمزور ہو جانا۔

(۴) ہاتھوں اور پیروں میں سخت جھنک کا ہونا۔

(۵) پیشانی یا جسم پر ٹھنڈے۔۔۔ ہونا۔ بلکہ بذات خود تمام جسم کا

سرد پڑ جانا۔

پرستیز و ہدایات :- مریض کو غسی۔۔۔ ت اور ستھرے کمرہ میں رکھیں

شدت پیاس کی حالت میں برف چوت۔۔۔ دین یا سوڈا اور لیمینڈیا، حنجر

برف میں سرد کر کے پلائیں۔ جسم کو گرم کرنے کے لیے گرم پانی کی بوتلیں

بغلوں اور رانوں میں رکھیں۔ پیشاب ماننے کے لیے گردوں کے

مقام پر سینک کریں۔ نفخ شکم کی حالت میں پیٹ کو سینکیں۔ بیماری

رفع ہو جانے کے بعد کئی دن تک نہ کھیں۔ دودھ، آتش جو

سابو دانہ یا مونگ کی دال کا پانی دیں۔۔۔ مفت گزر جانے کے بعد

روٹی کا چھلکا شوربا کے ساتھ یا ملائم کھجور۔۔۔ دھ وغیرہ زود ہضم اشیاء دیں۔

مریض کے بول و براز اوزقے کو کسی برتن میں ڈال کر اس میں
انتباہ فنائیل یا چوننا ڈال دینا چاہیے اور اُسے بستی سے دُور گڑھے
 میں دفن کر دینا چاہیے۔ اگر زمین برفی یا خانہ دقے ہو جائے تو اُسے
 اٹھانے کے بعد اُس جگہ پر خشک چوننا چھڑک دینا چاہیے۔ نیز مریض
 کے تمام مشتبہ کپڑے جن پر دقے زدست لگ جائے گا بشہہ ہوا اٹھیں
 جلا دینا چاہیے۔

ہیضہ کے دنوں میں ہر چیز کی صفائی سب سے مقدم
حفظ ماتقدم چیز ہے۔ جسم، لباس، مکان اور نگلیوں کو صاف ستھرا
 رکھنا چاہیے۔ (پاخانہ) بیت اٹھلاہیں فنائیل یا چوننا چھڑک دیں۔
 مکان میں گندھک کی دھونی دیں۔ آس پاس کے گندے تالوں، بدرد
 کوڑہ وغیرہ کے انبار اور گڑھوں کی صفائی کا بندوبست کرنا چاہیے۔
 (۲) غذا میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ باسی
 کھانا اور بازاری ناقص اور ثقیل اشیاء سے پرہیز کریں۔ ہمیشہ زود ہضم
 اور تازہ کھانا کھائیں۔ کچے پھل مثلاً امرود، کھیرا، کیلا، پھوٹ، لکڑی
 وغیرہ قطعی نہ کھائیں۔ پانی یا دودھ جوش دے کر پیئیں۔
 (۳) خالی معدہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔

(۴) جب گھر سے باہر نکلیں تو جوتہ میں نسی ہوئی گندھک کی
 ایک چمکی ڈال لیں یا اپنے پاس تھوڑا سا کافور یا قدرے یوکلپٹس آئیل
 زونال میں چھڑک کر اپنے پاس رکھیں یا تانبے کا ایک ٹکڑا تین انچ لمبا

اور دوا پنج پوڑا مسلسل ناف پر بانٹے رہیں۔

(۵) کثرت جماع، کثرت کار، کثرت سے نوشی اور بیداری وغیرہ سے پرہیز کریں۔

(۶) دوا کے طور پر :-

(۱) روہنی شکر کیمف صبح و شام دو دو قطرے شکر میں ڈال کر کھائیں۔ یا

(ب) سلفر نبرا کی دو خوراک یومیہ استعمال کریں۔ یا

(ج) درمٹرم نمبر ۳۰ کی ایک خوراک روزانہ لیں۔ ڈاکٹر جھار نے

درمٹرم کی بہت تعریف لکھی ہے۔

(د) با یو کیمک میں نیٹرم سلٹ حفظاً مقدم کے طور پر روزانہ کھائیں

علاج :- (۱) ہیضہ کی سب سے عمدہ اور مجرب دوا کیمف روہنی شکر ہے

آٹھ دس قطرے لے کر ذرا سی شکر پر ڈال کر استعمال کرنا چاہیے (پانی میں ڈال کر استعمال کرنے سے متلی پیدا ہوتی ہے) آدھ آدھ گھنٹہ کے بعد

چار خوراکیں دے کر روک دیں۔ لیکن اگر بار بار قے ہو جاتی ہو تو ہر بار قے

کرنے کے بعد دیں خواہ قے ایک ایک منٹ کے بعد کیوں نہ ہو۔ جب

قے اور دست رک جائیں تو آدھ آدھ گھنٹہ کے بعد دیں۔ اگر اس دوا کی

چار خوراکیں مریض کو مضم ہو جائیں تو مریض خطرہ سے پار ہو جاتا ہے۔

(۲) اگر خدا نخواستہ پہلی دور فیل ہو جائے اور مریض کو قے و دست

کی شدت ہو، اعضاء میں سخت اینٹھن ہو رہی ہو۔ پیشاب رک گیا ہو۔

چادر کی بیج کے سے پاخانے زیادہ مقدار میں ہوتے ہوں۔ شدید

پیا س ہو۔ مریض ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں پیے۔ بے حد کمزوری ہو جائے۔ تشنج اور غشی کی حالت طاری ہو جائے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں۔ سانس سرد۔ نیز پاتھ پاؤں سرد ہوں۔ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ ہو تو ورٹیرم البم دوا ہے۔ اس دوا کو دس دس یا پندرہ پندرہ منٹ کے بعد حسب موقع دینا چاہیے۔ درمیان میں ایک خوراک سلفر دینے سے اس کے اثر میں اور بھی تیزی ہو جاتی ہے۔

(۳) اگر بے چینی اور الجھن زیادہ ہو۔ آنکھیں دھنس گئی ہوں دوران کے گرد سیاہ حلقے ہوں۔ جسم کے مختلف حصص میں شدید ترین نیٹھن جس سے مریض چیخ اٹھے۔ اینٹھن کے مقابلہ میں قے اور دست کی س قدر شدت نہ ہو۔ بے حد پیا س ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد ہی قے ہو جائے اور دست آجائے۔ دست مقدار میں زیادہ بہت ریا ح کے ساتھ ہوں۔ گھبراہٹ زیادہ ہو اور دل کی حرکت میں فتور ہو گیا ہو تو لیو پرم دوا ہے۔ بعض حالات میں کیمر کے بعد یہ دوا بھی مفید ہوتی ہے۔

(۴) مسلسل بے چینی اور پریشانی، زبان خشک ہو اور بے حد یاس ٹھنڈے پانی کی، لیکن ایک وقت میں بالکل ذرا سا پیے جو راتے ہو جائے۔ پیشاب بند ہو۔ اعضاء میں اینٹھن اور تشنج ہو۔

برہ کارنگ پیلا مردوں کا سا ہو جائے۔ نبض نہایت کمزور ہو جو نئی اوقات محسوس نہ ہو۔ مریض خیال کرے کہ اس کی بیماری لا علاج ہے۔ چھپا ٹھنڈا پسینہ نکلے تو آرنک دینا چاہیے۔

(۵) جب ہیمینہ کے آخری مرحلہ میں جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو جائے
ہونٹ نیلے ہوں، مریض ہوا کی خاطر پنکھا کرنے کی خواہش کرتا ہو۔ قے
دست بند ہو گئے ہوں۔ شکم ڈھول کی مانند ابھر گیا ہو۔ نبض غیر منتظم ہو
یا بالکل محسوس نہ ہوتی ہو۔ اور مریض چند منٹ کا حمان معلوم ہوتا ہو تو
ایسے وقت میں کار بوج دیدینے سے خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے
میں آتا ہے۔

(۶) شروع ہیمینہ میں یا معمولی حالات میں جب مسلسل متلی وقتے ہوا
قے کے بعد سکون نہ ہوتا ہو۔ شکم میں اینٹھن کا سا درد ہو، سبز بلغمی
پاخانہ ہو، قے میں زیادہ تر صفراوی یا کھٹا مادہ خارج ہوتا ہو تو اسپیکاک
دیں۔

(۷) اگر اینٹھن اور تشنچ کیو پر م سے نہ رکے۔ جسم مکمل ٹھنڈا
ہو گیا ہو، سماعت میں فرق آ گیا ہو۔ مریض کپڑا قطعی نہ اوڑھنا چاہے
حالانکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو۔ کمزوری حد سے زیادہ پائی جائے۔
آنکھیں دھنس جائیں تو سیکیل کا ردوا ہے۔

(۸) جب مریض کی نبض بالکل ختم ہو چکی ہو، سانس مدہم ہو گئی ہو
اور دقت سے رک رک کر آتی ہو۔ پتلیاں پھیل گئی ہوں، بینائی ندارد
جلد نیلی ہو گئی ہو اور مریض کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہو
تو ہائڈروسیانک ایسڈ دس دس منٹ کے وقفے سے دے کر
دوا کا معجزہ دیکھیں۔

پیاس ہو۔ مریض ٹھنڈا پانی زیادہ مقدار میں پیے۔ بے حد کمزوری ہو جائے۔ تشنچ اور غشی کی حالت طاری ہو جائے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں۔ سانس سرد۔ نیز پاتھ پاؤں سرد ہوں۔ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ ہو تو ورٹیرم الہم دوا ہے۔ اس دوا کو دس دس یا پندرہ پندرہ منٹ کے بعد حسب موقع دینا چاہیے۔ درمیان میں ایک خوراک سلفر دینے سے اس کے اثر میں اور بھی تیزی ہو جاتی ہے۔

(۳) اگر بے چینی اور الجھن زیادہ ہو۔ آنکھیں دھنس گئی ہوں دوران کے گرد سیاہ حلقے ہوں۔ جسم کے مختلف حصص میں شدید ترین نیٹھن جس سے مریض جتنج اٹھے۔ اینٹھن کے مقابلہ میں قے اور دست کی س قدر شدت نہ ہو۔ بے حد پیاس ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے کے بعد ہی قے ہو جائے اور دست آجائے۔ دست مقدار میں زیادہ بہت ریاح کے ساتھ ہوں۔ گھبراہٹ زیادہ ہو اور دل کی حرکت میں فتور ہو گیا ہو تو کیو پرم دوا ہے۔ بعض حالات میں کیوفر کے بعد یہ دوا بھی مفید ہوتی ہے۔

(۴) مسلسل بے چینی اور پریشانی، زبان خشک ہو اور بے حد یاس ٹھنڈے پانی کی، لیکن ایک وقت میں بالکل ذرا سا پیے جو رات قے ہو جائے۔ پیشاب بند ہو۔ اعضا میں اینٹھن اور تشنچ ہو۔ برہ کارنگ پیلا مردوں کا سا ہو جائے۔ نبض نہایت کمزور ہو جو نئی اوقات محسوس نہ ہو۔ مریض خیال کرے کہ اس کی بیماری لا علاج ہے۔ چھپا ٹھنڈا پسینہ نکلے تو آرنک دینا چاہیے۔

(۵) جب ہیضہ کے آخری مرحلہ میں جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو جائے
ہونٹ نیلے ہوں، مریض ہوا کی خاطر پٹکھا کرنے کی خواہش کرتا ہو۔ قے
دست بند ہو گئے ہوں۔ شکم ڈھول کی مانند ابھر گیا ہو۔ ہیضہ غیر منتظم ہو
یا بالکل محسوس نہ ہوتی ہو۔ اور مریض چند منٹ کا حمان معلوم ہوتا ہو تو
ایسے وقت میں کار بوج دیدینے سے خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھنے
میں آتا ہے۔

(۶) شروع ہیضہ میں یا معمولی حالات میں جب مسلسل متلی وقتے ہوا
قے کے بعد سکون نہ ہوتا ہو۔ شکم میں اینٹھن کا سا درد ہو، سبز بلغمی
پاخانہ ہو، قے میں زیادہ تر صفراوی یا کھٹا مادہ خارج ہوتا ہو تو اسپیکاک
دیں۔

(۷) اگر اینٹھن اور تشنج کیو پریم سے نہ رکے۔ جسم مکمل ٹھنڈا
ہو گیا ہو، سماعت میں فرق آ گیا ہو۔ مریض کپڑا قطعی نہ اڑھنا چاہے
حالانکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو۔ کمزوری حد سے زیادہ پائی جائے۔
آنکھیں دھنس جائیں تو سیکیل کا ردوا ہے۔

(۸) جب مریض کی ہیضہ بالکل ختم ہو چکی ہو، سانس مدھم ہو گئی ہو
اور دقت سے رک رک کر آتی ہو۔ پتلیاں پھیل گئی ہوں، بینائی نہارد
جلد نیلی ہو گئی ہو اور مریض کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب ہو
تو ہائڈروسیانک ایسڈ دس دس منٹ کے وقفے سے دے کر
دوا کا معجزہ دیکھیں۔

(۹) بائیکاٹ میں مرض کے آغاز پر فیرم فاس اور کالی سلف
وہی۔ تشنگ کی حالت میں گنیشیا فاس دیں لیکن جب کہیں کو دو تین
گھنٹے ہوئے ہوں تو فیرم فاس، کالی فاس، گنیشیا فاس کو باہم
ملا کر نیٹریم میور کے ساتھ باری باری پانچ پانچ یا دس دس منٹ کے
وقفے سے دیں۔

(۱۰) مندرجہ صدر ادویہ کے علاوہ ٹو سیکم نکس و امیکا۔ انٹرمیڈیٹ۔
یا ڈوفالک۔ کیفیکس، ایکسیس۔ ٹاچا۔ ڈیجیٹلس۔ لارڈ سیریس۔
ار۔ جٹم نائٹ۔ اور کروٹیلس ہری وغیرہ نہایت اہم دوائیں ہیں۔
حسب علامات دینا چاہیے۔

JALALI BOOKS

JALALI

ضمیمہ

ہومیوپیتھک دویہ کا خارجی استعمال

(مندرجہ ذیل مخصوص ہومیوپیتھک دینکچرز کا استعمال خارجی طور پر
یعنی لگانے کے لئے بھی ہوتا ہے)

آرنیکا مونت ARNICA MONT

اس کا درخت پہاڑوں پر پایا جاتا ہے۔ اس کا مدر ٹینکچر چوٹ اور
موج پر لگانے کے لئے کافی مشہور ہے۔ لیکن اس کو صرف اسی چوٹ پر
لگانا چاہیے جس میں جلد بھٹی نہ ہو یعنی خون نہ بہتا ہو۔ دوسرے الفاظ
میں جب جسم کا کوئی حصہ دھونس گیا ہو۔ اس جسم کی چوٹ میں آرنیکا
مدر ٹینکچر لگا کر درد آخافانا غائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ
اگر جسم کے کسی حصہ کے بال اڑ گئے ہوں اور گنجا پن پیدا ہو گیا ہو تو
اس کا تیل (آرنیکا ہیر تیل) مسلسل لگاتے رہنے سے بال دوبارہ پیدا
ہو جاتے ہیں اور بال سفید ہونے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔

ارٹیکا یورنس URTICA URENS

اس بوٹی کو ہندوستانی میں لٹ زیرہ یا چرچٹہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بچھو بوٹی کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ بچھو کے ڈنک مارنے کے مقام پر اس کا مدر شکنچہ لگانے سے فوراً سکون ملتا ہے۔ پتی اُچھلنے کی حالت میں بھی اس کو خارجی طور پر لگاتے ہیں۔

نوٹ :۔ ایک بار مصنف نے بچشم خود ایک دیہاتی کو دیکھا جو جنگل میں جانور چرا رہا تھا۔ اُس نے خندق کے قریب لٹ زیرہ کی چند پتیاں توڑیں اور اُن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح سے ملا۔ پھر جیسا کہ اُس کو علم تھا اُسی جگہ پر ایک مخصوص قسم کے سوراخ کو کھود کر اُس نے ایک بچھو نکالا اور اُسی بوٹی کی چند پتیاں مسل کر اُس پر ڈالیں جس سے بچھو بے خود سا ہو گیا پھر اُس نے اپنے ہاتھ سے بچھو کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ میں رکھ لیا اور بچھو نے قطعی گزند نہیں پہنچایا۔

اکونائٹ ACONITE

یہ ایک پہاڑی پودا ہے جس کو بچھناگ یا سیٹھا تیل یا بھی کہتے ہیں یہ خصوصاً جرمنی، سویڈن اور سوئٹزر لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ یہ سخت زہریلا ہوتا ہے۔ اس کے مدر شکنچہ کو سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانے سے گٹھیا ہائی، اعصابی درد اور درد کمر میں لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو چھلی ہوئی یا زخمی جلد پر ہرگز نہ لگائیں۔ پھولے ہوئے مسوڑھوں میں

اس کو آٹھ گن گلیسرین میں ملا کر لگانے سے مسوڑھوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔

برائی اونیا BRYONIA

یہ ایک نبات ہے۔ نمونیہ اور پلپوریسی کے لیے یہ بے حد مجرب ہے۔ اس کے مدرٹشکچر کو آٹھ گن سرسوں کے تیل میں ملا کر سینہ پر مالش کرنا چاہیے۔ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بھی اکسیر ہے۔

بیلادونا BELLADONNA

یہ ایک زہریلا پودا ہے جو گٹھیا بانی، ورم اور اعصابی درد کے لیے کافی مشہور ہے۔ اس کا مرہم بھی بنایا جاتا ہے اور بیلادونا پلاسٹر بھی اسی سے بنتا ہے۔ اس کو دس گن سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا چاہیے۔ زچہ کی پھاتیوں پر اس کا مدرٹشکچر لگانے سے دودھ خشک یا کم ہو جاتا ہے۔

پلانٹگو PLAN TAGO

اس کو دانت کے درد اور مسوڑھوں میں ورم ہو جانے کی حالت میں لگاتے ہیں۔ بوا سیری مستوں پر بھی اس کے لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

تھوچا THUUA

چہرہ کے ہماسوں اور جسم کے مسوں کے لیے اس کا خارجی استعمال بے حد مفید ہے۔ بواسیری مسوں پر بھی اس کو لگاتے ہیں۔

ٹینک ایسڈ TANNIC ACID

یہ پاؤڈر ہوتا ہے۔ جب زخم سے خون بہہ رہا ہو اور کسی طرح سے خون بند نہ ہوتا ہو تو اس کو چھڑکنے سے خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ حلق کے غدود بڑھ جانے کی حالت میں اس کو گلیسرین میں ملا کر لگانے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو بطور نسوار استعمال کرنے سے نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ جل جانے کی حالت میں اس کے ۵ فی صدی والے آبی لوشن میں ملا کر کپڑا تر کر کے مقام سوختہ پر رکھتے ہیں اور بار بار اس کپڑے پر محلول ٹپکاتے رہتے ہیں۔

چیلیڈونیم CHELIDONIUM

جگر یا طحال بڑھ جانے کی حالت میں اس کا خالص مدرٹنگھریا تیل مقام ماؤفہ پر لگاتے ہیں۔

رٹاکس RHUS TOX

یہ دوا گٹھیاوی، اعصابی، مویج اور جوڑوں کے درد کے لیے

اکسیر ہے۔ اس کے مدر ٹنکچر کو خالص یا سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا چاہیے۔

سکس سائی نیریا مارٹیا SUC. CIN. MAR.

یہ شہرہ آفاق دوا موتیا بند کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس کے عرق کا ایک قطرہ آنکھ میں دن میں ۲-۳ بار مسلسل ڈالتے رہنے سے موتیا بند رفع ہو جاتا ہے۔ جالے اور مارے کے لیے بھی اس کا خارجی استعمال مفید ہے۔

سمفاٹم SYMPHYTUM

یہ دوا ہڈی جوڑنے کے لیے کافی مشہور ہے اور اسی لیے اس کو ہڈی جوڑ بوٹی بھی کہتے ہیں۔ اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو یا ہڈی پر چوٹ لگئی ہو تو اس کے ٹنکچر کو خارجی طور پر لگاتے ہیں لیکن پہلے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو خوب اچھی طرح سے جھٹ لینا چاہیے۔

سنوٹھس امریکانہ CEAN. AM.

طحال یعنی تلی بڑھ جانے کی حالت میں اس کے مدر ٹنکچر کو خارجی طور پر لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

فائٹولاکا PHYTOLACCA

یہ دوا غدودوں کے لیے اکسیر مانی گئی ہے۔ اس کے ٹنکچر کو

کلیسرین میں لگا کر گلے کے آنے میں اور حلق کے متورم غدودوں میں لگانے سے نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔

کیلنڈولا CALENDULA

ہومیو پیتھی میں یہ دوا زخموں کے لیے سب سے افضل مانی گئی ہے۔ تمام قسم کی چوٹوں میں جہاں جلد پر خراش آگئی ہو یا زخم ہو گیا ہو تو اس کے خارجی استعمال سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا سکس، لوشن، مرہم اور روغن غرضیکہ ہر طرح سے اس کا استعمال زخموں کے لیے بہت ہی مہترقبہ ہے۔

کینٹھاریس CANTHARIS

جلے ہوئے زخموں میں اس کا خارجی استعمال مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایسا زہر باد جس میں حد درجہ جلن ہو اس کا مرہم مفید ہوا کرتا ہے۔ جل جانے کی حالت میں اس کے مدر ٹنکچر کے دس قطرے ایک آؤنس پانی میں ملا کر بار بار لگانے سے کافی سکون ملتا ہے۔

لیڈم LEDUM

اس کا خارجی استعمال بچھو کاٹے میں فوراً سکون دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی چوٹ جس سے جلد نیلگوں ہوگئی ہو یا سیاہ چمچے

پڑ گئے ہوں تو اس کو خارجی طور پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔

ہائڈراستس HYDRASTIS

اس کا ٹنکچر ملک کننا ڈاک کے ایک پودے کی جڑ سے بنایا جاتا ہے اس کے مدر ٹنکچر کے دس قطرے ایک آؤنس پانی میں ملا کر کان بہنے، سوزاک کہنہ، سیلان الرحم، نکسیر یا رحم وغیرہ سے خون آنے میں پچکاری کرتے ہیں۔ بواسیر کے مستوں اور زخموں کے لیے بھی اس کا مرہم بنا کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایسا اکوتہ جس پر خشک کھرنڈ پائی جائے اس کے مدر ٹنکچر کا مرہم لگانا مفید ہوا کرتا ہے۔

ہائڈروکوٹائل HYDROCOTYLE

اس کا تیل بنا کر فیل پا میں لگاتے ہیں۔

ہیوسکیمس HYOSCYMUS

اس کے مدر ٹنکچر کو قدرے تیل میں ملا کر سر پر مالش کرنے سے دیوانگی اور سرسامی حالت درست ہو جاتی ہے۔

یوفریشیا EUPHRASIA

یہ آنکھوں کی مخصوص دوا ہے۔ اگر آنکھوں سے آنسو بہ کثرت

ح

بہتے ہوں یا خارش ہوتی ہو تو اس کا آبی محلول (دس قطرہ مدر ٹینکچر
اور ایک آؤنس آب مقطر) آنکھ میں ڈالنے سے حیرت انگیز فائدہ
ہوتا ہے۔

مُصَنَّف کی دوسری کتاب

رہنمائے میٹر یا مڈیکا

زیر طبع ہے

زیر اہتمام سید انصار حسین صاحب

سرفراز قومی پریس لکھنؤ میں چھپی

فہرست ادویہ (انگریزی میں)

نمبر شمار	نام دوا
۱	ARTIMESIA VULGARIS آرٹیمیشیا وگرس
۲	ARSENIC IOD. آرسنک آئیوڈائیڈ
۳	ARSENIC ALBUM آرسنک البم
۴	ARNICA MONT آرنیکا مونت
۵	IRIS آئرس
۶	IODIU M آئیوڈیم
۷	ABROTANUM ابراٹنم

نام دوا	نمبر شمار
PIPECAC	۸ اپیکاک
URTICA URENS	۹ ارٹیکا پورنس
ARGENTUM MET	۱۰ ار جینٹم مرٹ
ARGENTUM NIT	۱۱ ار جینٹم نائٹ
ASAFOETIDA	۱۲ اسافوئیڈا
ASHOKA	۱۳ اشوکا
ACTEA RECEMOSA	۱۴ اکٹیا رسی موسا
ACALYPHA INDICA	۱۵ اکلیفا انڈیکا
ACONITE	۱۶ اکونائٹ
MAGNUS	۱۷ اگنس
IGNATIA	۱۸ اگنیشیا
AGARICUS	۱۹ آگیریکس
MALETRIS FAR.	۲۰ المٹرس فادی نوسا

نام دوا	نمبر شمار
ALFALFA	۲۱ الفلفا
ALUMEN	۲۲ الیومن
ALUMINA	۲۳ الیومنا
AMONIA CARB	۲۴ امونیا کارب
ANACARDIUM	۲۵ اناکارڈیم
ANTHRUXINUM	۲۶ انتھرکسینم
ANTIM TART	۲۷ انٹیم ٹارٹ
ANTIM CRUD	۲۸ انٹیم کروڈ
OVATESTA	۲۹ اوواٹسٹا
OPIUM	۳۰ اُپیم
AURUM MET	۳۱ اورم مسٹ
AVENA SATIVA	۳۲ اونیا سائیوا
APIS	۳۳ ایپس

APOCYNUM	ایپوسائٹم	۳۴
AETHUSA	ایتھوزا	۳۵
ACID PICRIC	ایسڈ پیکریک	۳۶
ACID SULPH	ایسڈ سلف	۳۷
ACID PHOS	ایسڈ فاس	۳۸
ACID MUR.	ایسڈ میور	۳۹
ACID NIT	ایسڈ نائٹ	۴۰
ECHINACEA	ایکی نیشیا	۴۱
ALUM SATIVA	ایلم سٹائیوا	۴۲
ALUM CEPA	ایلم سیپا	۴۳
ALOE	ایلو	۴۴
BAPTISIA	بپٹیشیا	۴۵
BRYONIA	برائی اونی	۴۶

نام دروا	نمبر شمار
BERBERIS	۴۷ بربرس
BARYTA CARB	۴۸ برٹیا کارب
BISMUTH	۴۹ بسمتہ
BACILLINUM	۵۰ بسی لینم
BLATA ORI	۵۱ بلاٹا اوری
BORAX	۵۲ بوارکس
BELLADONNA	۵۳ بیلاڈونا
BUFO	۵۴ بیوفو
PODOPHYLLUM	۵۵ پاڈوفاٹلم
PYROGENUM	۵۶ پاؤروجنم
PICRIC ACID	۵۷ پیکرک ایسڈ
PLATINA	۵۸ پلاٹینا
PLANTAGO	۵۹ پلانٹیکو

نام دوا	نمبر شمار
PULSATILLA	۶۰ پلساٹیل
PLUMBUM	۶۱ پلمبم
PASSIFLORA	۶۲ پیسی فلورا
THUJA	۶۳ تھوجا
TUBERCULINUM	۶۴ ٹوبرکولینم
TARENTULA	۶۵ ٹیرنٹولا
GELSEMIUM	۶۶ جلسیم
JONOSIA	۶۷ جوشیا
CHINA	۶۸ چائنا
CHINUM SULPH	۶۹ چائنم سلف
CHELIDONIUM	۷۰ چلیڈونیم
DROSERA	۷۱ ڈرڈسرا
DIPHOTHERINUM	۷۲ ڈیفٹھیرینم

نام دوا	نمبر شمار
DULCAMARA	۷۳ ڈکارا
DAMIANA	۷۴ ڈمیانہ
DEGITALIS	۷۵ ڈیجیٹلس
RHUS TOX	۷۶ رشاکس
RUTA	۷۷ روٹا
ZINCUM MET	۷۸ زنک مٹ
SARSAPRILLA	۷۹ سارساپریلا
SYZYGIUM	۸۰ سائی زائی جیم
SABINA	۸۱ سبائنا
SABAL SAR	۸۲ سبل سر
SPIGELIA	۸۳ سپائی جیلیا
SPONGIA	۸۴ سپنجیا
STAPHYSAGRIA	۸۵ سٹافی سگریا

نام دوا	نمبر شمار
STRAMONIUM	۸۶ سٹرامونیم
STROPHENTHUS	۸۷ سٹروفتھس
SYPHILLINUM	۸۸ سفیلینم
SULPHUR	۸۹ سلفر
SULPHURIC ACID	۹۰ سلفیورک ایسڈ
SILICIA	۹۱ سلیسیا
SALICA MARINA	۹۲ سلیکامیرینا
SYMPHYTEM	۹۳ سمفائٹم
CIMICI FUGA	۹۴ سمی سی فوگا
SENNA	۹۵ سنا
SINCHONA	۹۶ سنکونا
SANGUNAREA	۹۷ سنگونیریا
SYNOTHUS	۹۸ سنوتھس

نمبر شمار	نام دوا
۹۹	سورنیم PSORINUM
۱۰۰	سیپیا SEPIA
۱۰۱	سیکیل کار SECALE COR
۱۰۲	سیلکس ناگرا SALIX NIGRA
۱۰۳	سیلینیم SELLNIUM
۱۰۴	سینی کولا SANICULA
۱۰۵	فاسفورس PHASPHORUS
۱۰۶	فاسفورک ایسڈ PHASPHORIC ACID
۱۰۷	فائیٹولاکا PHYTOLACCA
۱۰۸	فلکس ماس FILIX MAS
۱۰۹	فیرم فاس FERRUM PHOS
۱۱۰	کار بوج CARBO VEG
۱۱۱	کاسٹم CAUSTICUM

نمبر شمار	نام دوا	
۱۱۲	کالچیکم	COLCHICUM
۱۱۳	کالوسنتھ	COLOCYNTH
۱۱۴	کالوفائلم	CAULOPHYLLUM
۱۱۵	کالکائیگرام	KALI BIOCH.
۱۱۶	کالی سلفٹ	KALI SULPH
۱۱۷	کالی فاس	KALI PHOS
۱۱۸	کالی کارب	KALI CARB
۱۱۹	کالی میوز	KALI MUR
۱۲۰	کروٹن ٹیگ	CROTON TIG
۱۲۱	کروکس	CROCUS
۱۲۲	کریازوٹ	KREOSOTE
۱۲۳	کلکیسریا سلفٹ	CEL CAREA SULPH
۱۲۴	کلکیسریا فاس	CAL CAREA PHOS

نام دوا	نمبر شمار
CALCAREA FLOUR	۱۲۵ گلگیر یا فلور
CALC. CARB	۱۲۶ گلگیر یا کارب
CANNABIS IND.	۱۲۷ کنابس اینڈیکا
CANNABIS SAT	۱۲۸ کنابس سائیکا
COCCULUS	۱۲۹ کوکولس
COLLIN SONIA	۱۳۰ کولن سونیا
CONIUM	۱۳۱ کونیم
CALENDULA	۱۳۲ کیلنڈولا
CALADIUM	۱۳۳ کیلیڈیم
CAMPHOR	۱۳۴ کیمفر
CHAMOMILLA	۱۳۵ کیوملا
CANTHRIS	۱۳۶ کینتھرس
CUPRUM	۱۳۷ کیوپرم

نمبر شمار	نام دوا
۱۳۸	گرفیٹس
۱۳۹	گلونائسن
۱۴۰	لائسین
۱۴۱	لائسکو پوڈیم
۱۴۲	لیڈم پال
۱۴۳	لیکیس
۱۴۴	لیلیئم برگ
۱۴۵	مارسٹکا
۱۴۶	مرک سال
۱۴۷	مرک کار
۱۴۸	مزیریم
۱۴۹	مشک
۱۵۰	مگنیشیا فاس

MAG. CARB	مگنیشیا کرب	۱۵۱
MAG. MUR	مگنیشیا میور	۱۵۲
MILLEFOLIUM	ملی فولیم	۱۵۳
MULLEIN OIL	مولین آیل	۱۵۴
MEDHORINUM	میڈورنیم	۱۵۵
MURIATIC ACID	میورٹیک ایسڈ	۱۵۶
NAJA	ناجا	۱۵۷
NITRIC ACID	نائٹرک ایسڈ	۱۵۸
NUX MOSCHATA	نکس موسکاٹا	۱۵۹
NUX VOMICA	نکس وامیکا	۱۶۰
NATRUM SULPH	نیزم سلفٹ	۱۶۱
NATRUM PHOS	نیزم فاس	۱۶۲
NATRUM CARB	نیزم کرب	۱۶۳

نام دوا	نمبر شمار
NATRUM MUR	۱۶۴ نیٹرم میور
VERBASCUM	۱۶۵ ویربوسکم
VERATRUM ALB.	۱۶۶ وریٹرم البم
VERATRUM VIRIDE	۱۶۷ وریٹرم ورائڈ
VALERIANA	۱۶۸ ولیریانہ
VARIOLINUM	۱۶۹ ویریولیئم
HYPERICUM	۱۷۰ ہائپرکیم
HYDRASTIS	۱۷۱ ہائڈراسٹس
HYDROPHOBINUM	۱۷۲ ہائڈروفوبیم
HYDROCOTYL	۱۷۳ ہائڈروکوٹائل
HAMAMELLIS	۱۷۴ ہامامیلس
HEPAR SULPHUR	۱۷۵ ہیسپر سلفر
HELLEBORUS	۱۷۶ ہیلی بوریس

نمبر شمار	نام دوا
۱۷۷	ہیوسکیمس
۱۷۸	یوپتوریئم پرف
۱۷۹	یوفرشیا
۱۸۰	یوہیم بینم
	HYOSCYNUS
	EUPATORIUM PERF
	EUPHRASIA
	YOHIMBINUM

شائع کردہ

خورشید بک ڈپو

امیڈھی ہاؤس متصل ڈاک ہاؤس

امین آباد لاہور

طب یونانی، ہومیو پیتھی، ایلو پیتھی کتابیں

۱۲/-	با یو کمک علاج اردو	۱۵۵/-	قرا بادین اعظم واکمل اردو
۱۰/-	پیراساٹ اردو	۱۵/-	علاج الغریبا اردو
۳۰/-	کتاب التشریح بالتصویر اردو	۵/-	معمولات طب اردو
۳۵/-	جدید رہنمائے علاج اردو	۱۵/-	تفہیم العلاج اردو
۳۵/-	جدید رہنمائے علم الادویہ ڈاکٹر عبد الجبار صاحب	۱۵/-	معالج نسوان اردو
۹۰/-	ایلو پیتھک میسر یا ڈیگاردو ڈاکٹر اعوان	۳۰/-	کتاب الولادت اردو
۱۸/-	علم الجراثیم اردو	۱۰/-	بیک یونانی سائنس اردو
۱۲/-	سنہریوں سے علاج	۲۰/-	تعلیم العیال اردو
۱۲/-	پھلوں سے علاج	۳۰/-	امرت ساگر علاج ویدک اردو
۱۵/-	ماڈرن ٹرین اردو	۳۰/-	حاذق
۱۵/-	نیو ٹرین اردو	۳۵/-	بیاض کبیر دوم مرکبات
۱۵/-	نفسیاتی علاج اردو	۳۵/-	مقدمہ علم الادویہ اردو
۱۵/-	مردانہ امراض اردو	۶/-	طب نبویؐ عکسی نیا ادیشن
۱۲/-	انجکشن تھراپی اردو	۳۰/-	حیات قانون اردو
۱۵/-	ماڈرن ٹرین ہندی	۲۵/-	قانون مباشرت اردو

ڈاکٹر مرزا محمد امین صاحب کی ہومیو پیتھی کی

دوسری مشہور

کتاب


رہنمائے مٹیر یا ڈیگاردو

قیمت

چھپ کر تیار ہے

۱۱/-

خورشید بک ڈپو میٹھی ہاؤس متصل ڈاک خانہ امین آباد لکھنؤ



مصوبہ اسکریپشن برائے کتاب خانہ کاغذی